

MATÉRIAUX
POUR SERVIR A
L'HISTOIRE DES HYDROÏDES

PAR
M. BEDOT

3^{me} PÉRIODE ¹
(1851 à 1871)

Dans cette troisième partie des *Matériaux*, nous avons supprimé le résumé de la partie historique ainsi que les classifications. Nous avons également laissé de côté les travaux paléontologiques et les espèces fossiles.

On trouvera dans l'Index bibliographique l'indication d'un certain nombre d'ouvrages d'un intérêt général et qui sont souvent cités dans les bibliographies des Hydroïdes bien qu'ils ne renferment pas de renseignements nouveaux sur ces animaux. Les titres de ces ouvrages sont marqués d'un astérisque * et les espèces qu'ils mentionnent ne figurent pas dans notre synonymie des espèces.

Pour les Méduses, nous n'avons indiqué, dans l'Index bibliographique, que les travaux mentionnant des espèces appartenant aux Anthoméduses et aux Leptoméduses. Nous avons laissé de côté les ouvrages ne renfermant que des généralités ou des

¹ Voir : M. BEDOT. *Matériaux pour servir à l'histoire des Hydroïdes*. 1^{re} Période. In : Rev. suisse de Zool. T. 9, pp. 379-515. Genève, 1901, 8°.

Idem. 2^e Période. In : Rev. suisse de Zool. T. 13, pp. 1-183, Genève, 1905, 8°.

descriptions d'espèces indéterminables. Nous n'avons pas cité les espèces que HÆCKEL, dans sa Monographie des Méduses, considère comme étant douteuses.

Les espèces, chez lesquelles on a pu observer d'une façon certaine les relations entre le Polype et la Méduse, figurent sous un seul et même nom. Mais, dans certains cas, nous avons jugé plus prudent de maintenir, provisoirement, les deux formes séparées.

Il nous est impossible de tenir compte des ouvrages écrits entièrement en russe. Mais nous en citons toujours les traductions et les extraits publiés en français, anglais ou allemand.

Depuis la publication de la 2^e partie de ce travail, il a paru plusieurs ouvrages très importants pour la systématique des Hydroïdes. Ils sont dus à un des spécialistes les plus compétents, M. A. BILLARD, qui a eu l'heureuse idée de rechercher et d'étudier les types des espèces décrites par LAMARCK et LAMOUROUX. Dans une série de notes et mémoires, qui ont paru de 1907 à 1910, M. BILLARD a donné des descriptions détaillées et établi d'une façon définitive la synonymie de la plupart des espèces créées par ces anciens auteurs. Cette très utile revision nous a obligé à modifier plusieurs des synonymies que nous avions établies dans les premières périodes de ces *Matériaux*.

Nous saisissons cette occasion pour exprimer toute notre reconnaissance à M. BILLARD qui, en maintes occasions, a bien voulu nous aider de ses précieux conseils.

INDEX BIBLIOGRAPHIQUE ¹

- 1776 (a). MÜLLER [O.-F.]. Synonymen aus dem unsichtbaren Thierreiche. In : Der Naturforscher, Stück 9, pp. 205-214. Halle, 1776, 8°.
- 1791 (a). MODEER, A. Slägtet Sjökalv, Medusa. In : K. Svenska Vetenskaps Acad. nya Handlingar, vol. 12 (1791), pp. 81-112, 161-187, 241-263. Stockholm, 1791, 8°. — En allemand dans : K. Schwedisch Akad. d. Wiss. Neue Abhandl., übersetzt von Kästner u. Link. Bd. 12, pp. 75-100, 149-171. 227-247. Leipzig, 1792, 8°.
1820. SCHÜBLER. In : MEMMINGER, J.-D.-G. Beschreibung oder Geographie und Statistik nebst einer Uebersicht der Geschichte von Würtemberg. Stuttgart u. Tübingen, 1820, 8°.
1828. SARS, M. Zoologiske Jagttagelser. In : Mag. for Naturvidenskaberne. Bd. 9, pp. 319-327, pl. 2. Christiania, 1828, 8°.
1830. TURTON, W. and KINGSTON, J.-F. The natural history of the District. In : CARRINGTON, N.-T. The Teignmouth, Dawlish and Torquay Guide. P. II. Teignmouth, 1830, 8°.
- [1831]. THOMPSON, J.-V. Zoological researches and illustrations. Vol. 1, P. 1. Cork [1831], 8°, pl.
1835. WAGNER, R. Ueber die Anwendung histologischer Charactere auf die zoologische Systematik. In : Arch. für Anat., Physiol. u. wiss. Med. Jahrg. 1835, pp. 314-320. Berlin, 1834, 8° (p. 319).
Sur l'Hydre.
- 1836 (d). EHRENBERG. Bestätigung und nähere Bestimmung thier-

¹ Les 25 premières indications bibliographiques de cet index se rapportent à des ouvrages qui auraient dû figurer dans les périodes précédentes.

- loser lebender Polypenstöcke. In : Ber. über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandl. d. k. preuss. Akad. d. Wiss. Berlin, Jahrg. 1 (1836), p. 33. Berlin, 1836, 8°.
- 1837 (b). EHRENBERG. Mittheilung einer sehr einfachen Methode zum festhalten, vergleichen und aufbewahren der feinsten und vergänglichsten mikroskopischen Objekte. In : Abhandl. d. k. Akad. d. Wiss. Berlin, (1835), pp. 141-149. Berlin, 1837, 4° (p. 147).
Sur l'Hydre.
1839. BELLAMY, J.-C. The natural history of South Devon. Plymouth and London, 1839, 8°.
1839. EDWARDS, Milne. Remarques ... sur la réclamation insérée dans le compte-rendu de la dernière séance, par M. Bory Saint-Vincent, relativement aux observations de M. Nordmann sur les Campanulaires. In : C. R. Acad. Sc., vol. 9, pp. 745-748. Paris, 1839, 4°.
1843. COUCH, R.-Q. Notes on the vitality of the sheath of the Hydroidæ. In : The Zoologist, a popular miscellany of nat. Hist. conducted by E. Newmann. Vol. 1, pp. 205-211. London, 1843, 8°.
- 1843 (a). FORBES, E. Retrospective comments. In : Ann. and Mag. of nat. Hist., vol. 12, p. 40-42. London, 1843, 8°.
- 1843 (a). HASSALL, A. Observations on two of Professor Edward Forbes's « Retrospective comments ». In : Ann. and Mag. of nat. Hist., vol. 12, pp. 117-120. London, 1843, 8°.
- 1844 (c). ALLMAN. On a new genus of Hydraform Zoophytes. In : Proc. R. Irish Acad., vol. 2, p. 395. Dublin, 1844, 8°.
1845. BAUMGÄRTNER, K.-H. Neue Untersuchungen in den Gebieten der Physiologie und der praktischen Heilkunde. Freiburg, 1845, 8°, pl.
1845. NORDMANN (von), A. Versuch einer Natur- und Entwicklungsgeschichte des Tergipes Edwardsii. In : Mém. présentés à l'Acad. Imp. des Sc. St-Petersbourg par divers savants,

- tome 4, pp. 495-600, pl. 1-5. St-Pétersbourg, 1845, 4° (note p. 582).
1846. DUCHASSAING, P. et MICHELIN, H. Note sur deux Polypiers de la famille des Coraux, appartenant aux genres *Solanderia* et *Pterogorgia*. In : *Rev. Zool.* par la Soc. cuvierienne (1846), pp. 218-220. Paris, 1846, 8°.
1847. THOMSON, A. On the co-existence of ovigerous and spermatie capsules on the same individuals of the *Hydra viridis*. In : *Edinburgh new philos. Journ.*, vol. 42, pp. 281-289. pl. 4. Edinburgh, 1847, 8°. — Résumé dans : *Proc. R. Soc. Edinburgh*, vol. 2 (1844-1850), p. 123-124. Edinburgh, 1851, 8°.
1848. ECKER, A. Zur Lehre vom Bau und Leben der contractilen Substanz der niedersten Thiere. Basel [1848], 4°, 1 pl. — Et in : *Zeitsch. f. wiss. Zool.*, Bd. 1, pp. 218-245, pl. 18. Leipzig, 1849, 8°.
1849. AGASSIZ, L. Twelve lectures on Comparative Embryology delivered before the Lowell Institute in Boston, December and January 1848-49. Boston, 1849, 8° (p. 39). (Originally reported and published in the *Boston Daily Evening Traveller*).
1849. KÖLLIKER, A. Das Sonnenthierchen, *Actinophrys sol.* In : *Zeitsch. f. wiss. Zool.*, vol. 1, pp. 198-217, pl. 17. Leipzig, 1849, 8°.
- Sur l'histologie de l'Hydre.
1849. OWEN, R. On parthenogenesis or the successive production of procreating individuals from a single ovum. London. 1849, 8°, pl.
1850. PEACH, C.-W. Observations on the luminosity of the Sea, with descriptions of several of the objects which cause it, some new to the British coasts. In : 31st ann. Rep. R. Institut. Cornwall (1849), pp. 43-53, pl. 1-3. Truro, 1850, 8°.
1850. SCHULTZE, M.-S. Ueber die männlichen Geschlechtstheile

der *Campanularia geniculata*. In : Arch. f. Anat., Physiol. u. wiss. Med., Jahrg. 1850, pp. 53-64, pl. 1. Berlin, 1850, 8°.

1851 (a). AGASSIZ [L.]. [On the little bodies seen on Hydra]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 3, 1848-1851, p. 354. Cambridge, 1851, 8°.

1851 (b). AGASSIZ [L.]. [A new Naked-eyed Medusa... *Rhacostoma atlanticum*]. In : Proc. Boston, Soc. nat. Hist. vol. 3 (1848-51) pp. 342-343. Cambridge, 1851, 8°.

1851. BRULLÉ, M. Quelques observations concernant les Polypes d'eau douce. In : Mem. Acad. Dijon (2), tome 1, P. sc., pp. 47-56. Dijon, 1851, 8°.

1851. BUSCH, W. Beobachtungen über Anatomie und Entwicklung einiger wirbelloser Seethiere. Berlin, 1851, 4°, pl.

1851. BUSK, G. A list of Sertularian Zoophytes and Polyzoa from Port Natal, Algoa Bay, and Table Bay, in South Africa; with remarks on their geographical distribution, and observations on the genera *Plumularia* and *Catenicella*. In : Rep. 20th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Edinburgh, 1850), P. 2, pp. 118-120. London, 1851, 8°.

*1851. CARPENTER, W.-B. Principles of physiology, general and comparative, Edit. 3. London, 1851, 8°.
Généralités.

1851. COHN, F. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Infusorien. In : Zeitsch. für wiss. Zool., vol. 3, pp. 257-279, pl. 7. Leipzig, 1851, 8°.
Sur l'Hydre.

1851 (a). COUCH, R. Q. On the morphology of the different organs of Zoophytes. In : Trans. nat. Hist. and Antiquarian Soc. Penzance. Vol. 1 (Report for 1845), pp. 23-29, pl. B. Penzance, 1851, 8°.

1851 (b). COUCH, R. Q. On the causes of the great vital powers of the Hydra, or Fresh-water Polypus. In : Trans. nat. Hist.

and Antiquarian Soc. Penzance. Vol. 1 (Report for 1845), pp. 369-376. Penzance, 1851, 8°.

Sur l'Hydre.

1851 (a). DESOR. [Zoölogical investigations among the shoals of Nantucket]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 3 (1848-1851), pp. 65-68. Cambridge, 1851, 8°.

1851 (b). DESOR. [A species of the genus *Syncoryne*]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 3 (1848-1851), pp. 133-135. Cambridge, 1851, 8°.

1851 (c). DESOR. [The development and transformation of the common Jelly-Fish of Boston harbor, *Aurelia aurita* Müll.] In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 3 (1848-51), pp. 137-140. Cambridge, 1851, 8°.

1851 (d). DESOR. [The embryonic development of *Campanularia*]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 3 (1848-1851), pp. 158-160. Cambridge, 1851, 8°.

1851. ECKER. Ueber die Fortpflanzung und Entwicklung der *Hydra viridis*. In : Bericht über die Verhandl. d. naturf. Ges. Basel (1848-50), vol. 9, pp. 60-62. Basel, 1851, 8°.

1851. FORBES, E. Report on the investigation of British marine Zoology by means of the dredge. P. I. The infralittoral distribution of marine Invertebrata on the southern, western and northern coasts of Great Britain. In : Rep. 20th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Edinburgh, 1850), P. 1, pp. 192-263. London, 1851, 8°.

1851 (a). FORBES, E. On a species of *Aequorea* inhabiting the British Seas. In : Proc. zool. Soc. London, vol. 19, pp. 272-275, pl. 4. London, 1851, 8°.

1851. FREY, H. Die Hartgebilde der niedersten Thiere. Polypen. In : Das mikroskopische Institut von August Menzel & Comp. Heft 2, pp. 16-18, pl. 1, fig. 4. Zurich, 1851, 8°.

1851. KROHN, A. Ueber *Podocoryna carnea* Sars und die Fortpflanzungsweise ihrer medusenartigen Sprösslinge. In : Arch.

- f. *Naturg.*, Jahrg. 17, Bd. 1, pp. 263-268. Berlin, 1851, 8°.
1851. LEUCKART, R. Ueber den Polymorphismus der Individuen, oder die Erscheinung der Arbeitstheilung in der Natur. Giessen, 1851, 4°.
1851. MITTLAND, R.-T. *Descriptio systematica animalium Belgii septentrionalis adjectis synonymis nec non locis in quibus reperiuntur, secundum classificationem Prof. J. van der Hoeven disposita.* — *Systematische Beschrijving der Dieren welke in Noord-Nederland of aan deszelfs Kusten voorkomen...* gerangschikt naar Prof. J. van der Hoeven's *Handboek der Dierkunde* (Edit. 2). Lugduni-Batavorum (Leyden), 1851, 8°.
1851. PEACH, C.-W. A description of some of the objects which cause the luminosity of the sea. In: 32nd ann. Rep. R. Institut. Cornwall (1850) pp. 20-21, pl. 1. Truro, 1851, 8°.
1851. SARS, M. Beretning om en i Sommeren 1849 foretagen Zoologisk Reise i Lofoten og Finmarken. In: *Nyt Mag. for Naturvidenskaberne*. Bd. 6, pp. 121-211. Christiania, 1851, 8°.
1851. SCHULTZE, M.-G. Beiträge zur Naturgeschichte der Turbellarien. Greifswald, 1851, 4°, pl.
1851. VOGT, C. *Zoologische Briefe. Naturgeschichte der lebenden und untergegangenen Thiere...*, 2 vol. Frankfurt a. M., 1851, 8°.
1852. BUSK, G. An account of the Polyzoa and Sertularian Zoophytes collected in the voyage of the « Rattlesnake » on the coast of Australia and the Lonsiade Archipelago. In: MACGILLIVRAY, J. *Narrative of the voyage of H. M. S. Rattlesnake commanded by the late Captain O. Stanley during the years 1846-1850*, vol. 1, Appendix IV, pp. 343-402, 1 pl. London, 1852, 8°.
- 1852 (a). BUSK, G. Observations on some part of the anatomy

of two species of Naked-eyed Medusæ. In : Trans. microsc. Soc. London, vol. 3, pp. 14-21, pl. 5-6. London, 1852, pet. 4°

1852 (b). BUSK, G. Observations on certain points in the anatomy of a species of *Thaumantias*. In : Trans. microsc. Soc. London, vol. 3, pp. 22-31, pl. 6-7. London, 1852, pet. 4°.

1852. COCKS, W.-P. Contributions to the Falmouth Fauna. In : 20th Annual Rep. R. Cornwall Polytechnic Soc., 1852, pp. 1-68. Falmouth and London, 1852, 8° (p. 22).

1852. EYDOUX et SOLEYET. Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la Corvette « La Bonite », commandée par M. Vaillant. Zoologie. Paris, 1841-1852, 2 vol. 8°, et atlas fol° (Zoophytes, vol. 2, 1852).

1852. HASSAL, A.-H. and COPPIN, J. Descriptions of three species of marine Zoophytes. In : Trans. microsc. Soc. London, vol. 3, pp. 160-163, pl. 21. London, 1852, pet. 4°.

1852. HINCKS, F. Notes on the reproduction of the Campanulariadae; with a description of a new species of *Laomedea*. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 10, pp. 81-87, pl. 3. London, 1852, 8°.

1852 (a). HUXLEY, Th.-H. An account of researches into the anatomy of the Hydrostatic Acalephæ. In : Rep. 21th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Ipswich, 1851), P. 2, pp. 78-80. London, 1852, 8°.

Généralités.

1852 (b). HUXLEY, Th. Upon animal individuality. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 9, pp. 505-509. London, 1852, 8°. — Et dans : Notices of the Proc. R. Institution, vol. 1 (1851-1854), pp. 184-189. London, 1854, 8°.

Généralités. Sur l'Hydre.

1852. LANDBOROUGH, D. A popular history of British Zoophytes or Corallines. London, 1852, 8°, pl.

1852. LEIDY. [On the nettling organs of the Hydra]. In : Proc.

Acad. nat. Sc. Philadelphia, vol. 5 (1850-1851), pp. 119-121.
Philadelphia, 1852, 8°.

Sur l'Hydre.

1852. MÜLLER, J. Ueber die Erzeugung von Schnecken und Holothuriern. In : Arch. f. Anat., Physiol. und wiss. Med., Jahrg. 1852, pp. 1-36. Berlin, 1852, 8° (p. 31 ss.).

Sur la génération alternante des Hydroides.

1852. SCHMIDT, O. Handatlas der vergleichenden Anatomie. Jena, 1852, 4°.

1852. THOMSON, W.-F.-C. Notes on some Scotch Zoophytes and Polyzoa. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 9, pp. 403-404, pl. 16. London, 1852, 8°.

1853. ALDER, J. In : COCKS, 1853 (a), p. 35.

1853 (a). ALLMAN, G.-J. On the anatomy and physiology of Cordylophora, a contribution to our knowledge of the Tubularian Zoophytes. In : Philos. Trans. R. Soc. London, vol. 143, P. 1, pp. 367-384, pl. 25-26. London, 1853, 4°.

1853 (b). ALLMAN. [On the Claviform and Sertularian Zoophytes.] In : Proc. R. Irish Acad., vol. 5, p. 297. Dublin, 1853, 8°.

1853 (c). ALLMAN. [On the structure of Hydra]. In : Proc. R. Irish Acad., vol. 5, pp. 444-445. Dublin, 1853, 8°.

1853 (d). ALLMAN. On the universality of a medusoid structure in the reproductive gemmæ of the Tubularian and Sertularian Polypes. In : Rep. 22th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Belfast, 1852), P. 2, pp. 70-71. London, 1853, 8°.

1853. CAVOLINI, F. Memorie postume sceverate dalle schede autografe di Filippo Cavolini per cura ed a spese di S. D.-Chiaie. Benevento, 1853, 4°.

1853. CHIAIE, S. D. In : CAVOLINI, 1853.

1853 (a). COCKS, W.-P. Contributions to the fauna of Falmouth. In : 21st annual Rep. R. Cornwall Polytechnic Soc., 1853, pp. 28-36. Falmouth and London, 1853, 8°.

1853 (b). COCKS, W.-P. Spadix purpurea, Gosse. In : Ann.

and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 12, p. 365. London, 1853, 8°.

1853. ECKER, A. Entwicklungsgeschichte des grünen Armpolypen. In : Programm ... Universität, 26 pp., 1 pl. Freiburg i. Brisgau, 1853, 4°.

1853. FORBES, E. On some remarkable marine Invertebrata new to the British Seas. In : Trans. R. Soc. Edinburgh, vol. 20, pp. 307-315, pl. 9-10. Edinburgh, 1853, 4°.

1853. GEGENBAUR. Recherches sur le mode de reproduction et sur le développement dans divers groupes de Zoophytes et de Mollusques. In : C. R. Acad. Sc., vol. 37, pp. 493-496. Paris, 1853, 4°.

1853. GEGENBAUR, C., KÖLLIKER, A. u. MÜLLER, H. Bericht über einige im Herbste 1852 in Messina angestellte vergleichend-anatomische Untersuchungen. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 4, pp. 298-370. Leipzig, 1853, 8°.

1853 (a). GOSSE, P.-H. A naturalist's rambles on the Devonshire coast. London, 1853, 8°.

1853 (b). GOSSE, P.-H. Notes on some new or little-known marine animals. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 12, pp. 124-128, 153-159, 384-386. London, 1853, 8°.

1853. HINCKS, F. Further notes on British Zoophytes, with description of new species. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 11, pp. 178-185, pl. 5-6. London, 1853, 8°.

1853 (a). KÖLLIKER, A. [Polypen-Quallen]. In : C. GEGENBAUR, A. KÖLLIKER u. H. MÜLLER, 1853.

1853 (b). KÖLLIKER, A. Die Schwimmpolypen oder Siphonophoren von Messina. Leipzig, 1853, 4°.

Généralités. Relations des Siphonophores avec les Hydroïdes.

1853 (a). KROHN, A. Ueber einige niedere Thiere. In : Archiv für Anat., Physiol., u. wiss. Med., Jahrg. 1853, pp. 137-141. Berlin, 1853, 8°.

1853 (b). KROHN, A. Ueber die Brut des Cladonema radiatum

- und deren Entwicklung zum Stauridium. In : Archiv für Anat., Physiol. u. wiss. Med., Jahrg. 1853, pp. 420-426, pl. 13. Berlin, 1853, 8°.
- 1853 (a). LAURENT. Sur la fécondation de l'Hydre vulgaire. In : C. R. Soc. de Biologie (1), vol. 5, février et mars 1853, pp. 15-16. Paris, 1854, 8°.
- 1853 (b). LAURENT. Observations sur l'Hydre grise. In : C. R. Soc. de Biologie (1), vol. 5, avril 1853, p. 39. Paris, 1854, 8°.
1853. LEUCKART, R. Zoologische Untersuchungen. I Siphonophoren. Giessen, 1853, 4°, pl.
1853. MUMMERY, J.-B. On the development of Tubularia indivisa. In : Trans. microsc. Soc. London (2), vol. 1, pp. 28-30, pl. 4. London, 1853, 8°.
1853. ROUGET, C. Etudes anatomiques et physiologiques sur les Invertébrés. Polypes Hydriques. In : C. R. et Mém. Soc. de Biologie, tome 4 (1852), pp. 387-412, pl. 6-7. Paris, 1853, 8°.
1853. SARS, M. Bemaerkninger over det Adriatiske Havs Fauna sammenlignet med Nordhavets. In : Nyt Mag. for Naturvidenskaberne, Bd. 7, pp. 367-397. Christiania, 1853, 8°.
- 1853 (a). THOMSON, W.-T.-C. On the character of the Sertularian Zoophytes. In : Rep. 22th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Belfast, 1852), P. 2, p. 78. London, 1853, 8°.
- 1853 (b). THOMSON, W. Notes on some British Zoophytes. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 11, pp. 442-444, pl. 16 A. London, 1853, 8°.
1853. WESTENDORP, G.-D. Polypiers flexibles de la Belgique-Collection de Bryozaires, Sertulaires, Flustres et Spongiaires qu'on rencontre en Belgique et particulièrement aux environs d'Ostende, 1^{re} livraison. Coutrai, 1853, 4°.

Nous n'indiquons cet ouvrage qu'à titre de curiosité et parce qu'il est quelquefois cité. Ce n'est pas, en effet, une description d'espèces des côtes de la Belgique, mais bien une sorte d'herbier contenant des animaux séchés

et collés sur des feuilles de papier que l'auteur avait réunies en une livraison avec titre imprimé. Il est donc impossible aujourd'hui de reconnaître avec certitude les espèces dont il s'agit.

1853. WILLIAMS, T. On the mechanism of aquatic respiration and on the structure of the organs of breathing in Invertebrate animals. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 12, pp. 243-261, pl. 12. London, 1853, 8°.

1854. ALLMAN. On the structure of *Hydra viridis*. In : Rep. 23th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Hull, 1853), P. 2, pp. 64-65. London, 1854, 8°.

1854. AYRES, W.-O. [Description of a new species of Polyp... *Globiceps tiarella* Ayres]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 4 (1851-54), pp. 193-195. Boston, 1854, 8°.

1854. FORBES, E. Note on *Spadix purpurea*, Gosse. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 13, pp. 31-32. London, 1854, 8°.

1854. GAY, C. Historia física y política de Chile, 8 vol. Paris. 1847-54, 8° (vol. 8, 1854).

1854. GEGENBAUR, C. Zur Lehre vom Generationswechsel und der Fortpflanzung bei Medusen und Polypen. In : Verh. physic.-med. Ges. Würzburg, Bd. 4, pp. 154-221, pl. 1-2. Würzburg, 1854, 8°.

1854. IRVINE, A. Catalogue of Zoophytes found in Dublin Bay and in its vicinity. In : Nat. Hist. Review, vol. 1, pp. 244-247. Dublin, 1854, 8°.

1854. LEYDIG. Einige Bemerkungen über den Bau der Hydren. In : Arch. für Anat., Physiol. und wiss. Med., Jahrg. 1854, pp. 270-283, pl. 10, fig. 3-11. Berlin, 1854, 8°.

1854. SCHMARDA, L.-K. Zur Naturgeschichte Aegyptens. In : Denksch. d. k. Akad. d. Wiss. Mathem.-Naturw. Classe, Bd. 7, P. 2, pp. 1-28, pl. 1-7. Wien, 1854, 4°.

1854. STEENSTRUP, J.-J.-S. En ny og tropisk Art af Smaaagoplerne Ammeskegt : *Corymorpha* Sars (*Corym. Januarii* Stp.).

- In : Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjöbenhavn for 1854, n° 1-3 (1854), pp. 46-48. Kjöbenhavn, 1855, 8°. — En allemand dans : Zeitschr. f. d. gesammten Naturw., Bd. 5, pp. 108-111. Berlin, 1855, 8°.
1854. STIMPSON, W. Synopsis of the marine Invertebrata of Grand Manan : or the region about the mouth of the Bay of Fundy, New Brunswick. In : Smithsonian Contributions to Knowledge, vol. 6, art. 6, 66 pp., 3 pl. Washington, 1854, 4°.
1854. THOMSON, W. On the analogy between the processes of reproduction in the plant and in the Hydroid Zoophyte. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 14, pp. 313-314. London, 1854, 8°.
1855. ALLMAN, G.-J. [On the existence of a true medusoid structure in the male gemmæ of Hydra]. In : Proc. R. Irish Acad., vol. 6, P. 2 (1855), pp. 155-157. Dublin, 1856, 8°.
1855. [BUSK, G.]. Zoophytology. In : Quart. Jour. microsc. Sc., vol. 3, pp. 253-256, pl. 1-2. London, 1855, 8°.
1855. GOSSE, P.-H. A manual of marine Zoology for the British Isles. 2 vol., fig. London, 1855-56, 8° (Zoophytes, vol. 1 1855).
1855. HINCKS, T. Notes on British Zoophytes, with description of new species. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 15, pp. 127-130, pl. 2-3. London, 1855, 8°.
1855. LEIDY, J. Contributions towards a knowledge of the marine Invertebrate fauna of the coasts of Rhode Island and New-Jersey. In : Journ. Acad. nat. Sc. Philadelphia, (2), vol. 3, P. II, 1855, pp. 135-138, pl. 10-11. Philadelphia, 1855-58, 4°.
- 1855 (a). LINDSTRÖM, G. Bidrag till Kännedomen om Osternjös Invertebrat-fauna. In : Ofversigt af K. Vetenskaps-Akad. Förhandlingar. Årg. 12, n° 2, Febr. 1855, pp. 49-73. Stockholm, 1856, 8°.
- 1855 (b). LINDSTRÖM. Om utvecklingen af Sertularia pumila L.

- In : Öfversigt af K. Vetenskaps-Akad. Förhandlingar. 12 Årg., n° 8, oct. 1855, pp. 365-374, pl. 13 A. Stockholm, 1856. 8°.
1855. TEMPLER, W. F. Some remarks on the Marine fauna of the South of Devon. In : The Zoologist; a popular Miscellany of nat. Hist. conducted by E. Newman, vol. 13, pp. 4575-4578. London, 1855, 8°.
- 1856 (a). ALDER, J. A notice of some new genera and species of British Hydroid Zoophytes. In. Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 18, pp. 353-362, pl. 12-14. London 1856, 8°. — Un résumé de ce travail a paru comme communication préliminaire dans : Rep. 26th Meet. Brit. Ass. Adv. Sc. (Cheltenham. 1856), P. 2, pp. 90-91. London, 1857, 8°.
- 1856 (b). ALDER, J. Description of three new British Zoophytes. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 18, pp. 439-441. pl. 16. London, 1856, 8°.
1856. AYRES. [On the american Hydras]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist. (1854-56), vol. 5, pp. 103-104. Boston, 1856, 8°.
- 1856 (a). GEGENBAUR, C. Bemerkungen über die Randkörper der Medusen. In : Archiv für Anat., Physiol. u. wiss. Med., Jahrg. 1856, pp. 230-250, pl. 9. Berlin, 1856, 8°.
- 1856 (b). GEGENBAUR, C. Versuch eines Systemes der Medusen mit Beschreibung neuer oder wenig gekannter Formen; zugleich ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna des Mittelmeeres. In : Zeitsch. für wiss. Zool., Bd. 8, Heft 2 (1856), pp. 202-273, pl. 7-10. Leipzig, 1857, 8°.
1856. GOSSE, P.-H. Tenby; a Sea-side holiday. London, 1856. 8°, pl.
1856. HINCKS, T. Note on Reticularia immersa and Halia præ-tenuis. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (2), vol. 18, pp. 469-471. London, 1856, 8°.
1856. HUXLEY, T.-H. Lectures on general natural history. Lec-

- tures I-IV. In : *Medical Times and Gazette*, vol. 33 (new series, vol. 12), pp. 429-432; 481-484; 507-511 et 563-567. London, 1856, 4°.
1856. LEUCKART, R. Beiträge zur Kenntniss der Medusenfauna von Nizza. In : *Arch. f. Naturg.*, Jahrg. 22, Bd. 1, pp. 1-40, pl. 1-2. Berlin, 1856, 8°.
1856. PEACH, C.-W. Notice of a curious metamorphosis in a Polype-like animal. In : *Ann. and Mag. of nat. Hist.* (2), vol. 18, pp. 99-101, pl. 8. London, 1856, 8°. — Résumé dans : *Edinburgh new philos. Journ.* (new series), vol. 4, pp. 162-164, figg. Edinburgh, 1856, 8°, — et dans : *Proc. R. phys. Soc. Edinburgh* (1854-58), vol. 1, pp. 59-61, fig. Edinburgh, 1858, 8°.
1856. THOMPSON, W. The natural history of Ireland. 4 vol. London, 1849-56, 8° (vol. 4, Invertebrata).
1856. WRIGHT, T.-S. On the reproduction of *Cy dippe pomiformis*. In : *Edinburgh new philos. Journ.* (new series), vol. 4, pp. 85-92. Edinburgh, 1856, 8°, — et dans : *Proc. R. phys. Soc. Edinburgh* (1854-58), vol. 1, pp. 63-70. Edinburgh, 1858, 8°.
1857. AGASSIZ, L. [Classification of Polypes]. In : *Proc. american Acad. Arts and Sc.*, vol. 3 (1852-57), pp. 187-190. Boston and Cambridge, 1857, 8°.
- Généralités sur la classification.
1857. [BUSK, G.]. Zoophytology. In : *Quart. Journ. microsc. Sc.*, vol. 5, pp. 172-174. London, 1857, 8°.
1857. CARUS, J.-V. *Icones zootomicæ. Erste Hälfte: Die wirbellosen Thiere.* Leipzig, 1857, fol., pl.
1857. EDWARDS, Milne. *Histoire naturelle des Coralliaires ou Polypes proprement dits.* 3 vol. et atlas, Paris, 1857-60. 8°.
- (Vol. 1, 1857).
- Sur Solanderia.
1857. GOSSE, P.-H. On a new form of Corynoid Polypes. In :

- Trans. linnean Soc., vol. 22, P. 2, pp. 113-116, pl. 20. London, 1857, 4°.
1857. GREENE, J.-R. On the Acalephæ of the Dublin Coast ; being part I of a series of « Notes on marine Zoology ». In : Nat. Hist. Review, vol. 4. Proc. of Soc., pp. 175-176 ; 242-250, pl. 14-15. London, 1857, 8°. — Résumé dans : Rep. 27th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Dublin, 1857), P. 2, p. 103. London, 1858, 8°.
1857. LEYDIG, F. Lehrbuch der Histologie des Menschen und der Thiere. Frankfurt a. M., 1857, 8°.
1857. LOVÉN, C. Till ntvecklingen af Hydractinia. In : Öfversigt K. Vetensk. Akad. Forhandl. Årg. 14, n° 8 (14 oct. 1857), pp. 305-313, pl. 4. Stockholm, 1858, 8°.
1857. MÖRCH, O.-A.-L. Fortegnelse over Grønlands Bløddyr. Prodrômus faunæ Moluscorum Grönlandiæ. Kjøbenhavn, 1857, 8°. — Tirage à part d'un mémoire publié dans : RINK, H. Grønland Geographisk og Statistisk beskrevet, 2 Bd. Kjøbenhavn, 1857, 8°. — En allemand par Von Etzel. Stuttgart. 1860, 8°.
- 1857 (a). SARS, M. Bidrag til kundskaben om middelhavets Littoral-Fauna, Reisebemærkninger fra Italien. I Classis : Polypi. In : Nyt Mag. for Naturvidenskaberne, Bd. 9, pp. 110-164, pl. 1-2. Christiania, 1857, 8°. (Pour la suite de ce mémoire voir à 1859).
- 1857 (b). SARS [M.]. [Oplysninger om Pennatula stellifera Mull., Corrynactis mediterranea, Tubularia larynx, Podocoryne fuscicola og Myriothele arctica. In : Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres, 7 Møde, pp. 192-202. Christiania, 1857, 8°.
- 1857 (c). SARS [M.]. [Nogle Ord om Medusernes Udvikling]. In : Forhandlinger ved de Skandinaviske Naturforskeres, 7 Møde. pp. 232-238. Christiania, 1857, 8°. — Et dans : Nyt Mag. for Naturvidenskaberne, Bd. 9, pp. 334-341. Christiania,

1857, 8°. — En allemand dans : Arch. f. Naturg., Jahrg. 23, pp. 117-123. Berlin, 1857, 8°.

Généralités.

1857. TRASK. [On nine new species of Zoöphytes from the Bay of San Francisco and adjacent localities]. In : Proc. California Acad. nat. Sc., vol. 1 (1854-57), Edit. 2, pp. 112-115, pl. 4-5. San Francisco, 1873, 8°.

Ces Proceedings de 1854 à 1857 ont paru à l'origine dans un journal local « The Pacific ». La California Academy of nat. Sc. les a fait réimprimer en 1873. Les citations que nous ferons du mémoire de TRASK seront empruntées à cette seconde édition mais figureront néanmoins avec la date de 1857.

1857 (a). WRIGHT, T.-S. On Hydractinia echinata. In : Edinburgh new philos. Journ. (new serie), vol. 5, pp. 298-313, pl. 5 et 6. Edinburgh, 1857, 8°. — Et dans : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1854-58), vol. 1, pp. 192-207, pl. 8-9. Edinburgh, 1858, 8°.

1857 (b). WRIGHT, T.-S. Observations on british Zoophytes. In : Edinburgh new philos. Journ. (new series), vol. 6, pp. 79-90, pl. 2-3. Edinburgh, 1857, 8°.

Contient : On Clava — Eudendrium — Eudendrium sessile.

— Et dans : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh, vol. 1, pp. 226-237, pl. 11-12. Edinburgh, 1858, 8°.

1857 (c). WRIGHT, T.-S. Observations in british Zoophytology. In : Edinburgh new philos. Journ. (new series), vol. 6, pp. 168-169. Edinburgh, 1857, 8°.

Contient : Trichydra pudica — Laomeda acuminata.

Communication préliminaire de 1858 (a), pp. 254-258.

1858. ALDER, J. A catalogue of the Zoophytes of Northumberland and Durham. In : Trans. Tyneside Nat. Field Club, vol. 3 (1854-58), pp. 93-162, pl. 3-10. Newcastle-Upon-Tyne, 1858, 8°. — Résumé dans : Quart. Journ. microsc. Sc., vol. 5, pp. 242-249. London, 1857, 8°.

1858. BENEDEN (van). [Tubulaires d'eau douce]. In : Bull. Acad. R. Sc. Belgique (2), tome 5, p. 125. Bruxelles, 1858, 8°.

1858. COBBOLD, T.-S. Description of a new form of Naked-eyed Medusa (*Thaumantias achroa*), with histological details. In : Quart. Journ. microsc. Sc., vol. 6, pp. 1-5, pl. 1. London, 1858, 8°. — Résumé dans : Journ. of the Proc. linnean Soc. (Zool.), vol. 2, pp. 38-39. London, 1858, 8°.
1858. COSTE. Reproduction des Polypiers marins dans les aquariums. In : C. R. Acad. Sc., vol. 46, pp. 710-711. Paris, 1858, 4°.
1858. GREENE, J.-R. [The present state of our knowledge of the Cœlenterata]. In : Proc. Dublin University zool. and bot. Assoc., vol. 1 (P. 1, 1858), pp. 52-55. Dublin, 1859, 8°.
Généralités sur la classification.
1858. [JOHNSON, J.-Y.] Zoophytology. In : Quart. Journ. microsc. Sc., vol. 6, pp. 124-130, pl. 18-19. London, 1858, 8°.
1858. LEWES, G.-H. Sea-side studies at Ilfracombe, Tenby, the Scilly Isles, and Jersey. Edinburgh and London, 1858, 8°.
1858. THOMPSON, W. On dredging in Weymouth Bay. In : Rep. 27th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Dublin, 1857), P. 2, p. 108. London, 1858, 8°.
- 1858 (a). WRIGHT, T.-S. Observations on British Zoophytes. In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1854-58), vol. 1, pp. 253-258; 263-267; 338-342; 447-455; pl. 13-15, 19, 22-24. Edinburgh, 1858, 8°.
- Contient : p. 254, *Laomedea acuminata*; p. 257, *Trichydra pudica*; p. 263, On *Tubularia indivisa*; p. 338, *Coryne gravata*; p. 240, *Stauridia producta*; p. 447, On *atractylis*; p. 448, note, On the reproduction of *E. rammeum*; p. 449, note, Note on the development of *Bougainvillea britannica* from *Atractylis ramosa*; p. 450, On the fixed Medusoid of *Laomedea dichotoma*; p. 453, *Sertularia fallax*; p. 453, On the reproductive organs of *Laomedea geniculata*; p. 454, *Laomedea lacerata*.
- Et dans : Edinburgh new philos. Journ. (new series), vol. 7, pp. 108-117; 282-286, pl. 1-3 et 7; vol. 9, pp. 106-117, pl. 1-3. Edinburgh, 1858 et 1859, 8°.

- 1858 (b). WRIGHT, T.-S. On reproduction by ova from the Medusoid of *Campanularia Johnstoni*. In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1854-58), vol. 1, pp. 369-370, pl. 19. Edinburgh, 1858, 8°. — Et dans : Edinburgh new philos. Journ. (new series), vol. 7, pp. 286-287. Edinburgh, 1858, 8°.
- 1858 (c). WRIGHT, T.-S. On monœcious reproduction in *Tubularia larynx*. In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1854-58), vol. 1, p. 432. Edinburgh, 1858, 8°.
- 1858 (d). WRIGHT, T.-S. ... A specimen of the *Hydra tuba* (Dalyell) throwing of Medusæ — ... *Myriothela arctica* of Sars. In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1854-58), vol. 1, pp. 432-433. Edinburgh, 1858, 8°.
1859. ALDER, J. Descriptions of three new species of Sertularian Zoophytes. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 3, pp. 353-356, pl. 12-14. London, 1859, 8°. — Résumé dans : Rep. 28th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Leeds, 1858), P. 2, p. 125. London, 1859, 8°.
- Article reproduit en partie dans : Trans. Tyneside Nat. Field Club, vol. 4 (1858-60), pp. 177-179, pl. 11-12. Newcastle-Upon-Tyne, 1860, 8°, sous le titre : « Description of two new species of Sertularian Zoophytes found on the Coast of Northumberland ».
- 1859 (a). ALLMAN. On the reproductive organs of *Sertularia tamarisca*. In : Rep. 28th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Leeds, 1858), P. 2, pp. 119-120. London, 1859, 8°. — Et in : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 3, pp. 238-240. London, 1859, 8°.
- 1859 (b). ALLMAN. Notes on the Hydroid Zoophytes. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 4, pp. 48-55 ; 137-144 ; 367-370. London, 1859, 8°. — Résumé en partie dans : Rep. 29th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Aberdeen, 1859), P. 2, pp. 142-143. London, 1860, 8°.
- 1859 (c). ALLMAN. Additional observations on the morphology of the reproductive organs in the Hydroid Polypes. In : Edinburgh new philos. Journ. (new series), vol. 9, pp. 307-317.

- Edinburgh, 1859, 8°. — Et dans : Proc. R. Soc. Edinburgh, vol. 4, pp. 123-137. Edinburgh, 1862, 8°.
1859. BENEDEN (van). Observations relatives à la reproduction de divers Zoophytes et à la transformation du *Trichina spiralis* en *Trichocephalus*; extrait d'une lettre de M. van Beneden, en date du 23 août, adressée à M. Milne Edwards. In : C. R. Acad. Sc., vol. 49, pp. 452-453. Paris, 1859, 4°.
1859. DANA, J.-D. Synopsis of the report on Zoophytes of the U. S. Exploring Expedition around the world under C. Wilkes, U. S. N. Commander, in the years 1838-1842. New Haven, [1859], 8°. (Edition abrégée du texte de DANA, 1846-49).
- *1859. GEGENBAUR, C. Grundzüge der vergleichenden Anatomie. Leipzig, 1859, 8°.
- Généralités. Anatomie.
1859. GREENE, J.-R. On the morphology of the Hydrozoa, with reference to the constitution of the Sub-Kingdom Cœlenterata. In : Nat. Hist. Review, vol. 6, pp. 237-239. London, 1859, 8°.
- Et dans Proc. R. Irish Acad., vol. 7, pp. 119-121. Dublin, 1862, 8°.
- 1859 (a). HINCKS, T. On a new species of *Laomedea*; with remarks on the genera *Campanularia* and *Laomedea*. In : Rep. 28th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Leeds, 1858), P. 2, p. 126. London, 1859, 8°. — Et dans : Quart. Journ. microsc. Sc., vol. 7, p. 131. London, 1859, 8°.
- 1859 (b). HINCKS, T. On some new and interesting forms of british Zoophytes. In : Rep. 28th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Leeds, 1858), P. 2, p. 128. London, 1859, 8°. — Résumé dans : Quart. Journ. microsc. Sc., vol. 7, p. 131. London, 1859, 8°.
1859. HUXLEY, T.-H. The oceanic Hydrozoa; a description of the Calyophoridae and Physophoridae observed during the voyage of H. M. S. « Rattlesnake », in the years 1846-50. London, 1859, 4°, pl. (Publication de la Ray Society pour l'année 1858).

- 1859 (a). MC CRADY, J. Description of Oceania (*Turritopsis*) *nutricula* nov. spec. and the embryological history of a singular Medusan larva, found in the cavity of its bell. In : Proc. Elliott Soc. nat. Hist. of Charleston, South-Carolina, vol. 1 (1853-58), pp. 55-90, pl. 4-7. Charleston, 1859, 8°.
- 1859 (b). MC CRADY, J. *Gymnophthalmata* of Charleston Harbor. In : Proc. Elliott Soc. nat. Hist. of Charleston, South-Carolina, vol. 1 (1853-58), pp. 103-221, pl. 8-12. Charleston, 1859, 8°.
1859. PATTERSON, R. On a new Naked-eyed Medusa. In : Proc. Dublin Univers. zool. and bot. Assoc. vol. 1 (P. 3), pp. 279-281, fig. Dublin, 1859, 8°.
1859. SARS, M. Bidrag til Kundskaben om Middelhavets Littoral-Fauna, Reisebemærkninger fra Italien. II Classis : Hydromedusæ. In : *Nyt Mag. for Naturvidenskaberne*, Bd. 10, pp. 1-99, 2 pl. Christiania, 1859, 8°.
1859. STIMPSON, W. *Prodromus descriptionis animalium evertibratorum, quæ in Expeditione ad Oceanum Pacificum Septentrionalem, a Republica Federata missa, Cadwaladaro Ringgold et Johanne Rodgers Ducibus, observavit et descripsit W. Stimpson. P. VII, Crustacea anomoura.* In : Proc. Acad. nat. Sc. Philadelphia (1858), pp. 225-252. Philadelphia, 1859, 8° (p. 249).
- 1859 (a). WRIGHT, T.-S. Observations on british Zoophytes. In : *Edinburgh new philos. Journ. (new series)*, vol. 10, pp. 105-114, pl. 8-9. Edinburgh, 1859, 8°.

Contient : On the reproduction of *Turris neglecta* — *Coryne implexa* (Alder) — *Coryne (margarica, mihi) implexa* (Alder) — *Bimeria vestita* — *Garveia nutans* — *Goodsirea mirabilis*, an undescribed *Gymnophthalmatus* Medusa — *Eudendrium arbuscula (mihi)*.

- Et pp. dans : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1859-62), vol. 2, pp. 34-36, 59-63, 80-82, pl. 3-4. Edinburgh, 1863, 8°.
- 1859 (b). WRIGHT, T.-S. Remarks on Professor Allman's

- « Notes on the Hydroid Zoophytes ». In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 4, pp. 174-175. London, 1859, 8°.
1860. ALDER, J. Descriptions of a Zoophyte and two species of Echinodermata new to Britain. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 5, pp. 73-75, pl. 5. London, 1860, 8°. — Résumé dans : Rep. 29th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Aberdeen, 1859), P. 2, p. 142. London, 1860, 8°.
- 1860 (a). ALLMAN. On a remarkable form of parasitisme among the Pycnogonidæ. In : Rep. 29th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Aberdeen, 1859), P. 2, p. 143. London, 1860, 8°.
- Parasitisme des Pycnogonides sur les Corynes.
- 1860 (b). ALLMAN. Note on the structure and terminology of the reproductive system in the Corynidae and Sertulariadae. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 6, pp. 1-5. London, 1860, 8°.
- 1860 (c). ALLMAN, G.-J. On the analogy between the structure of the Medusæ and Hydroid Polypes. In : Proc. nat. Hist. Soc. Dublin (Zool.), vol. 1 (1849-55), p. 35. Dublin, 1860, 8°.
1860. BOECK, C. [Tubularie fra Belsund paa Spitzbergen — Tubularia regalis]. In : Forhandl. i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar, 1859, pp. 114-117, pl. 3.
- *1860. BRONN, H.-G. Die Klassen und Ordnungen des Thierreichs, wissenschaftlich dargestellt in Wort und Bild, Bd. 2. Aktinozoen. Leipzig u. Heidelberg, 1860, 8°.
- Généralités et compilation.
1860. CLAPARÈDE, E. Beiträge zur Fauna der schottischen Küste. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., vol. 10, pp. 401-408, pl. 32. Leipzig, 1860, 8°.
1860. CLAUS, C. Ueber Physophora hydrostatica nebst Bemerkungen über andere Siphonophoren. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 10, pp. 295-332, pl. 25-27. Leipzig, 1860, 8°.
- Généralités. P. 300, note sur l'Hydre.
1860. GRAEFFE, E. Beobachtungen über Radiaten und Würmer,

- in Nizza. In : *Nouv. Mém. Soc. helvétique Sc. nat.*, vol. 17, 59 pp., 10 pl. Zürich, 1860, 4°.
1860. GREENE, J.-R. On *Sertularia tricuspidata*. In : *Ann. and Mag. of nat. Hist.* (3), vol. 5, pp. 431-432. London, 1860, 8°.
1860. HOUGHTON, W. On the *Hydra rubra* of M. Lewes. In : *Ann. and Mag. of nat. Hist.* (3), vol. 5, pp. 228-229. London, 1860, 8°.
1860. JÄGER, G. Ueber das spontane Zerfallen der Süßwasserpolypen nebst einigen Bemerkungen über Generationswechsel. In : *Sitzungsb. K. Akad. d. Wiss. math. naturw. Classe*, Bd. 39, pp. 321-340, 1 pl. Wien, 1860, 8°.
- 1860 (a). MURRAY, A. Description of new *Sertulariadae* from the Californian Coast. In : *Ann. and Mag. of nat. Hist.* (3), vol. 5, pp. 250-252, pl. 11-12. London, 1860, 8°. — Et dans : *Proc. R. physic. Soc. Edinburgh* (1859-62), vol. 2, pp. 146-149, pl. 6-7. Edinburgh, 1863, 8°.
- 1860 (b). MURRAY, A. *Sertularia tricuspidata*. In : *Ann. and Mag. of nat. Hist.* (3), vol. 5, p. 504. London, 1860, 8°.
1860. PEACH, C.-W. On the Zoophytes of Caithness. In : *Rep. 29th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc.* (Aberdeen, 1859), P. 2, p. 155. London, 1860, 8°.
1860. SARS, M. Udtog af en Afhandling, som med de tilhørende talrige Afbildninger er bestemt for næste Hefte af *Fauna littoralis Norvegiæ*, om Ammeslaegten *Corymorpha* og dens Arter samt de af disse opammede Meduser. In : *Forhandlinger i Vetenskabs-Selskabet i Christiania* (1859), pp. 96-105. Christiania, 1860, 8°. En allemand dans : *Arch. f. Naturg.*, Jahrg. 26, pp. 341-351. Berlin, 1860, 8°. — En anglais dans : *Ann. and Mag. of nat. Hist.* (3), vol. 8, pp. 363-360. London, 1861, 8°.
1860. LEWES, G.-H. New British species of *Hydra*. In : *Ann. and Mag. of nat. Hist.* (3), vol. 5, pp. 71-72. London, 1860, 8°.
- 1860-62. AGASSIZ, L. Contributions to the natural history of

- the United States of America. Second Monograph, vol. 3 and 4. Boston, 1860-62, 4°.
1861. ALLMAN. Notes on the Hydroid Zoophytes. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 8, pp. 168-173. London, 1861, 8°.
1861. BOECK, A. [Ny Arter af Acalepher]. In : Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania (1860), pp. 151-152. Christiania, 1861, 8°.
1861. BUSK, G. On a new Hydroid Polype belonging to the genus Cordylophora, Allm., discovered by Senator Kirchenpauer, of Ritzebüttel. In : Quart. Journ. microsc. Sc. (new series), vol. 1, pp. 283-284, pl. 9. London, 1861, 8°.
1861. DUCHASSAING, P. et MICHELOTTI, J. Mémoire sur les Coralliaires des Antilles. In : Mem. R. Accad. Sc. Torino, Sc. fisich. e mat. (2), vol. 19, pp. 279-365, pl. 1-10. Torino, 1861, 4°.
1861. EHRENBERG. [C.-G.]. [Hydra vulgaris]. In : Sitzber. d. Ges. Naturforsch. Freunde Berlin, Nov. 1861, p. 15. Berlin, [1861?], 4°.
1861. GREENE, J.-R. A manual of the Sub-Kingdom Cœlenterata. London, 1861, 8°, fig.
1861. GRUBE, A.-E. Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero. Beiträge zur Kenntniss der Thierwelt dieses Gebietes. Berlin, 1861, 8°, pl.
- 1861 (a). HINCKS, T. On Clavatella, a new genus of Corynoid Polypes, and its reproduction. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 7, pp. 73-81, pl. 7-8. London, 1861, 8°. — Résumé sous le titre : On the development of the Hydroid Polypes, Clavatella and Stauridia, with remarks on the relation between the Polypes and its medusoid, and between the Polyp and the Medusa. In : Rep. 31th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Manchester, 1861), P. 2, p. 145. London, 1862, 8°.
- 1861 (b). HINCKS, T. On new Australian Hydrozoa. In : Ann.

- and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 7, pp. 279-281, pl. 12-13. London, 1861, 8°.
- 1861 (c). HINCKS, Th. A catalogue of the Zoophytes of South Devon and South Cornwall. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 8, pp. 152-161; 251-262; 290-297; pl. 6-8. London, 1861, 8°.
1861. KEFERSTEIN, W. u. EHLERS, E. Zoologische Beiträge, gesammelt im Winter 1859-60 in Neapel und Messina. Leipzig, 1861, 4°, pl.
1861. KIRCHENPAUER. In : BUSK, G., 1861.
1861. KROHN, A. Beobachtungen über den Bau und die Fortpflanzung der Eleutheria Quatref. In : Arch. f. Naturg., Jahrg. 27, Bd. 1, pp. 157-170. Berlin, 1861, 8°.
1861. METTENHEIMER, C. Beobachtungen über niedere Seethiere. 5. Ueber eine neue kleine Hutquelle, Thaumantias versicolor n. sp. In : Abh. d. senckenberg. naturforsch. Ges., vol. 3, pp. 302-308, pl. 11, fig. 1-12. Frankfurt a. M., 1859-1861, 4°.
1861. SARS, [M.]. [Oplysninger om nogle Cœlenterater fra Norges Kyster]. In : Forhandlingar ved de Skandinaviske Naturforskeres, 8 møde, pp. 690-698. Kjøbenhavn, 1861, 8°.
- 1861 (a). WRIGHT, T.-S. On hermaphrodite reproduction in Chrysaora hyoscella. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 7, pp. 357-359, pl. 18. London, 1861, 8°.
- 1861 (b). WRIGHT, T.-S. Observations on British Protozoa and Zoophytes. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 8, pp. 120-135, pl. 3-5. London, 1861, 8°.
- Contient : Cionistes reticulata (nov. gen. and sp.) — Atractylis palliata n. sp. — Atractylis coccinea n. sp. — Hydractinia echinata.
- Ces articles sont reproduits avec quelques modifications dans : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1859-62), vol. 2, pp. 91; 250-251; 277-283; 283-286; pl. 11. Edinburgh, 1863, 8°.

- 1861 (c). WRIGHT, T.-S. Observations on British Zoophytes and Protozoa. On *Atractylis coccinea* (new species). In : Edinburgh new philos. Journ. (new series), vol. 14, p. 150. Edinburgh, 1861, 8°. — Et dans : Proc. R. phys. Soc. of Edinburgh (1859-62), vol. 2, p. 251. Edinburgh, 1863, 8°.
1862. AGASSIZ, A. The Acalephan fauna of the southern coast of Massachusetts (Buzzard's Bay). In : Proc. Boston Soc. nat. Hist., vol. 8 (1861-62), pp. 224-226. Boston, 1862, 8°.
- 1862 (a). AGASSIZ, A. In : AGASSIZ, L., 1860-62, vol. 4, 1862.
1862. ALDER, J. Descriptions of some new and rare Zoophytes found on the coast of Northumberland. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 9, pp. 311-317, pl. 13-15. London, 1862, 8°. — Résumé dans : Edinburgh new philos. Journ., vol. 15 (new ser.), p. 144. Edinburgh, 1862, 8°, — et dans : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1859-62), vol. 2, pp. 314-16, pl. 14. Edinburgh, 1863, 8°.
1862. ALLMAN. On the structure of the reproductive organs in certain Hydroid Polypes. In : Proc. R. Soc. Edinburgh, vol. 4 (1857-62), pp. 50-64. Edinburgh, 1862, 8°.
1862. CLAPARÈDE. [Le développement d'Hydroïdes marins appartenant au genre Tubulaire]. In : Verh. schweizerischen naturf. Ges. (Luzern, 1862), pp. 194-195. Luzern, 1862(?), 8°.
- 1862 (a). HINCKS, Th. A catalogue of the Zoophytes of South Devon and South Cornwall. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 9 (pp. 22-30), pl. 7, fig. 1-2. London, 1862, 8°.
- Rien dans le texte, mais voir la planche.
- 1862 (b). HINCKS, Th. A catalogue of the Zoophytes of South Devon and South Cornwall. Appendix. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 10, pp. 360-363. London, 1862, 8°.
- 1862 (c). HINCKS, Th. On the production of similar gonozooïds by Hydroid Polypes belonging to different genera. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 10, pp. 459-461, pl. 9. London, 1862, 8°. — Résumé in : Rep. 32th Meet. Brit. Assoc.

- Adv. Sc. (Cambridge, 1862), P. 2, pp. 107-108. London, 1863, 8°.
1862. HODGE, G. Observations on a species of Pycnogon (*Phoxichilidium coccineum*, Johnston) with an attempt to explain the order of its development. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 9, pp. 33-42, pl. 4-5. London, 1862, 8°.
- *1862. HOEVEN (van der). J. Eenige aanteekeningen over Martinus Slabber's Natuurkundige Verlustigingen ; benevens opgave der Systematische namen van de daarin afgebeelde diersorten. In : verslagen en Mededeelingen der K. Akad. Wetenschappen. Afd. Naturkunde, 14^e Deel, pp. 270-285. Amsterdam, 1862, 8°.
- Essai de détermination des espèces figurées par SLABBER en 1778.
1862. KEFERSTEIN, W. Untersuchungen über niedere Seethiere. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 12, Heft 1 (1862), pp. 1-147, pl. 1-11. Leipzig, 1863, 8°.
1862. KIRCHENPAUER. Die Seetonnen der Elbmündung. Ein Beitrag zur Thier- und Pflanzen-Topographie. In : Abhandl. a. d. Gebiete d. Naturwissenschaften, herausg. von d. Naturwiss. Verein Hamburg, Bd. 4, Abth. 3, 59 pp., 1 Carte. Hamburg, 1862, 4°.
1862. MEYER, H.-A. u. MÖBIUS, K. Kurzer Ueberblick der in der Kieler Bucht von uns beobachteten wirbellosen Thiere, als Vorläufer einer Fauna derselben. In : Arch. f. Naturg. Jahrg. 28, Bd. I, pp. 229-237. Berlin, 1862, 8°.
1862. NORMAN, A.-M. On the Crustacea, Echinodermata, and Zoophytes obtained in deep-sea dredging off the Shetland Isles in 1861. In : Rep. 31th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Manchester, 1861), P. 2, pp. 151-152. London, 1862, 8°.
- 1862 (a). WRIGHT, S. On reproduction in *Aequoria vitrina*. In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1859-62), vol. 2, pp. 316-318, pl. 15. Edinburgh, 1863, 8°. — Et dans : Edinburgh new philos. Journ., vol. 15 (new series), pp. 144-145.

- Edinburgh, 1862, 8°. — Et dans : Quart. Journ. Microsc. Sc. (new series), vol. 3, pp. 45-47. London, 1863, 8° (dans ce journal, le mémoire figure avec d'autres sous le titre : Observations on British Zoophytes).
- 1862 (b). WRIGHT, T.-S. Observations on British Zoophytes and Protozoa. In : Edinburgh new philos. Journ. (new series), vol. 16, p. 154. Edinburgh, 1862, 8°.
- Clava nodosa, Acharadria larynx.
- Communication incomplète, sans planches. Voir 1863 (b).
- 1862 (c). WRIGHT, T.-S. On the reproduction of *Thaumantias inconspicua*. In : Quart. Journ. microsc. Sc. (new serie), vol. 2, pp. 221-222 et 308. London, 1862, 8°.
1863. ALDER, J. Supplement to a catalogue of the Zoophytes of Northumberland and Durham. In : Trans. Tyneside Nat. Field Club, vol. 5 (1860-62), pp. 225-247, pl. 8-11. Newcastle-Upon-Tyne, 1863, 8°.
- 1863 (a). ALDER, J. Report on the Zoophytes. In : MENNEL. H.-T. Report of the dredging Expedition to the Dogger Bank and the coast of Northumberland. In : Trans. Tyneside Naturalists Field Club, vol. 5 (1860-62), pp. 288-290. Newcastle-Upon-Tyne, 1863, 8°.
- 1863 (a). ALLMAN. On the generative Zooid of *Clavatella*. In : Rep. 32th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Cambridge, 1862), P. 2, p. 100, London, 1863, 8°.
- 1863 (b). ALLMAN. Notes on the Hydroida. 1. On the structure of *Corymorpha nutans*. 2. Diagnoses of new species of Tubularidæ obtained, during the autumn of 1862, on the coasts of Shetland and Devonshire. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 11, pp. 1-12. London, 1863, 8°. — Résumé dans : Rep. 32th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Cambridge, 1862), P. 2, p. 1 et pp. 101-103. London, 1863, 8°.
- * 1863. CARUS, J.-V. Cœlenteraten. In : CARUS, J.-V. und GERSTAECKER, C.-E.-A. Handbnch der Zoologie, 2. Bd., Leipzig, 1863, 8°.

Cet ouvrage présente un résumé des travaux les plus importants sur les Hydroides et une nouvelle classification. L'auteur propose de donner aux Méduses d'Hydroides le nom du Polype, précédé du mot *Para*. Ex. : *Paracorymorpha* au lieu de *Steenstrupia*. — L'énumération des espèces citées dans ce Traité de Zoologie n'offrant pas d'intérêt spécial, nous ne les avons pas indiquées dans la Synonymie des espèces.

1863 (a). CLAPARÈDE, E. On the reproduction of a Medusa belonging to the genus *Lizzia*. In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1859-62), vol. 2, pp. 133-134. Edinburgh, 1863, 8°.

1863 (b). CLAPARÈDE, R.-E. Beobachtungen über Anatomie und Entwicklungsgeschichte wirbelloser Thiere an der Küste von Normandie angestellt. Leipzig, 1863, fol., pl.

* 1863. Contributions to the natural history of the United States of North America by Louis Agassiz. In : Nat. Hist. Review, 1863, pp. 344-359 et 479-497. London, 1863, 8°.

Généralités sur la classification des Hydroides et compte rendu de l'ouvrage d'AGASSIZ.

1863. FULLER, C.-B. Report on marine Zoology. In : 2^d annual Rep. nat. Hist. and Geol. of the State of Maine, 1862, pp. 129-133. S. l., 1863, 8°.

1863. HALLIER, E. Nordseestudien. Hamburg, 1863, 8°, pl. (p. 279).

1863. HENSEN, V. Studien über das Gehörorgan der Decapoden. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 13, pp. 319-412, pl. 19-22. Leipzig, 1863, 8° (p. 355, Rem.).

Remarque sur les otolithes des Eucopes.

1863. HINCKS, T. On some new British Hydroides. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 11, pp. 45-47. London, 1863, 8°.

L'auteur renvoie à la planche 9 du volume précédent. Voir HINCKS, 1862 [c].

1863 (a). HODGE, G. Contributions to the marine Zoology of Seaham Harbour. P. II. 5. Occurence of *Corymorpha nutans*

- at Seaham. In : Trans. Tyneside Naturalists Field Club, vol. 5 (1860-62), pp. 78-82, pl. 2. Newcastle-Upon-Tyne, 1863, 8°.
- 1863 (b). HODGE, G. On a new Hydroid Zoophyte (*Podocoryne Alderi*). In : Trans. Tyneside Naturalist Field Club, vol. 5 (1860-62), pp. 82-84, pl. 2. Newcastle-Upon-Tyne, 1863, 8°.
1863. MÜLLER, F. Ueber die Ursache der Strömungen in der Leibeshöhle der Sertularinen. In : Arch. f. Naturg., Jahrg. 29, Bd. I, pp. 34-36. Berlin, 1863, 8°.
1863. PACKARD, A.-S. A list of animals dredged near Caribou Island, Southern Labrador, during July and August 1860. In : Canadian Naturalist and Geologist, vol. 8, pp. 401-429, 2 pl. Montreal, 1863, 8°.
1863. SARS, M. Bemaerkninger over fire norske Hydroider. In : Forhandl. Vetenskabs-Selskabet i Christiania (1862), pp. 25-39. Christiania, 1863, 8°.
- 1863 (a). SARS, M. Geologiske og Zoologiske Jagttagelser, anstillede paa en Reise i en Deel af Trondhjems Stift i Sommeren 1862. In : Nyt Mag. for Naturvidenskaberne, vol. 12, pp. 253-340. Christiania, 1863, 8°.
1863. SEMPER, C. Reisebericht. Briefliche Mittheilung an A. Kölliker. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 13, pp. 558-569, pl. 38-39. Leipzig, 1863, 8°.
- Sur les nématocystes d'un Hydroïde.
- 1863 (a). WRIGHT, T.-S. On the cnidæ or thread-cells of the Eolidæ. In : Proc. R. physic. Soc. Edinburgh (1859-62), vol. 2, pp. 38-40. Edinburgh, 1863, 8°. — Et sous le titre : On the urticating filaments of the Eolidæ. In : Quart. Journ. microsc. Sc. (new series), vol. 3, pp. 52-55. London, 1863, 8°.
- 1863 (b). WRIGHT, T.-S. Observations on British Zoophytes. In : Proc. R. physic. Soc. Edinburgh (1859-62), vol. 2, pp. 91;

216-221; 250-253; 270-286; 349-352; 378-381; 439-442; pl. 9-12, 15, 17 et 22. Edinburgh, 1863, 8°.

Contient : *Kionistes retiformis* — On *Halcampa fultoni* (St. Wright) a parasitic *Actinia* — On hermaphrodite reproduction in *Chrysaora hyoscella* — *Atractylis palliata* n. sp. — *Atractylis coccinea* n. sp. — Appendix to *Kionistes reticularis* (*Kionistes retiformis*) printed at p. 94 — Appendix to *Hydractinia* printed at vol. 4, p. 192 — *Atractylis arenosa* — *Atractylis miniata* — *Laomedea decipiens* (n. sp.) — *Clava nodosa* n. sp. — *Acharadria larynx* — *Vorticlava proteus* — *Trichydra pudica* — On the development of *Pycnogon* larvæ within the Polyps of *Hydractinia echinata*.

— Et pp. dans : Quart. Journ. microsc. Sc. (new ser.), vol. 3, pp. 47-52, pl. 4-6. London, 1863, 8°.

1863 (c). WRIGHT, T.-S. In : CLAPARÈDE, 1863 (a).

1864. ALDER, J. Report on the Zoophytes. In : Report of dredging operations on the coasts of Northumberland and Durham, in July and August 1863. Edited by G.-S. Brady. In : Trans. Tyneside Naturalists Field Club, vol. 6 (1863-64), pp. 178-194 (191-193). Newcastle-Upon-Tyne, 1864, 8°.

1864 (a). ALLMAN, G.-J. Report on the present state of our knowledge of the reproductive system in the Hydroida. In : Rep. 33th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Newcastle-Upon-Tyne, 1863), pp. 351-426. London, 1864, 8°.

1864 (b). ALLMAN. On the occurrence of amœbiform protoplasm and the emission of pseudopodia, among the Hydroida. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 13, pp. 203-206, pl. 14. London, 1864, 8°. — Résumé dans : Proc. R. Soc. Edinburgh, vol. 5 (1862-66), pp. 158-159. Edinburgh, 1866, 8°.

1864 (c). ALLMAN. On the construction and limitation of genera among the Hydroida. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 13, pp. 345-380. London, 1864, 8°.

1864 (d). ALLMAN. Notes on the Hydroida. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 14, pp. 57-64, pl. 2. London, 1864, 8°.

1864. CLARK, H.-J. *Tubularia* not parthenogenous. In : Ameri-

- can Journ. of Sc. and Arts (2), vol. 37, pp. 61-66. New-Haven, 1864, 8°.
- 1864 (a). C[LARK], H.-J. Observations on the structure of Amœba and Actinophrys. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 14, pp. 394-397. London, 1864, 8°.
- Sur les nématocystes.
1864. CLAUS, C. Bemerkungen über Ctenophoren und Medusen. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 14, Heft 4, pp. 384-393, pl. 37-38. Leipzig, 1864, 8°.
1864. COUCH, R. Q. Additions to the Cornish list of Zoophytes. In : Trans. nat. Hist. and Antiquarian Soc. Penzance, vol. 2, pp. 37-45. Penzance, 1864, 8°.
1864. GRUBE, A.-E. Die Insel Lussin und ihre Meeresfauna. Breslau, 1864, 8°.
1864. HAECKEL, E. Beschreibung neuer Craspedoter Medusen aus dem Golfe von Nizza. In : Jenaische Zeitsch. f. Med. u. Naturwiss., Bd. 1, pp. 325-342. Leipzig, 1864, 8°.
1864. KIRCHENPAUER. Neue Sertulariden aus verschiedenen hamburgischen Sammlungen, nebst allgemeinen Bemerkungen über Lamouroux's Gattung Dynamena. In : Verhandl. d. K. Leopold.-Carol. deutschen Akad. d. Naturforscher, Bd. 31, 16 pp., 1 pl. Dresden, 1864, 4°.
1864. KÖLLIKER, A. Kurzer Bericht über einige im Herbst 1864 an der Westküste von Schottland angestellte vergleichend-anatomische Untersuchungen. Ein Schreiben an Herrn Prof. Thomson in Glasgow. In : Würzburger naturwiss. Zeitsch., Bd. 5, pp. 232-249, pl. 6. Würzburg, 1864, 8°.
1864. NORMAN, A.-M. On undescribed British Hydrozoa, Actinozoa, and Polyzoa. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 13, pp. 82-90, pl. 9-11. London, 1864, 8°.
- 1865 (a). AGASSIZ, A. On the mode of development of the marginal tentacles of the free Medusæ of some Hydroids. In :

- Proc. Boston Soc. nat. Hist. (1862-63), vol. 9, pp. 88-101. Boston, 1865, 8°.
- 1865 (b). AGASSIZ, A. [*Halopsis ocellata*]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist. (1862-63), vol. 9, pp. 219-220. Boston, 1865, 8°.
- 1865 (c). AGASSIZ, A. Illustrated catalogue of the Museum of Comparative Zoölogy at Harvard College, n° II, North American Acalephæ. Cambridge, 1865, 4°, fig.
1865. AGASSIZ, E.-C. and A. Seaside studies in natural history. Marine animals of Massachusetts Bay. Radiates. Boston, 1865, 8°.
1865. ALLMAN. Notes on the Hydroida. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 15, pp. 465-474. London, 1865, 8°.
- 1865 (a). CLARK, H.-J. [*Tubularia* and *Rhizogeton fusiformis*]. In : Proc. Boston Soc. nat. Hist. (1862-63), vol. 9, p. 342. Boston, 1865, 8°.
- 1865 (b). CLARK, H.-J. Mind in nature; or the origin of life, and the mode of development in animals. New-York, 1865, 8°, fig.
- 1865 (a). HINCKS, T. On the Medusoid of a Tubularian Zoophyte, and its return to a fixed condition after the liberation of the ova. In : Rep. 34th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Bath, 1864), P. 2, p. 99. London, 1865, 8°.
- 1865 (b). HINKS, T. Zoophytes : The history of their development. In : Quart. Journ. of Sc. Edited by Samuelson & Crookes, vol. 2, pp. 401-418, 2 pl. London, 1865, 8°.
1865. KÖLLIKER, A. Icones histiologicæ oder Atlas der vergleichenden Gewebelehre. Zweite Abth. Der feinere Bau der höheren Thiere. Heft 1. Die Bindesubstanz der Cœlenteraten. Leipzig, 1865, 4°, pl.
- 1865 (a). KÖLLIKER, A. [Observations sur la structure des Polypes]. In : Act. Soc. helvétique Sc. nat., Sess. 49 (Genève, 1865), pp. 91-92. Genève, 1865, 8°.

1865. NORMAN, A.-M. On *Merona*, an undescribed genus of British Hydrozoa. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 15, pp. 261-262. London, 1865, 8°.
1866. FILIPPI, (de), F. Sopra due Idrozoi del Mediterraneo. In : Mem. R. Accad. Sc. Torino (2), vol. 23. Scienze fisiche e matematiche, pp. 375-385, 2 pl. Torino, 1866, 4°. — Résumé dans : Notizia storica dei lavori fatti dalla Classe di Scienze fisiche e matematiche della R. Accad. Sc. di Torino negli anni 1864-65, scritta dal Prof. A. Sobrero, pp. 56-60. Torino, 1869, 8°.
- * 1866. HAECKEL, E. Generelle Morphologie der Organismen. Berlin, 1866, 2 vol., 8°.
Généralités.
- 1866 (a). HINCKS, T. On new British Hydroida. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 18, pp. 296-299. London, 1866, 8°.
- 1866 (b). HINCKS, T. On *Ophiodes*, a new genus of Hydroida. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 18, pp. 421-423, pl. 14. London, 1866, 8°.
1866. HOUGHTON, W. Hydræ, or Fresh-Water Polypes. In : Popular Science Review, Edit. by H. Lawson, vol. 5, pp. 267-278, pl. 14. London, 1866, 8°.
1866. M'INTOSH, W.-C. Observations on the marine Zoology of North Uist, Outer Hebrides. In : Proc. R. Soc. Edinburgh, vol. 5, pp. 600-614, fig. Edinburgh, 1866, 8°.
1866. MÖBIUS, K. Ueber den Bau, den Mechanismus und die Entwicklung der Nesselkapseln einiger Polypen und Quallen. In : Abhandl. a. d. Gebiete d. Naturw., herausg. von d. naturw. Verein in Hamburg, Bd. 5, Abth. 1, 26 pp., 2 pl. Hamburg, 1866, 4°.
1866. PARFITT, E. Additions to the Zoophytes of Devonshire. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (3), vol. 18, p. 426. London, 1866, 8°.

1866 (a). PARFITT, E. A Catalogue of the fauna of Devon, with notes and observations. Zoophytes. 40 pp. Exeter, 1866, 8°.

1866. PHILIPPI, R.-A. Kurze Beschreibung einiger chilenischen Zoophyten. In : Arch. f. Naturg., Jahrg. 32, Bd. I, pp. 118-120. Berlin, 1866, 8°.

1866. REICHERT. [Aufenthalt in Fécamp.]. In : Sitzber. d. Ges. Naturforsch. Freunde, Berlin, Jahre 1865, p. 19. Berlin, 1866, 4°.

Sur la substance contractile des Campanulaires.

1867. ALDER, J. Report on the Zoophytes. Dans : Reports of deep sea dredging on the coast of Northumberland and Durham, 1862-64. Edited by George-S. Brady. In : Nat. Hist. Trans. of Northumberland and Durham (1865-67), vol. 1, pp. 1-58, pl. 1-7 et 10. (Zoophytes, pp. 45-50). London, 1867, 8°.

1867 (a). BENEDEN (van), P.-J. Recherches sur la faune littorale de Belgique (Polypes). In : Mém. Acad. R. Sc. Lettres et Beaux-Arts de Belgique, tome 36, 207 pp., 19 pl. Bruxelles, 1867, 4°.

1867 (b). BENEDEN (van), P.-J. Le Cordylophora lacustris dans les environs d'Ostende. In : Bull. Acad. R. des Sc. Lettres et Beaux-Arts de Belgique, année 36 (2), vol. 23, pp. 708-709. Bruxelles, 1867, 8°.

1867. FISCHER. Sur les hydrozoaires fossiles du genre Hydractinia. In : Bull. Soc. géol. de France (2), vol. 24 (1866-67), pp. 689-690. Paris, 1867, 8°.

1867. KÖLLIKER. Ueber die Muskeln der Süßwasserpolyphen. In : Würzburger Naturw. Zeitsch., Bd. 6. Sitzungsab. d. phys. med. Ges. Würzburg für 1864/65, p. x. Würzburg, 1866-67, 8°.
Sur l'Hydre.

1867. LEYDIG. Thierreich. In : Beschreibung des Oberamts Tübingen, herausg. von dem k. statistisch-topographischen Bureau, p. 41-84. Stuttgart, 1867, 8°.

1867. MARCUSEN, J. Zur Fauna des Schwarzen Meeres. Vorläufige Mittheilung. In : Arch. für Naturg., Jahrg. 33, Bd. I, pp. 357-363. Berlin, 1867, 8°.
1867. NORMAN, A.-M. Report of the Committee appointed for the purpose of exploring the coasts of the Hebrides by means of the dredge. P. II. On the Crustacea, Echinodermata, Polyzoa, Actinozoa, and Hydrozoa. In : Rep. 36th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Nottingham, 1866), pp. 193-206. London, 1867, 8°.
1867. PEACH, C.-W. On new British Naked-eyed Medusæ. In : Journ. R. Institution Cornwall, vol. 2, pp. 355-360, 2 pl. Truro, 1867, 8°.
1867. REICHERT, C.-B. Ueber die contractile Substanz (Sarcode, protoplasma) und ihre Bewegungs-Erscheinungen bei Polythalamien und einigen anderen niederen Thieren. In : Abhandl. d. k. Acad. d. Wiss. Berlin (1866), physik. Kl., pp. 151-293, pl. 1-7. Berlin, 1867, 4°. — Résumé dans : Monatsber. d. k. preussischen Acad. d. Wiss., Berlin (1866), pp. 504-509. Berlin, 1867, 8°, — et dans : Arch. f. Anat., Physiol. u. wiss. Med. (1866), pp. 638-643. Leipzig [1867], 8°.
1867. RETZIUS. In : Van BENEDEN, 1867 (a), p. 124.
1867. SEMPER. In : Van BENEDEN, 1867 (a), p. 124.
1867. WRIGHT, T.-S. Observations on British Zoophytes . . . In : Proc. R. phys. Soc. Edinburgh (1862-66), vol. 3, pp. 42-46: 153-159; pl. 1 et 2. Edinburgh, 1867, 8°.
- Contient : P. 42, On a supplementary canal system in Stomobrachium octocostatum; p. 45, Atractylis bitentaculata (n. sp.) — Atractylis quadri-tentaculata (n. sp.); p. 46, Coryne ferox (n. sp.); p. 159. On the stem-canals of Tubularia indivisa.
- Et dans : Journ. of Anat. and Physiol., vol. 1, pp. 332-338, pl. 14-15. London, 1867, 8°.
1868. ALLMAN. Notes on the structure of certain Hydroid Medusæ. In : Rep. 37th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Dundee, 1867), P. 2, pp. 77-79. London, 1868, 8°.

1868. BAUDELLOT. Observation recueillie sur une Hydre d'eau douce. In : Bull. Soc. des Sc. nat. de Strasburg, année 1, n° 9 (décembre, 1868), pp. 129-130. [Strasbourg, 1868?], 8°.
1868. BOECK, A. Om to tilsyneladende bilateral-symmetriske Hydromeduser: *Dipleurosoma typica* og *Stuvitzii*. In : Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhist. Forening i Kjöbenhavn (1866), pp. 131-140. Kjöbenhavn, 1868, 8°.
1868. GRAY, J.-E. Notes on the Ceratelladæ, a family of keratose Sponges. In : Proc. zool. Soc. London (1868), pp. 575-579, fig. London [1868], 8°.
1868. GREEFF. [Ueber einen neuen . . . Cœlenteraten aus der Nordsee]. In : Verhandl. Naturhist. Ver. preussischen Rheinlande u. Westphalens, P. 2. Sitzungsber. niederrheinischen Ges. f. Natur- u. Heilkunde zu Bonn, p. 92. Bonn, 1868, 8°. Communication préliminaire de 1869 (b).
1868. HAECKEL, E. Monographie der Moneren. In : Jenaische Zeitsch. f. Med. u. Naturw., Bd. 4, pp. 64-137. Leipzig, 1868, 8° (p. 84).
- Sur la division et la régénération des Thaumantiades.
1868. HELLER, C. Die Zoophyten und Echinodermen des Adriatischen Meeres. In : Verh. d. k. Zool.-Botan. Ges. Wien, Bd. 18, Beilage, 88 pp., 3 pl. Wien, 1868, 8°.
1868. HINCKS, T. A history of the British Hydroid Zoophytes, 2 vol. London, 1868, 8°, pl.
1868. KIRCHENPAUER. In : HELLER, 1868, p. 40.
1868. KOWALEVSKY, A. Untersuchungen über die Entwicklung der Cœlenteraten. Vorläufige Mittheilung. In : Nachrichten k. Ges. d. Wiss., Jahre 1868, pp. 154-159. Gottingen, 1868, 8°.
1868. LANKESTER, E.-R. Preliminary notice of some observations with the spectroscope on animal substances. In : Journ. of Anat. and Physiol. (2), vol. 2, pp. 114-116. London, 1868, 8°.
1868. MENEGHINI. In : HELLER, 1868, p. 35.
1868. NORMAN, A.-M. Preliminary report on the Crustacea,

- Moluscoida, Echinodermata, and Cœlenterata, procured by the Shetland dredging Committee in 1867. In : Rep. 37th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Dundee, 1867), pp. 437-441. London, 1868, 8°.
1868. PEACH, C.-W. On Naked-eyed Medusæ found at Peterhead and Wick, N.-B., and other British localities. In : Rep. 37th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Dundee, 1867), P. 2, pp. 96-97. London, 1868, 8°.
1868. SARS. [Afbildninger af nogle ved Lofoten fundne Echinodermter óg Cœlenterater]. In : Forhandl. i Videnskabs-Selskabet i Christiania (1867), pp. 19-23. Christiania, 1868, 8°.
1868. SPAGNOLINI, A. Catalogo degli Acalefi del Golfo di Napoli. In : Atti Soc. italiana Sc. nat., vol. 11 (Riunione straordinaria in Vicenza), pp. 553-559. Milano, 1868, 8°.
- 1869 (a). ALLMAN, G.-J. In : NORMAN, A.-M., 1869, p. 323.
- 1869 (b). ALLMAN, G.-J. On the structure of *Coppinia arcta*. In : Rep. 38th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Norwich, 1868), P. 2, pp. 87-88. London, 1869, 8°.
1869. BIANCONI, J.-J. Specimina Zoologica Mosambicana, Fasciculus XVII. In : Mem. Accad. Sc. Istituto Bologna (2), Tomo 9, pp. 199-222, 4 pl. Bologna, 1869, 4° (p. 213).
1869. DÖNITZ. [Ueber einige niedere . . . Seethiere]. In : Sitzber. d. Ges. naturforsch. Freunde Berlin, Jahre 1868, pp. 10-11. Berlin, 1869, 4°.
1869. FOREL, F.-A. Introduction à l'étude de la faune profonde du lac Léman. In : Bull. Soc. vaudoise Sc. nat., vol. 10, n° 62 (1869), pp. 217-223. Lausanne, 1868-70, 8°.
- Signale l'existence de l'Hydre, à 75 m. de profondeur, dans le lac Léman.
1869. GRAY, J.-E. Habits of the Medusæ. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (4), vol. 4, pp. 295-296. London, 1869, 8°.
- 1869 (a). GREEFF. Süßwasserpolyphen (*Hydra viridis*) mit reichlichen Knospen. In : Verhandl. naturhist. Ver. preussischen Rheinlande u. Westphalens, P. 2. Sitzungsber. niederrhein.

- Ges. f. Natur- u. Heilkunde zu Bonn, p. 7. Bonn, 1869, 8°.
- 1869 (b). GREEFF, R. Protohydra Leuckarti. Eine marine Stammform der Cœlenteraten. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 20, Heft 1 (1869), pp. 37-54, pl. 4-5. Leipzig, 1870, 8°.
1869. HINCKS, T. The Sertularian Zoophytes of our shores. In : Popular Science Review. Edit. by H. Lawson, vol. 8, pp. 223-232, pl. 45-46. London, 1869, 8°.
1869. NORMAN, A.-M. Shetland final dredging report, P. II. On the Crustacea, Tunicata, Echinodermata, Actinozoa, Hydrozoa, and Porifera. In : Rep. 38th Meet. Brit. Assoc. Adv. Sc. (Norwich, 1868), pp. 247-336. London, 1869, 8°.
1869. POURTALES (de), L.-F. Contributions to the Fauna of the Gulf Stream at great depths. In : Bull. Museum Comp. Zool. Harvard College Cambridge, vol. 1 (1863-69), n° 6, p. 103-120. Cambridge, 1869, 8°.
1869. RATZEL, F. Histologische Untersuchungen an niederen Thieren. In : Zeitsch. f. wiss. Zool., Bd. 19, pp. 257-280, pl. 22-23. Leipzig, 1869, 8°.
1869. SARS, M. Fortsatte Bemaerkninger over det dyriske Livs Udbredning i Havets Dybder. In : Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, Aar 1868, pp. 246-275. Christiania, 1869, 8°. — En anglais dans : Ann. and Mag. of nat. Hist. (4), vol. 3, pp. 423-441. London, 1869, 8°.
1870. ANDREWS, W. On Deep-Sea soundings. In : Journ. R. Dublin Soc., vol. 5, pp. 475-481. Dublin, 1870, 8°.
1870. CARPENTER, JEFFREYS, J.-G. and THOMSON, W. Preliminary Report of the Scientific Exploration of the Deep-Sea in H. M. Surveying-Vessel « Porcupine » during the Summer of 1869. In : Proc. R. Soc. London, vol. 18, pp. 397-492. London, 1870, 8° (p. 429).

Les auteurs signalent pour la première fois la présence d'Hydroides dans les grandes profondeurs (2435 brasses).

1870. HARTMANN. [Tubularia Dumortieri]. In : Sitzber. d. Ges.

- naturforsch. Freunde Berlin, Jahre 1869, pp. 1-2. Berlin, 1870, 4°.
1870. HERKLOTS, J.-A. Natuurlijke Historie van Nederland. De Weekdieren en lagere Dieren, vol. 2. Amsterdam, 1870, 8°.
1870. LEIDY. [Cordylophora]. In: Proc. Acad. natural Sc. Philadelphia, 1870, p. 113. Philadelphia, 1870, 8°.
1870. METSCHNIKOFF. In: LEUCKART, R. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1868 und 1869. In: Archiv f. Naturg., Jahrg. 36, Bd. 2, p. 282. Berlin, 1870, 8°. — Résumé de: METSCHNIKOW, E. Note sur la faune pelagique de la Mer Noire (en russe). In: Travaux du 1^{er} Congrès des Naturalistes russes à St-Pétersbourg (1867-68), Zoologie, pp. 267-270. St-Pétersbourg, 1868.
1870. NITSCHKE. [Cordylophora albicola]. In: Sitzber. Gesellsch. naturf. Freunde Berlin (1869), p. 9. Berlin, 1870, 4°.
1870. TSCHERNIAWSKY. In: LEUCKART, R. Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere während der Jahre 1868 und 1869. In: Archiv f. Naturg., Jahrg. 36, Bd. 2, p. 288. Berlin, 1870, 8°. (Protocolle der Moskauer Naturforscherversammlung 1869).
Il nous a été impossible de trouver cet ouvrage cité par LEUCKART.
1870. WRIGHT, E. P. [Dehitella atrorubens of Gray.] In: Quart. Journ. microsc. Sc. (new series), vol. 10, pp. 90-92, fig. London, 1870, 8°.
1871. ALLMAN, G.-J. A monograph of the Gymnoblastic or Tubularian Hydroids, xxiv + 450 pp., 23 pl. London, 1871, 4°.
- 1871 (a). ALLMAN. On a mode of reproduction by spontaneous fission in the Hydroida. In: Quart. Journ. microsc. Sc. (new ser.), vol. 11, pp. 18-21, pl. 2. London, 1871, 8°.
1871. DÖNITZ, W. Ueber Cordylophora lacustris. In: Arch. f. Anat., Physiol. u. wiss. Med., Jahrg. 1871, pp. 430-433. pl. 11 B. Leipzig, 1871, 8°. — Résumé dans: Sitzber. d. Ges.

- Naturforsch. Freunde Berlin, Jahre 1871, pp. 81-82. Berlin, 1871, 8°.
1871. DU PLESSIS, G. Evolution médusipare de *Clytia* (Camarularia) volubilis. In : Bull. Soc. vaudoise Sc. nat., vol. 11, n° 66 (1871), pp. 167-170, pl. 2. Lausanne, [1873], 8°.
- 1871 (a). HINCKS, T. A Life-History. In : The student and intellectual observer, vol. 5, pp. 185-197, fig. London, 1871, 8°.
- 1871 (b). HINCKS, T. Supplement to a « Catalogue of the Zoophytes of South Devon and South Cornwall » with descriptions of new species. In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (4), vol. 8, pp. 73-83, pl. 5-6. London, 1871, 8°.
1871. KLEINENBERG, N. Die Furchung des Eies von *Hydra viridis*. Ein Beitrag zur Kenntniss der Plasmabewegungen. Inaugural-Dissertation. Jena, 1871, 8°.
1871. METSCHNIKOFF, E. Ueber die Entwicklung einiger Cœlenteraten. In : Bull. Acad. Imp. Sc. St-Pétersbourg, tome 15, pp. 95-100. St-Pétersbourg, 1871, 4°.
- 1871 (a). METZGER, A. Die wirbellosen Meeresthiere der ostfriesischen Küste. Ein Beitrag zur Fauna der deutschen Nordsee. In : 20. Jahresbericht d. naturhist. Gesellsch. Hannover, pp. 22-36. Hannover, 1871, 4°. — Résumé dans : Zeitsch. f. d. gesammten Naturw., Bd. 36, pp. 523-526. Berlin, 1870, 8°.
- 1871 (b). METZGER, A. Die wirbellosen Meeresthiere der ostfriesischen Küste, Beitrag 2. Ergebnisse der im Sommer 1871 unternommenen Excursionen. In : 21. Jahresbericht d. Naturhist. Ges. Hannover, pp. 20-34. Hannover, 1871, 8°.
1871. PANCERI, P. Intorno alla sede del movimento luminoso nelle Meduse. In : Rendic. Acad. Sc. fis. e matemat. Napoli, anno 10, pp. 140-146. Napoli, 1871, 4°.
1871. ROTCH, W.-D. On a new genus and species of Hydroid Zoophyte (*Cladocoryne floccosa*). In : Ann. and Mag. of nat. Hist. (4), vol. 7, pp. 227-228. London, 1871, 8°.

1871. SCHULZE, F.-E. Ueber den Bau und die Entwicklung von *Cordylophora lacustris* (Allman), nebst Bermerkungen über Vorkommen und Lebensweise dieses Thieres. Leipzig, 1871, 4°, 6 pl.
1871. SMITH, S.-J. and VERRILL, A.-E. Notice of the Invertebrata dredged in Lake superior in 1871 by the U. S. Lake Survey, under the direction of gen. C. B. Comstock, S.-J. Smith, Naturalist. In : American. Journ. of Sc. and Arts (3), vol. 2, pp. 448-454. New-Haven, 1871, 8°.
1871. SPAGNOLINI, A. Catalogo degli Acalefi discofori del Golfo di Napoli. In : Atti Soc. italiana Sc. nat., vol. 14, pp. 144-223. Milano. 1871, 8°.
-

ÉTAT DES GENRES ET DES ESPÈCES ¹

HYDROÏDES

Gen. *Acaulis* Stimpson 1854.

Acaulis primarius Stimpson.

<i>Acaulis primarius</i>	STIMPSON	1854 p. 10, pl. 1, fig. 4.
» »	SARS	1857 (b) p. 200.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 345.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 370.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 151, 225.
» »	ALLMAN	1871 p. 378.

Gen. *Acharadria* Wright 1863.

Acharadria larynx Wright.

<i>Acharadria larynx</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 378, pl. 17, fig. 7-8.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 359.
» »	HINCKS	1868 p. 134, pl. 23, fig. 3.
» »	ALLMAN	1871 p. 376, fig. 81.

¹ En règle générale nous écrirons toujours les noms spécifiques avec une petite lettre initiale et lorsque ces noms se terminent par deux *i*, nous en supprimerons un, nous conformant, ainsi, aux règles adoptées par les Congrès internationaux de Zoologie.

Gen. *Actinogonium* Allman 1871.

ALLMAN (1871, p. 95 et 272), a établi ce genre pour y placer la *Syncoryne pusilla* de van BENEDEX, dont le développement diffère de celui des autres espèces de Syncorynes.

Actinogonium pusillum (van Beneden).

Syn. : *Coryne van Benedeni* Hincks.

Voir : Matériaux II, p. 65.

<i>Syncoryna pusilla</i>	GEGENBAUR	1854	p. 216.
»	ALDER	1858	p. 102.
»	BENEDEX (van)	1867 (a)	p. 119, pl. 5, fig. 4.
<i>Coryne van Benedeni</i>	HINCKS	1868	p. 45, pl. 9, fig. 1 et p. 46, fig. 4.
<i>Syncoryna pusilla</i>	ALLMAN	1871	p. 94.
<i>Actinogonium pusillum</i>	ALLMAN	1871	p. 273.

Gen. *Aglaophenia* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 422 et II, p. 40.

Aglaophenia angulosa Lamouroux.

<i>Plumularia angulosa</i>	LAMARCK	1816	vol. 2, p. 126.
<i>Aglaophenia angulosa</i>	LAMOUREUX	1816	p. 166.
»	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 16.
<i>Plumularia angulosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 442.
»	BLAINVILLE	1834	p. 478.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 163.
<i>Plumularia</i> sp?	HUXLEY	1849	p. 427, pl. 39, fig. 43 et 45.
<i>Plumularia hurleyi</i>	BUSK	1852	p. 388, 395.

Cette espèce avait été indiquée comme indéterminable dans nos Matériaux I, la description de LAMOUREUX étant insuffisante pour permettre de la reconnaître. Mais il convient de la rétablir, car BILLARD en a retrouvé le type et a montré, en outre, que c'était la même espèce que celle qui a été décrite par BUSK sous le nom de *Plumularia hurleyi*.

Aglaophenia arcuata Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422 et II, p. 40.

Aglaophenia arcuata AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 358.*Aglaophenia brachiata* (Lamarck).

<i>Plumularia brachiata</i>	LAMARCK	1816	vol. 2, p. 126.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 442.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 478.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 163.

Nous avons indiqué à tort (Matériaux I, p. 422 et II, p. 41) cette espèce comme synonyme de l'*Aglaophenia crucialis* Lamouroux. BILLARD (1909) a montré qu'il s'agissait de deux espèces distinctes.

Aglaophenia brevirostris (Busk).*Plumularia brevirostris* BUSK 1852 p. 388, 397.*Aglaophenia crucialis* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422 et II, p. 41.

<i>Aglaophenia crucialis</i>	LAMOUROUX	1816	p. 169.
»	»	LAMOUROUX	1824 (c) p. 17.
<i>Plumularia crucialis</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 478.
<i>Anisocalyx (Aglaophenia)</i>			
<i>crucialis</i> .	COSTA	1838	p. 19.

La synonymie de cette espèce, telle que nous l'avions indiquée dans nos Matériaux I et II n'est pas exacte (voir *Aglaophenia brachiata*). Elle doit être modifiée et rétablie comme ci-dessus.

Aglaophenia cupressina Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422 et II, p. 41.

<i>Plumularia macgillivrayi</i>	BUSK	1852	p. 386, 388, 400, 401.
<i>Aglaophenia macgillivrayi</i>	ALLMAN	1871	p. 157.

Aglaophenia delicatula (Busk).

<i>Plumularia delicatula</i>	BUSK	1852	p. 388, 396.
------------------------------	------	------	--------------

[*Aglaophenia dichotoma* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux II, p. 41.

Aglaophenia divaricata (Busk).

<i>Plumularia divaricata</i>	BUSK	1852	p. 388, 398.
------------------------------	------	------	--------------

<i>Plumularia ramosa</i>	BUSK	1852	p. 388, 398.
--------------------------	------	------	--------------

Aglaophenia elegans Lamouroux.

<i>Aglaophenia elegans</i>	LAMOUREUX	1816	p. 469.
----------------------------	-----------	------	---------

<i>Plumularia elegans</i>	LAMARCK	1816	vol. 2, p. 129.
---------------------------	---------	------	-----------------

<i>Aglaophenia elegans</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 46.
----------------------------	-----------	----------	--------

<i>Plumularia elegans</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
---------------------------	------------	------	---------

»	»	BLAINVILLE	1834	p. 478.
---	---	------------	------	---------

»	»	EDWARDS, M.	1836	p. 165.
---	---	-------------	------	---------

Nous avons considéré cette espèce comme indéterminable (Matériaux I), mais BILLARD en a retrouvé les types de LAMARCK et de LAMOUREUX. Il convient donc de la rétablir.

Aglaophenia elongata Meneghini.

Voir : Matériaux II, p. 41.

<i>Plumularia elongata</i>	HELLER	1868	p. 39, 82, pl. 2, fig. 2.
----------------------------	--------	------	---------------------------

Aglaophenia filamentosa (Lamarck).

Voir : Matériaux I, p. 422 et II, p. 41.

? <i>Plumularia pennaria</i>	ESPER	1788-1830	vol. 3, p. 205.
------------------------------	-------	-----------	-----------------

<i>Sertularia pennaria</i> L. sec.	ESPER	1794-1806	pl. 23.
------------------------------------	-------	-----------	---------

? »	HOULTUYN	1761-73	vol. 17, p. 574.
-----	----------	---------	------------------

Aglaophenia (*Sertularia*)

<i>pennaria</i>	LAMOUREUX	1812	p. 184.
-----------------	-----------	------	---------



<i>Plumularia filamentosa</i>	LAMARCK	1816	vol. 2, p. 128.
<i>Aglaophenia pennaria</i>	LAMOUREUX	1816	p. 167.
»	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 16.
<i>Plumularia filamentosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
»	BLAINVILLE	1834	p. 478.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 136.

D'après les recherches de BILLARD, il convient de modifier la synonymie que nous avons donnée de cette espèce et de l'établir comme ci-dessus.

Aglaophenia flexuosa Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 422 et II, p. 42.

Aglaophenia formosa (Busk).

<i>Plumularia formosa</i>	BUSK	1851	p. 118.
<i>Aglaophenia formosa</i>	ALLMAN	1871	p. 157.

[*Aglaophenia fusca* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 423 et II, p. 42.

Aglaophenia kirchenpaueri (Heller).

<i>Plumularia Kirchenpaueri</i>	HELLER	1868	p. 40, 82, pl. 2, fig. 4.
<i>Plumularia algirensis</i>	KIRCHENPAUER	1868	p. 40.

[*Aglaophenia minuta* Fewkes 1881].

? <i>Aglaophenia pelagica</i>	LAMOUREUX	1816	p. 170.
? »	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 18.
? <i>Plumularia pelagica</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 167.
? <i>Anisocalyx (Aglaophenia)</i> <i>pelagica</i>	COSTA	1838	p. 19.
? <i>Aglaophenia pelasgica</i>	MC CRADY	1859 (h)	p. 200, 203.
? »	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 139, 223, 224.

Aglaophenia myriophyllum (Linné).

Voir : Matériaux I. p. 423 et II. p. 42.

<i>Plumularia myriophyllum</i>	BELLAMY	1839	p. 270.
»	»	COUCH	1843 p. 208, 211.
»	»	FORBES	1851 p. 215, 245.
<i>Sertularia (Plumularia)</i>			
<i>myriophyllum</i>	MAITLAND	1851	p. 54.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 152, pl. 9, fig. 28.
<i>Plumularia myzophyllum</i>	IRVINE	1854	p. 245.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	GOSSE	1855	p. 24.
»	»	TEMPLER	1855 p. 4576.
»	»	THOMPSON	1856 p. 458.
»	»	ALDER	1858 p. 111, 114, 120.
»	»	LEWES	1858 p. 293, 295, pl. 4, fig. 2.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 201.
»	»	ALDER	1860 p. 74, note.
»	»	PEACH	1860 p. 155.
<i>Aglaophenia myriophyllum</i>	AGASSIZ. L.	1860 62	vol. 4, p. 358.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 257.
»	»	HINCKS	1862 (b) p. 362.
»	»	NORMAN	1862 p. 152.
<i>Sertularia myriophyllum</i>	AGASSIZ. A.	1865 (c)	p. 145, 225, 226.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
»	»	ALDER	1867 p. 45, 49.
»	»	NORMAN	1867 p. 200.
»	»	HELLER	1868 p. 41, 82.
<i>Aglaophenia myriophyllum</i>	HINKS	1868	p. 290, pl. 64, fig. 2.
»	»	NORMAN	1869 p. 321.
<i>Plumularia myriophyllum</i>	HERKLOTS	1870	p. 402, pl. 37, fig. 5.
<i>Aglaophenia myriophyllum</i>	ALLMAN	1871	p. 61... 181.

Dans les Matériaux I. p. 423, ligne 23, au lieu de : *Anisocalyx (Myriophyllum) pelagicum* DONATI... lire : *Anisocalyx (Myriophyllum) pelagicum* DONATI...

Aglaophenia octodonta (Heller).

<i>Plumularia octodonta</i>	HELLER	1868	p. 40, 82, pl. 2, fig. 3.
-----------------------------	--------	------	---------------------------

Aglaophenia patagonica (d'Orbigny).

Voir : Matériaux II, p. 43.

[Aglaophenia patula Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 424 et II, p. 43.

Cette espèce doit être supprimée. Elle est synonyme d'*Aglaophenia filamentosa* (Lmk).

Aglaophenia pelagica Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 424 et II, p. 43.

Espèce à supprimer. BILLARD, qui a pu étudier le type de LAMOUROUX, dit que son état de conservation « ne permet pas d'en voir les caractères d'une façon nette; il paraît très probable qu'il s'agit de l'*A. latecarinata* Allm.; mais dans le doute je propose de supprimer le nom donné par LAMOUROUX ».

MC CRADY (1859 b) a donné une description très incomplète d'une espèce qu'il rapporte à l'*A. pelagica* de LAMOUROUX; NUTTING (1900) l'a reproduite en faisant remarquer qu'il s'agit peut-être de la même espèce que celle qui a été décrite par FEWKES (1881) sous le nom d'*A. minuta*. Or, l'*A. minuta* et l'*A. latecarinata* sont synonymes ainsi que l'admet NUTTING. On voit donc que cet auteur arrive à la même conclusion que BILLARD. Cependant, comme l'examen du type, et les descriptions de LAMOUROUX et de MC CRADY ne permettent pas de déterminer exactement cette espèce, nous estimons qu'il est préférable, ainsi que le propose BILLARD de supprimer le nom d'*A. pelagica*. Nous le ferons figurer, avec un ?, dans les synonymes d'*Aglaophenia minuta*.

Aglaophenia pennaria (Linné).

<i>Sertularia pennaria</i>	LINNÉ	1758	p. 813.
»	LINNÉ	1767	p. 1313 (Excl. syn.).
<i>Aglaophenia spicata</i>	LAMOUROUX	1816	p. 166.
»	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 15.
<i>Plumularia spicata</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
»	BLAINVILLE	1834	p. 478.
»	EDWARDS, M.	1836	p. 166.
<i>Plumularia banksii</i>	GRAY	1843 (a)	p. 294.

LAMOUREUX (1816) a décrit deux espèces dont la synonymie est difficile à établir, ce sont (p. 166) *Aglaophenia spicata* et (p. 167) *Aglaophenia pennaria*. Il donnait comme synonyme de cette dernière espèce, la *Sertularia pennaria* de GMELIN, la *Sertulara pennara* de CAVOLINI et la *Sertularia pennaria* d'ESPER. On sait que l'espèce de CAVOLINI est devenue le type d'un genre distinct du genre *Aglaophenia* et auquel on a donné le nom générique de *Pennaria*. Quant à l'espèce d'ESPER, elle paraît être synonyme d'*Aglaophenia filamentosa* Lmk. Il faut donc faire rentrer l'*Aglaophenia pennaria* de LAMOUREUX parmi les synonymes d'*A. filamentosa* Lmk. D'autre part, BILLARD (1909), qui a pu étudier la collection des Hydroïdes de LAMOUREUX, a montré que l'*Aglaophenia spicata* de cet auteur était identique à la *Sertularia pennaria* de LINNÉ dont le British Museum possède une préparation. Il convient donc de rétablir le nom d'*Aglaophenia pennaria* pour l'espèce de LINNÉ, mais en notant qu'il ne faut pas comprendre dans ses synonymes l'*A. pennaria* de LAMOUREUX (= *A. filamentosa* Link), ni l'*A. pennaria* de SAVIGNY et AUDOUIN (= *A. savignyana*), non plus que la *Sertularia pennaria* de CAVOLINI (= *Pennaria disticha*), ou la *S. pennaria* d'Esper (= *Aglaophenia filamentosa*). La synonymie d'*Aglaophenia pennaria* (L.) doit donc être établie comme ci-dessus.

D'autre part BILLARD (1910) a retrouvé le type de l'*Aglaophenia banksi* de GRAY et a constaté que cette espèce (que nous avons considérée comme indéterminable) était synonyme de la *Sertularia pennaria* de LINNÉ.

Aglaophenia pennatula (Ellis et Solander).

Voir : Matériaux I, p. 424 et II, p. 44.

<i>Plumularia pennatula</i>	TURTON et KINGSTON	1830	s. p.
»	BELLAMY	1839	p. 270.
»	BUSK	1851	p. 118.
»	FORBES	1851	p. 215.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 147, pl. 8, fig. 24.
? <i>Plumularia pennatecla</i>	IRVINE	1854	p. 245.
<i>Plumularia pennatula</i>	GOSSE	1855	p. 24.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	THOMPSON	1856	p. 457.
»	ALDER	1858	p. 97.
<i>Aglaophenia pennatula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 358.
<i>Plumularia pennatula</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 257.

<i>Plumularia pennatula</i>	HINCKS	1862 (b) p. 362.
» »	PARFITT	1866 (a) p. 10.
<i>Aglaophenia pennatula</i>	HINCKS	1868 p. 292, pl. 63, fig. 3 et p. 293, fig. 33.
<i>Plumularia pennatula</i>	NORMAN	1869 p. 262.
<i>Aglaophenia pennatula</i>	ALLMAN	1871 p. 158.

Aglaophenia phoenicea (Busk).

<i>Plumularia phoenicea</i>	BUSK	1852 p. 388, 398.
<i>Plumularia aurita</i>	BUSK	1852 p. 388, 397.

Aglaophenia pluma (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 425 et II, p. 44.

<i>Plumularia uncinata</i>	LAMARCK	1816 vol. 2, p. 125 (Excl. syn.)
» »	EDWARDS, M.	1836 p. 161.
<i>Plumularia pluma</i>	BELLAMY	1839 p. 271.
<i>Plumularia cristata</i>	COUCH	1843 p. 210.
<i>Aglaophenia uncinata</i>	MENECHINI	1845 p. 12.
<i>Plumularia cristata</i>	BUSK	1851 p. 118.
» »	FORBES	1851 p. 215, 245.
<i>Sertularia (Plumularia)</i>		
<i>pluma</i>	MAITLAND	1851 p. 55.
<i>Plumularia cristata</i>	LANDSBOROUGH	1852 p. 97, 145, pl. 8, fig. 23.
<i>Sertularia pluma</i>	CAVOLINI	1853 p. 116.
<i>Plumularia cristata</i>	GOSSE	1853 (a) p. 82, 143, 311, 379 et 434.
» »	IRVINE	1854 p. 245.
» »	GOSSE	1855 p. 24.
» »	TEMPLER	1855 p. 4575, 4576.
» »	GOSSE	1856 p. 137.
» »	THOMPSON	1856 p. 457.
<i>Plumularia pluma</i>	SARS	1857 (a) p. 163.
<i>Plumularia cristata</i>	ALDER	1858 p. 97, 118.
» »	MC CRADY	1859 (b) p. 201.
<i>Aglaophenia pluma</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 358.
<i>Plumularia cristata</i>	MURRAY	1860 (a) p. 250.
» »	GREENE	1861 p. 94.

<i>Plumularia cristata</i>	GRUBE	1861	p. 131.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 255, 256.
»	ALLMAN	1862	p. 62.
»	HINCKS	1862 (h)	p. 362.
<i>Plumularia (Aglaophenia)</i>			
<i>pluma</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 379, fig. 13.
<i>Aglaophenia pluma</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 378, 381, 387.
»	ALLMAN	1864 (b)	p. 203, 205, pl. 14, fig. 1-4.
<i>Plumularia cristata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 15, pl. 1, fig. 2 (a).
»	PARFITT	1866 (a)	p. 10.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 187.
»	HELLER	1868	p. 39, 40, 82.
<i>Aglaophenia pluma</i>	HINCKS	1868	p. 286, pl. 63, fig. 1, p. 308, fig. 37, p. XVIII, fig. VI, p. XXII, fig. 9.
»	HINCKS	1869	p. 231.
<i>Plumularia cristata</i>	NORMAN	1869	p. 262.
<i>Plumularia pluma</i>	HERKLOTS	1870	p. 401, pl. 37, fig. 4.
<i>Aglaophenia pluma</i>	ALLMAN	1871	p. 28...181, fig. 30, 51.
<i>Plumularia cristata</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.

[*Aglaophenia savignyana* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 426 et II, p. 45.

Aglaophenia simplex (d'Orbigny).

Voir : Matériaux II, p. 45.

Aglaophenia speciosa (Pallas).

Voir : Matériaux I, p. 426 et II, p. 46.

Aglaophenia spicata Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 426 et II, p. 46.

Cette espèce doit être supprimée. Elle est synonyme d'*Aglaophenia pen-
naria*.

Aglaophenia struthionides (Murray).

<i>Plumularia struthionides</i>	MURRAY	1860 (a) p. 251, pl. 12, fig. 2.
<i>Aglaophenia franciscana</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 140, 223 (Excl. syn. pp.).

Aglaophenia tricuspis Mac Crady.

<i>Aglaophenia tricuspis</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 203.
»	»	AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 358.
»	»	AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 140, 224.

Aglaophenia trifida L. Agassiz.

<i>Aglaophenia cristata</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 202, 203, 217 (Excl. syn.).
<i>Aglaophenia trifida</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 358.
»	»	AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 140, 223, 224.

Aglaophenia tubulifera Hincks.

<i>?Aglaophenia myriophyllum</i> SAVIGNY et AU-		
	DOUIN	1809-17 vol. 1, P. 4, p. 225. Polypes, pl. 14, fig. 4.
<i>Plumularia cristata</i> var.	COUCH	1844 p. 32.
»	»	JOHNSTON 1847 p. 94, fig. 16.
<i>Plumularia tubulifera</i>	HINCKS	1861 (c) p. 256, pl. 7, fig. 1-2.
»	»	HINCKS 1862 (b) p. 362.
»	»	PARFITT 1866 (a) p. 10.
»	»	NORMAN 1867 p. 196, 200.
<i>Aglaophenia tubulifera</i>	HINCKS	1868 p. 288, pl. 63, fig. 2.
<i>Plumularia tubulifera</i>	NORMAN	1869 p. 262.
<i>Aglaophenia tubulifera</i>	ALLMAN	1871 p. 158.
»	»	HINCKS 1871 (b) p. 80.

Aglaophenia uncinata (Lamarck).

Voir : Matériaux I, p. 426 et II, p. 46.

La *Plumularia uncinata* de LAMARCK, ainsi que l'a montré BILLARD, est synonyme d'*Aglaophenia pluma*. Cette espèce doit donc être supprimée.

Les synonymes que nous avons indiqués appartiennent à *Aglaophenia phuma*, *A. filamentosa*, *A. tubulifera* et à *A. pennaria*.

Aglaophenia urceolifera (Lamarck).

Voir : Matériaux I, p. 427 et II, p. 46.

[*Aglaophenia urens* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 427 et II, p. 46.

KIRCHENPAUER (1872, p. 46) en décrivant l'*Aglaophenia urens* avait indiqué comme synonyme probable la *Plumularia scabra* de LAMOUROUX. Mais BILLARD a montré que cette dernière était une bonne espèce et une vraie *Plumularia*. Par conséquent le nom d'*Aglaophenia urens* ne doit pas figurer ici.

Gen. *Amalthea* O. Schmidt 1852.

O. SCHMIDT (1852) a employé pour la première fois le nom d'*Amalthea* dans sa description d'*A. uvifera*. Ce genre a été adopté par ALLMAN qui en a établi la diagnose. SARS (1857 b) écrivait, par erreur, *Amathaea*.

Amalthea januari (Steenstrup).

<i>Corymorpha januarii</i>	STEENSTRUP	1854	p. 46 ss.
»	SARS	1860	p. 342, 345 (Trad. allemande).
<i>Amalthea januarii</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 369.
»	ALLMAN	1871	p. 394.

Amalthea sarsi (Steenstrup).

<i>Corymorpha nutans</i>	SARS	1851	p. 124, 135.
<i>Corymorpha sarsi</i>	STEENSTRUP	1854	p. 48.
»	SARS	1860	p. 343-345 (Trad. allemande).
<i>Amalthea sarsi</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 369.
<i>Corymorpha nutans</i> Sars	HINCKS	1868	p. 323.

<i>Corymorpha sarsii</i>	HINCKS	1868	p. 323.
<i>Amalthaea sarsii</i>	SARS	1868	p. 21.
»	ALLMAN	1871	p. 393.

Amalthaea uvifera O. Schmidt.

<i>Amalthaea uvifera</i>	SCHMIDT	1852	p. 13, pl. 9, fig. 2.
<i>Amalthaea uvifera</i>	SARS	1857 (b)	p. 194.
<i>Corymorpha uvifera</i>	SARS	1860	p. 342, 344 (Trad. allemande).
<i>Amalthaea uvifera</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 369.
»	ALLMAN	1871	p. 393.

Gen. *Amalthaea*.

Voir : *Amalthaea*.

Gen. *Amphisbetia* L. Agassiz 1862.

Ce genre, créé par L. AGASSIZ (1860-62), pour y placer la *Sertularia operculata*, n'a pas été adopté.

Gen. *Amphitrocha* L. Agassiz 1862.

Ce genre n'a pas été adopté. Il avait été établi par L. AGASSIZ (1860-62) et comprenait 3 espèces *A. cincta*, *A. picta* et *A. rugosa* qui rentrent dans le genre *Sertularella*.

Gen. *Anisocalyx* Donati 1750.

Voir : Matériaux I, p. 427.

HELLER (1868) a essayé de reprendre le nom d'*Anisocalyx*, mais sans succès. Il l'attribuait aux *Plumularia*.

Gen. *Atractylis* Wright 1858.

Ce genre (très voisin de *Perigonimus*) avait été établi par WRIGHT (1858 (a), p. 447) et modifié par HINCKS (1868, p. 87), mais ALLMAN (1871, p. 299) ayant reconnu que le nom d'*Atractylis* était déjà employé en botanique, l'a remplacé par celui de *Wrightia*.

Gen. *Bimeria* Wright 1859.

WRIGHT (1859 a) a créé ce genre en même temps qu'ALLMAN (1859 b) établissait le genre *Manicella* qui en est synonyme. ALLMAN a proposé lui-même l'adoption du nom de *Bimeria*.

Bimeria vestita Wright.

<i>Bimeria vestita</i>	WRIGHT	1859 (a) p. 109, pl. 8, fig. 4.
» »	WRIGHT	1859 (b) p. 174.
<i>Manicella fusca</i>	ALLMAN	1859 (b) p. 51, 143.
<i>Bimeria vestita</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 355, note.
» »	WRIGHT	1861 (b) p. 130.
» »	WRIGHT	1861 (c) p. 160.
» »	WRIGHT	1863 (b) p. 250.
? <i>Bimeria nutans</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 390, note.
<i>Bimeria vestita</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 364.
» »	PARFITT	1866 (a) p. 6.
» »	HINCKS	1868 p. 103, pl. 15, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871 p. 297, pl. 12, fig. 1-3.

Gen. *Bougainvillia* Lesson 1836.

Voir : Matériaux II, p. 48.

L'orthographe de ce nom a varié. LESSON écrivait *Bugainvillia* et FORBES, *Bougainvillea*.

Bougainvillia carolinensis (Mac Crady).

<i>Hippocrene carolinensis</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 162, 164, 189, pl. 10, fig. 8-10.
<i>Margelis carolinensis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 344.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 156, 157, 224, fig. 241-248.
<i>Bougainvillia carolinensis</i>	ALLMAN	1871 p. 316.

Bougainvillia fruticosa Allman.

<i>Eudendrium ramosum</i>	ALLMAN	1859 (c) p. 312.
<i>Bougainvillia fruticosa</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 366.
»	ALLMAN	1864 (d) p. 58.
»	HINCKS	1868 p. 110.
»	ALLMAN	1871 p. 314, pl. 9, fig. 1-4.

Bougainvillia muscus Allman.

<i>Perigonimus muscus</i>	ALLMAN	1863 (b) p. 12.
<i>Bougainvillia muscus</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 366.
»	HINCKS	1868 p. 111.
»	ALLMAN	1871 p. 317, pl. 10, fig. 1-3.
»	HINCKS	1871 (b) p. 78.

Bougainvillia ramosa (van Beneden).

Voir : Matériaux II, p. 48.

Méduse : *Margelis ramosa*.

Voir : Matériaux II, p. 138.

<i>Eudendrium ramosum</i>	OWEN	1849 p. 11.
<i>Bougainvillia britannica</i>	BUSCH	1851 p. 19.
? <i>Bougainvillia dipectanos</i>	BUSCH	1854 p. 22, pl. 2, fig. 9.
<i>Hippocrene britanica</i>	FORBES	1853 p. 313.
<i>Bougainvillea brittanica</i>	GEGENBAUR	1854 p. 175.
<i>Eudendrium ramosum</i>	GEGENBAUR	1854 p. 168, 169, 180, 181, 184, 199 et 216.
»	ALDER	1856 (a) p. 355.

<i>Hippocrene britannica</i>	THOMPSON	1856	p. 447.
<i>Eudendrium ramosum</i>	CARUS	1857	pl. 2, fig. 3-4.
<i>Bougainvillea britannica</i>	GREENE	1857	p. 175, 176, 243, 246, 247.
<i>Eudendrium ramosum</i>	SARS	1857 (a)	p. 155.
»	ALDER	1858	p. 105.
»	WRIGHT	1858 (a)	p. 447, 448.
<i>Atractylis ramosa</i>	WRIGHT	1858 (a)	p. 449, pl. 22, fig. 1-3.
<i>Bougainvillia britannica</i>	WRIGHT	1858 (a)	p. 449.
<i>Medusa oculia</i>	WRIGHT	1858 (a)	p. 449.
? <i>Eudendrium ramosum</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 368, note.
»	MC CRADY	1859 (b)	p. 144, 159, 166, 167.
<i>Hippocrene brittanica</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 161.
<i>Bougainvillea brittanica</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 124.
<i>Atractylis ramosa</i>	CLAPARÈDE	1860	p. 404.
<i>Bougainvillea britannica</i>	CLAPARÈDE	1860	p. 405.
<i>Margelis ramosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 344.
<i>Atractylis ramosa</i>	GREENE	1861	p. 62.
<i>Bougainvillea britannica</i>	GREENE	1861	p. 62.
<i>Atractylis ramosa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 160.
»	WRIGHT	1861 (b)	p. 125, 126.
<i>Bougainvillea britannica</i>	WRIGHT	1861 (b)	p. 126.
<i>Atractylis ramosa</i>	ALDER	1863	p. 232.
<i>Perigonimus ramosus</i>	ALLMAN	1863 (b)	p. 12.
<i>Atractylis (Eudendrium)</i>			
<i>ramosa</i>	WRIGHT	1863 (a)	p. 134.
<i>Atractylis ramosa</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 278, 280.
<i>Bougainvillia britannica</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 251, 280.
<i>Bougainvillia ramosa</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 363, 366.
»	ALLMAN	1864 (d)	p. 58.
<i>Tubularia ramosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 157.
<i>Bougainvillia britannica</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 155, 157.
<i>Atractylis ramosa</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 6.
<i>Eudendrium ramosum</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 48, 112, pl. 6-7.
<i>Bougainvillia ramosa</i>	HINCKS	1868	p. 109, pl. 19, fig. 2
<i>Margelis ramosa</i>	NORMAN	1869	p. 327.
<i>Eudendrium ramosum</i>	HERKLOTS	1870	p. 396, 411, pl. 39, fig. 5, pl. 42, fig. 14.

<i>Bougainvillia ramosa</i>	ALLMAN	1871	p. 28 ... 311, pl. 9, fig. 5-7.
<i>Eudendrium ramosum</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.

D'après HINCKS (1868, p. 113) la figure 2 de la pl. 4 de van BENEDEN (1844 b) doit se rapporter à une autre espèce que la *Bougainvillia ramosa*.

Bougainvillia superciliaris (L. Agassiz).

<i>Hippocrene superciliaris</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a)	p. 273, pl. 1-3.
»	»	BUSCH	1851 p. 19, 20.
»	»	STIMPSON	1854 p. 11.
»	»	GEGENBAUR	1856 (b) p. 225, 227.
<i>Bougainvillia superciliaris</i>	LEUCKART	1856 (a)	p. 25, 27.
<i>Margeliä superciliaris</i>	MÖRCH	1857	p. 24.
<i>Hippocrene superciliaris</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 124, 163.
<i>Bougainvillia superciliaris</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 289, 344, fig. 37-39, pl. 27, fig. 1-7.
»	»	CLARK	1864 p. 62.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 97, fig. 24-25.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 152, 153, 158, 224- 226, fig. 232-240.
<i>Hippocrene superciliaris</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 156.
<i>Bougainvillia superciliaris</i>	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 69, fig. 92-97.
»	»	ALLMAN	1871 p. 315.

Gen. *Calicella* Hincks 1859.

Voir : *Calycella*.

Gen. *Calycella* Hincks 1859.

HINCKS (1859 a) a proposé l'établissement de ce genre dont il a donné la diagnose un peu plus tard (1861 c). ALLMAN (1864 a et c) écrit « *Calycella* », orthographe qui est adoptée aujourd'hui. En 1868, HINCKS a donné une nouvelle diagnose de ce genre dont il a restreint les limites.

Calycella fastigiata (Alder).

<i>Campanularia fastigiata</i>	ALDER	1860	p. 73, pl. 5, fig. 1.
»	GREENE	1861	fig. 92.
»	SARS	1863	p. 34 (Excl. syn.).
<i>Calycella fastigiata</i> pp.	ALLMAN	1864	(d) p. 62 (Excl. syn.?).
<i>Campanularia fastigiata</i>	AGASSIZ, A.	1865	(c) p. 71.
<i>Calicella fastigiata</i>	NORMAN	1867	p. 196, 199.
<i>Calycella fastigiata</i>	HINCKS	1868	p. 208, pl. 39, fig. 3.
»	NORMAN	1869	p. 322.
»	HINCKS	1871	(b) p. 73, 80.

Calycella plicatilis (Sars).

<i>Lafoea plicatilis</i>	SARS	1863	p. 31 (Excl. syn.).
»	ALLMAN	1864	(c) p. 379.
<i>Calycella fastigiata</i> pp.	ALLMAN	1864	(d) p. 62.
<i>Lafoea plicatilis</i>	HINCKS	1868	p. 208, fig. 25.

SARS (1863) qui décrit cette espèce sous le nom de *Lafoea plicatilis* supposait qu'elle pouvait être synonyme de la *Campanularia (Calycella) fastigiata* d'ALDER. Cette opinion a été adoptée par ALLMAN (1864 d), mais HINCKS (1868) croit que ces 2 espèces sont distinctes.

Calycella syringa (Linné).

Syn. : *Campanularia syringa* et *Clytia syringa*.

Voir : Matériaux I, p. 432 et II, p. 54.

<i>Sertularia syringa</i>	THOMPSON	1831	p. 96.
<i>Campanularia syringa</i>	MAITLAND	1851	p. 43.
»	HINCKS	1852	p. 82, pl. 3, fig. 1-3.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 166, pl. 11, fig. 37.
»	HINCKS	1853	p. 178.
»	THOMPSON	1853	(b) p. 443.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	STIMPSON	1854	p. 8.
»	GOSSE	1855	p. 25.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.

<i>Campanularia syringa</i>	HINCKS	1856	p. 470 note.
»	»	THOMPSON	1856 p. 458.
»	»	ALDER	1858 p. 98, 99, 113, 128.
»	»	WRIGHT	1858 (a) p. 254, 454.
<i>Calicella syringa</i>	ALDER	1860	p. 73.
<i>Wrightia syringa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62,	vol. 4, p. 354.
<i>Campanularia syringa</i>	GREENE	1861	p. 94, fig. 19 (e-g).
<i>Calicella syringa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 293, 294.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 290.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
<i>Calycella syringa</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 372.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 375.
<i>Campanularia syringa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 71.
<i>Calicella syringa</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 13.
<i>Calycella syringa</i>	ALDER	1867	p. 50.
<i>Campanularia syringa</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 150, 163.
<i>Calycella syringa</i>	HINCKS	1868	p. 206, pl. 39, fig. 2.
»	»	NORMAN	1869 p. 322.
<i>Campanularia syringa</i>	HERKLOTS	1870	p. 398, pl. 36, fig. 8.
<i>Calycella syringa</i>	ALLMAN	1871	p. 25, fig. 3, p. 48.

Gen. *Campaniclava* Allman 1864.

Campaniclava cleodoræ (Gegenbaur).

<i>Syncoryna cleodoræ</i>	GEGENBAUR	1854	p. 166, 171, 193, 216, pl. 1, fig. 3-4.
»	»	SARS	1857 (a) p. 150.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347,
<i>Campaniclava cleodoræ</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 352.
<i>Syncoryna cleodoræ</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 50, 129.
<i>Campaniclava cleodoræ</i>	ALLMAN	1871	p. 261.

Gen. *Campanularia* Lamarek 1816.

Voir : Matériaux I, p. 428 et II, p. 48.

Nous avons adopté, dans cette 3^{me} partie des *Matériaux*, le système de HINCKS (1868, p. 141) qui supprime le genre *Lao-*

medea (voir plus loin au gen. *Laomedea*) et adopte les 3 genres *Campanularia*, *Clytia* et *Obelia*.

Campanularia amphora A. Agassiz.

<i>Laomedea amphora</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 311, 352, fig. 50, pl. 30 et 31. fig. 1-8.
<i>Campanularia amphora</i>	AGASSIZ, A.	1862 p. 225.
<i>Laomedea amphora</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 373.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 93, 94, 125, 223- 225.
»	AGASSIZ, E. et A.	1865 p. 65.
»	CLARK	1865 (b) p. 33, 284, fig. 14 et 187.
»	HINCKS	1865 (b) p. 408, pl. 2, fig. 9.

Campanularia angulata Hincks.

<i>Laomedea angulata</i>	HINCKS	1859 (a) p. 126.
»	HINCKS	1861 (c) p. 261, 292, pl. 8.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 373.
»	PARFITT	1866 (a) p. 12.
<i>Campanularia angulata</i>	HINCKS	1868 p. 170, pl. 34. fig. 1 et p. 136, fig. 14.

Campanularia antipathes (Lamarck).

Voir : Matériaux I, p. 429 et II, p. 48.

<i>Sertularia antipathes</i>	LAMARCK	1816 vol. 2, p. 115
<i>Laomedea antipathes</i>	BUSK	1852 p. 402.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 223.

Campanularia brasiliensis Meyen.

Voir : Matériaux II, p. 48.

Campanularia calceolifera Hincks.

<i>Campanularia calceolifera</i>	HINCKS	1871 (b) p. 78, pl. 6.
----------------------------------	--------	------------------------

Campanularia caliculata Hincks.

<i>Campanularia caliculata</i>	HINCKS	1853	p. 178, pl. 5, fig. B.
»	»	THOMSON	1853 (b) p. 443.
»	»	GOSSE	1855 p. 25.
»	»	THOMPSON	1856 p. 491.
»	»	SARS	1857 (a) p. 158.
<i>Campanularia breviscyphia</i>	SARS	1857 (a)	p. 158, pl. 1, fig. 12-13.
<i>Clytia poterium</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, pl. 28, 29, fig. 1-5.
<i>Clytia(Orthopyxis)poterium</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 297, fig. 40 (pl. 28, 29, fig. 1-5).
<i>Orthopyxis poterium</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
<i>Campanularia caliculata</i>	GREENE	1861	p. 44.
»	»	ALLMAN	1862 p. 61, 64.
? <i>Clytea posterior</i>	WRIGHT	1862 (c)	p. 308.
<i>Laomedea caliculata</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 368.
<i>Clytia poterium</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 371.
<i>Campanularia breviscyphia</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
<i>Laomedea poterium</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 373.
<i>Laomedea caliculata</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 373.
<i>Orthopyxis poterium</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 81, 223... 226.
<i>Campanularia caliculata</i>	HINCKS	1868	p. 164, pl. 31, fig. 2.
<i>Laomedea caliculata</i>	ALLMAN	1871	p. 45, 229.
<i>Laomedea (Clytia) poterium</i>	ALLMAN	1871	p. 48.
? <i>Laomedea repens</i>	ALLMAN	1871	p. 49, fig. 20.

Campanularia clytioides (Lamouroux).

<i>Tubularia clytioides</i>	LAMOUREUX	1824 (b)	p. 620, pl. 95, fig. 6-8.
<i>Silicularia gracilis</i>	MEYEN	1834	p. 206, pl. 35, fig. 12-13.
<i>Tubularia cycloides</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 135.
<i>Silicularia gracilis</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 136.

Nous n'avions pas fait figurer cette espèce dans les Matériaux II, car la *Tubularia clytioides* Lamouroux, et la *Silicularia gracilis* Meyen, nous semblaient indéterminables. Mais HARTLAUB (1905) et RITCHIE (1909) ont retrouvé

cette espèce et BILLARD a pu en examiner des fragments du type. On doit donc la rétablir.

Campanularia decipiens (Wright).

<i>Laomedea decipiens</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 352, pl. 17, fig. 9.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 373.
<i>Campanularia decipiens</i>	HINCKS	1868 p. 173.

Campanularia dichotoma (Linné).

Syn. : *Laomedea dichotoma* Lamouroux.

Matériaux I, p. 429 et II, p. 49.

Voir : *Obelia dichotoma*.

Campanularia exigua (Sars).

<i>Campanularia</i> sp?	GEGENBAUR	1854 p. 188, 217, pl. 1, fig. 5.
<i>Laomedea exigua</i>	SARS	1857 (a) p. 159.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 373.
<i>Campanularia exigua</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 163.
» »	HINCKS	1868 p. 172, pl. 28, fig. 2.

Campanularia flexuosa (Alder).

Voir : Matériaux I, p. 430 et II, p. 50.

? <i>Campanularia gelatinosa</i>	THOMSON	1854 p. 313, 314.
<i>Laomedea flexuosa</i>	ALDER	1856 (b) p. 440.
» »	ALDER	1858 p. 98, 122, 123.
» »	ALLMAN	1859 (b) p. 137.
» »	HINCKS	1861 (a) p. 73.
» »	HINCKS	1861 (c) p. 153, 260.
» »	KIRCHENPAUER	1862 p. 17, 22, 40, 57. Excl. syn. p. p.
» »	NORMAN	1862 p. 152.
» »	ALLMAN	1864 (a) p. 364, 366, 370, 383, 392, 394, 395, 403, 404, 425, fig. 14 et 20.

<i>Laomedea flexuosa</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 373.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 12.
<i>Campanularia flexuosa</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 147, 150, fig. 8 et 11.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	HELLER	1868	p. 45, 82.
<i>Campanularia flexuosa</i>	HINCKS	1868	p. 168, pl. 33.
»	NORMAN	1869	p. 322.
<i>Laomedea flexuosa</i>	ALLMAN	1871	p. 44... 168, fig. 14, 18, 31, 33, 39.

Campanularia fragilis Hincks.

<i>Laomedea fragilis</i>	HINCKS	1862 (c)	pl. 9, fig. 3.
»	HINCKS	1863	p. 46.
? <i>Campanularia elongata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 150, 164.
<i>Campanularia fragilis</i>	HINCKS	1868	p. 175, pl. 32, fig. 3.

Campanularia gegenbauri Sars.

<i>Campanularia</i> sp?	GEGENBAUR	1854	p. 166, 217, pl. 1, fig. 1.
<i>Campanularia</i> sp?	CARUS	1857	pl. 2, fig. 1-2.
<i>Campanularia gegenbauri</i>	SARS	1857 (a)	p. 157.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 354.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 148.
»	HINCKS	1868	p. 145.

D'après HINCKS (1868, p. 145), cette espèce serait, peut-être, une simple variété de *Clytia Johnstoni*.

Campanularia gelatinosa (Pallas).

Syn. : *Laomedea gelatinosa* Lamouroux.

Matériaux I, p. 430 et II, p. 50.

Voir : *Obelia gelatinosa*.

Campanularia geniculata (Linné).

Syn. : *Laomedea geniculata* Lamouroux

Matériaux I, p. 430 et II, p. 51.

Voir : *Obelia geniculata*.

Campanularia gigantea Hincks.

<i>Campanularia gigantea</i>	HINCKS	1866 (a)	p. 297.
»	»	HINCKS	1868 p. 174, pl. 35, fig. 1.

Campanularia hincksi Alder.

<i>Campanularia volubilis</i> var.	HINCKS	1853	p. 180.
<i>Campanularia hincksi</i>	ALDER	1856 (a)	p. 360, pl. 13, fig. 9.
»	»	ALDER	1858 p. 127, pl. 4, fig. 9.
»	»	ALDER	1860 p. 74, note.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354, note.
»	»	HINCKS	1861 (b) p. 280.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 155, 292.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 372.
<i>Campanularia hincksi</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 12.
<i>Campanularia hincksi</i>	ALDER	1867	p. 50.
»	»	NORMAN	1867 p. 199.
»	»	HINCKS	1868 p. 162, fig. 18 et pl. 24. fig. 3.
»	»	NORMAN	1869 p. 322.

Campanularia integra Macgillivray.

Voir : Matériaux II, p. 53.

<i>Campanularia integra</i>	MAITLAND	1851	p. 43.
»	»	LANDSBOROUGH	1852 p. 165, pl. 11, fig. 38.
?	»	SARS	1853 p. 387.
»	»	THOMSON	1853 (b) p. 443.
»	»	GOSSE	1855 p. 25.
? <i>Campanularia laevis</i>	GOSSE	1855	p. 25.
<i>Campanularia integra</i>	HINCKS	1855	p. 130, pl. 3.
»	»	THOMPSON	1856 p. 459.
»	»	ALDER	1858 p. 98, 128.
<i>Laomedea integra</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
<i>Campanularia integra</i>	HINCKS	1862 (b)	p. 361.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 372.
»	»	MC INTOSH	1866 p. 602.

<i>Campanularia neglecta</i>	HINCKS	1868	p. 163, pl. 31, fig. 1.
»	»	NORMAN	1869 p. 322.
»	»	HERKLÖTS	1870 p. 398, pl. 36, fig. 7.

Campanularia lairii M. Edwards.

Syn. : *Laomedeia lairii* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 431 et II, p. 53.

Cette espèce est synonyme d'*Obelia geniculata* ainsi que l'a montré BILLARD.

Campanularia macrocyttara (Lamouroux).

Voir : Matériaux II, p. 53.

Campanularia maior Meyen.

Voir : Matériaux II, p. 53.

Campanularia neglecta (Alder).

<i>Laomedeia neglecta</i>	ALDER	1856	(b) p. 440, pl. 16, fig. 1-2.
»	»	ALDER	1858 p. 123, pl. 5, fig. 1-2.
»	»	GREENE	1861 p. 94, fig. 19 (a, b).
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 260, 290, 293.
»	»	ALDER	1863 p. 237.
»	»	HINCKS	1863 p. 47.
»	»	WRIGHT	1863 (b) p. 352.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 373.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 12.
<i>Campanularia neglecta</i>	HINCKS	1868	p. 171, pl. 30, fig. 2.
»	»	HINCKS	1869 pl. 45, fig. 2.
»	»	NORMAN	1869 p. 322.

Campanularia olivacea M. Edwards.

Syn. : *Clytia olivacea* Lamouroux.

Syn. : *Laomedeia olivacea* Blainville.

Voir : Matériaux I, p. 432 et II, p. 54

Cette espèce, ainsi que BILLARD l'a montré, est synonyme de *Campanularia verticillata*.

Campanularia raridentata Alder.

<i>Campanularia raridentata</i>	HINCKS	1861 (c) p. 292.
»	»	ALDER 1862 p. 315, pl. 14, fig. 5.
»	»	WRIGHT 1862 (c) p. 222.
»	»	ALDER 1863 p. 238, pl. 10, fig. 5.
»	»	ALDER 1863 (a) p. 290.
»	»	ALLMAN 1864 (a) p. 416.
»	»	ALLMAN 1864 (c) p. 372, 378.
<i>Campanularia raridenta</i>	PARFITT	1866 (a) p. 12.
<i>Campanularia raridentata</i>	ALDER	1867 p. 50.
»	»	HINCKS 1868 p. 176, pl. 26, fig. 2.
»	»	ALLMAN 1871 p. 97.

Campanularia reptans (Lamouroux).

Voir : Matériaux I, p. 432 et II, p. 54.

? <i>Sertularia reptans</i>	HALLIER	1863 p. 280.
<i>Laomedea reptans</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 225.

Cette espèce est très douteuse. BILLARD n'a pas pu en retrouver le type. Il croit qu'elle pourrait bien être identique à la variété naine d'*Obelia geniculata* (L.) signalée par BALE en 1893.

Campanularia syringa (Linné).

Syn. : *Clytia syringa* Lamouroux.

Matériaux I, p. 432 et II, p. 54.

Voir : *Calycella syringa*.

Campanularia tincta Hincks.

<i>Hincksia tincta</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 355.
<i>Campanularia tincta</i>	HINCKS	1861 (b) p. 280, pl. 12.
<i>Hincksia tincta</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 374.

Campanularia undulata M. Edwards.Syn. : *Clytia undulata* Lamouroux.

Voir : Matériaux II, p. 55.

Cette espèce, d'après BILLARD, doit être supprimée. Le type est indéterminable.

Campanularia urnigera Blainville.Syn. : *Clytia urnigera* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 433 et II, p. 55.

D'après BILLARD, cette espèce, dont le type est indéterminable, doit être supprimée.

Campanularia vermicularis van Beneden.*Campanularia vermicularis* BENEDEN (van) 1867 (a) p. 162.

Espèce douteuse!

Campanularia verticillata (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 433 et II, p. 55.

<i>Campanularia verticillata</i>	THOMPSON	1834	p. 98.
»	»	FORBES	1851 p. 246.
»	»	MAITLAND	1851 p. 44.
»	»	SARS	1851 p. 126, 131.
»	»	LANDSBOROUGH	1852 p. 167, pl. 11, fig. 34.
»	»	IRVINE	1854 p. 245.
»	»	GOSSE	1855 p. 25.
»	»	HINCKS	1855 p. 130.
»	»	TEMPLER	1855 p. 4576.
»	»	THOMPSON	1856 p. 459.
<i>Campanularia (Clytia) olivacea</i>	MÖRCH	1857	p. 25.
<i>Campanularia verticillata</i>	ALDER	1858	p. 99, 128.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354, note.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 154, 291, 292.
»	»	PACKARD	1863 p. 404.
<i>Clytia olivacea</i>	PACKARD	1863	p. 422.

<i>Campanularia verticillata</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 372.
<i>Campanularia olivacea</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 226.
<i>Campanularia verticillata</i>	MC INTOSH	1866 p. 602.
<i>Campanularia verticillata</i>	PARFITT	1866 (a) p. 13.
<i>Campanularia verticillata</i>	ALDER	1867 p. 50.
»	NORMAN	1867 p. 199.
»	HINCKS	1868 p. 167, pl. 32, fig. 1.
»	DÖNITZ	1869 p. 10, 11.
»	NORMAN	1869 p. 322.
»	SARS	1869 p. 251 (Trad. angl., p. 426.
»	HERKLOTS	1870 p. 399, pl. 36, fig. 9.
<i>Campanularia verticellata</i>	ALLMAN	1871 p. 165.
<i>Laomedea verticillata</i>	ALLMAN	1871 p. 169, 170.
<i>Campanularia verticillata</i>	METZGER	1871 (b) p. 34.

Campanularia volubiliformis Sars.

<i>Campanularia</i> sp. ?	GEGENBAUR	1854 p. 189, 217, pl. 1, fig. 8.
<i>Campanularia volubilifor-</i> <i>mis</i>	SARS	1857 (a) p. 156, 157.
»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 355.
<i>Laomedea volubiliformis</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 373.
<i>Campanularia volubilifor-</i> <i>mis</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 148, 167.
»	HELLER	1868 p. 46, 82.

Campanularia volubilis (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 433 et II, p. 56.

<i>Campanularia volubilis</i>	COUCH	1843	p. 209.
♀	»	FORBES	1851 p. 246.
	»	MAITLAND	1851 p. 43.
	»	SARS	1851 p. 138.
♀	»	BUSK	1852 p. 386, 388, 401.
	»	LANDSBOROUGH	1852 p. 163, pl. 11, fig. 36.
	»	SARS	1853 p. 387.
	»	THOMSON	1853 (b) p. 443.

<i>Campanularia volubilis</i>	IRVINE	1854	p. 245.
»	HINCKS	1855	p. 130.
? »	LEIDY	1855	p. 138.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	ALDER	1856 (a)	p. 358, pl. 13, fig. 7.
»	THOMPSON	1856	p. 458.
»	MÖRCH	1857	p. 25.
»	SARS	1857 (a)	p. 156, 157.
»	ALDER	1858	p. 99, 125, pl. 4, fig. 7.
»	GREENE	1861	p. 94, fig. 19 (c).
»	HINCKS	1861 (c)	p. 291.
»	MEYER U. MÖBIUS	1862	p. 231.
»	ALDER	1863 (a)	p. 290.
? <i>Sertularia volubilis</i>	HALLIER	1863	p. 280.
<i>Campanularia volubilis</i>	ALDER	1864	p. 193.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 226.
<i>Campanularia volubilis</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 12.
<i>Campanularia volubilis</i>	ALDER	1867	p. 49.
»	MARCUSEN	1867	p. 358.
»	HINCKS	1868	p. 160, pl. 24, fig. 2.
»	DÖNITZ	1869	p. 11.
»	NORMAN	1869	p. 322.
<i>Laomedea volubilis</i>	ALLMAN	1871	p. 157, 169.

Gen. *Campanulina* van Beneden 1847.

Voir : Matériaux II, p. 57.

Campanulina repens Allman.

<i>Campanulina repens</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 376.
»	ALLMAN	1864 (d)	p. 61.
»	HINCKS	1868	p. 189, pl. 38, fig. 1.

Campanulina tenuis van Beneden.

Voir : Matériaux II, p. 57.

<i>Laomedea acuminata</i>	ALDER	1856 (b)	p. 441, pl. 16, fig. 5-8.
---------------------------	-------	----------	---------------------------

<i>Laomedea acuminata</i>	WRIGHT	1857 (c) p. 169.
»	ALDER	1858 p. 124, pl. 5, fig. 5-8.
»	WRIGHT	1858 (a) p. 224, pl. 13-14.
»	ALLMAN	1859 (b) p. 137.
»	ALLMAN	1859 (c) p. 317, note.
<i>Campanulina tenuis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 351 (Excl. syn.).
<i>Laomedea acuminata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354.
»	WRIGHT	1862 (a) p. 317.
»	ALDER	1863 p. 238.
<i>Campanulina (Laomedea)</i>		
<i>acuminata</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 364.
<i>Laomedea acuminata</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 416.
<i>Campanulina acuminata</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 376.
»	ALLMAN	1864 (d) p. 61.
<i>Laomedea acuminata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 71.
»	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 173.
<i>Campanulina tenuis</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 174, 176, pl. 13.
<i>Campanulina acuminata</i>	HINCKS	1868 p. 187, fig. 21 et pl. 37.
<i>Wrightia acuminata</i> Ag. sec.	HINCKS	1868 p. 187. In syn.
<i>Campanulina acuminata</i>	ALLMAN	1871 p. 41.
<i>Laomedea acuminata</i>	ALLMAN	1871 p. 97.

Cette espèce a été décrite sous le nom de *Campanulina tenuis* par van BENEDEN, en 1847, et sous celui de *Laomedea acuminata* par ALDER, en 1856. Il n'y a donc aucune raison pour lui donner le nom de *Campanulina acuminata* comme le font ALLMAN (1864 a) et HINCKS (1868).

Campanulina turrita Hincks.

<i>Campanulina turrita</i>	HINCKS	1868 p. 190, pl. 36, fig. 2.
----------------------------	--------	------------------------------

Gen. *Ceratella* Gray 1868.

GRAY (1868) a établi la famille des Ceratelladae, comprenant deux nouveaux genres : *Ceratella* et *Dehitella*. Les organismes qu'il y plaçait, et qu'il considérait comme étant des Eponges, ont été étudiés plus tard par CARTER (1873) et par BALE (1888).

Ces naturalistes ont montré qu'il s'agissait d'Hydroïdes et non d'Eponges. KÖLLIKER (1872) pensait que l'on devait faire rentrer les *Ceratella* dans le genre *Solanderia* de DUCHASSAING et MICHELIN qu'il plaçait parmi les Eponges. On est d'accord, aujourd'hui pour reconnaître que ces divers genres appartiennent aux Hydroïdes. Il reste à savoir si l'on doit supprimer le genre *Ceratella*, en le considérant comme synonyme de *Solanderia*, ou s'il faut le conserver comme l'ont fait, jusqu'à présent, la plupart des auteurs. Nous pensons qu'il convient, dans tous les cas, de le conserver jusqu'au moment où l'on aura des renseignements précis sur l'espèce d'après laquelle DUCHASSAING et MICHELIN ont établi le genre *Solanderia*.

Ceratella fusca Gray.

<i>Ceratella fusca</i>	GRAY	1868 p. 579, fig. 2.
------------------------	------	----------------------

Gen. *Cionistes* Wright 1861.

WRIGHT écrivait tantôt *Cionistes* tantôt *Kionistes*. C'est la première de ces orthographes qui a été généralement adoptée.

Cionistes reticulata Wright.

<i>Cionistes reticulata</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 123, fig. 1.
<i>Kionistes retiformis</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 91, fig.
<i>Cionistes reticularis</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 277.
<i>Cionistes reticulata</i>	ALLMAN	1864 (d) p. 62.
» »	HINCKS	1868 p. 135.
» »	ALLMAN	1871 p. 309.

Gen. *Cladocoryne* Rotch 1871.

Cladocoryne floccosa Rotch.

<i>Cladocoryne floccosa</i>	ROTCH	1871 p. 228.
» »	ALLMAN	1871 p. 380, fig. 82.

Gen. *Cladonema* Dujardin 1843.

Voir : Matériaux II, p. 58.

Cladonema radiatum Dujardin.

Voir : Matériaux II, p. 58 et 132.

<i>Coryne stauridia</i>	GOSSE	1853 (a) p. 257, 434, pl. 16, fig. 1-5.
<i>Stauridium</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 302.
<i>Syncoryne stauridium</i>	KROHN	1853 (a) p. 137.
<i>Cladonema radiatum</i>	KROHN	1853 (b) p. 420 ss., pl. 13.
<i>Coryne stauridia</i>	GOSSE	1855 p. 20.
<i>Cladonema</i>	GEGENBAUR	1856 (a) p. 236, 237.
<i>Cladonema radiatum</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 230, 268.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 341.
» »	KEFERSTEIN U. EHLERS	1861 p. 85, pl. 13, fig. 5.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 360.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 139, pl. 12.
» »	HINCKS	1868 p. 62, pl. 11 et p. 64, fig. 5.
» »	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
» »	ALLMAN	1871 p. 216, 357, pl. 17.
» »	ROTCH	1871 p. 227.
» »	SPAGNOLINI	1871 p. 201.

Gen. *Clava* Gmelin 1788.

Voir : Matériaux I, p. 435 et II, p. 58.

Clava diffusa Allman.

<i>Clava diffusa</i>	ALLMAN	1863 (b) p. 8.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 351.
» »	HINCKS	1868 p. 9.
» »	NORMAN	1869 p. 256, 257, 323.
» »	ALLMAN	1871 p. 247, pl. 2, fig. 3-4.

Clava leptostyla L. Agassiz.

<i>Clava leptostyla</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 218, 338, fig. 32, pl. 20, fig. 11-16 a, pl. 21.
» »	ALLMAN	1864 (a) p. 396.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 351.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 170, 224, 225, fig. 274.
» »	HINCKS	1866 (a) p. 299.
» »	HINCKS	1868 p. 6, pl. 2, fig. 1.
» »	ALLMAN	1871 p. 75, 248.

Clava multicornis (Forskål).

Voir : Matériaux I, p. 435 et II, p. 58.

<i>Clava multicornis</i>	LANDSBOROUGH	1852 p. 104.
» »	GOSSE	1853 (a) p. 206, 434.
» »	STIMPSON	1854 p. 11.
» »	GOSSE	1855 p. 19, fig. 23.
» »	LEIDY	1855 p. 135, pl. 11, fig. 33- 34.
» »	THOMPSON	1856 p. 451.
» »	WRIGHT	1857 (b) p. 80. Excl. syn. p. p.
<i>Clava repens</i>	WRIGHT	1857 (b) p. 80, 81, pl. 2, fig. 1.
<i>Clava multicornis</i>	ALDER	1858 p. 98, 100.
<i>Clava discreta</i>	ALLMAN	1859 (b) p. 369.
<i>Clava multicornis</i>	ALLMAN	1859 (b) p. 369.
<i>Clava repens</i>	WRIGHT	1859 (a) p. 106.
» »	WRIGHT	1859 (b) p. 175.
<i>Clava multicornis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 338.
» »	GREENE	1861 p. 46.
» »	HINCKS	1861 (c) p. 157.
<i>Clava repens</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 131.
<i>Clava multicornis</i>	ALLMAN	1862 p. 54.
» »	MEYER u. MÖBIUS	1862 p. 231.
» »	NORMAN	1862 p. 152.
» »	ALLMAN	1863 (b) p. 9.

<i>Clava multicornis</i>	PACKARD	1863	p. 404.
<i>Clava repens</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 284.
<i>Clava multicornis</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 367, 396, 416, fig. 6 A.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 350.
<i>Clava repens</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 350.
<i>Clava multicornis</i>	KÖLLIKER	1864	p. 233.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 170.
»	KÖLLIKER	1865	p. 103, pl. 11, fig. 9.
»	MC INTOSH	1866	p. 602.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 5.
<i>Clava repens</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 123
<i>Clava multicornis</i>	HINCKS	1868	p. 2, pl. 1, fig. 4.
»	NORMAN	1869	p. 322.
»	HERKLOTS	1870	p. 395, pl. 40, fig. 8.
»	ALLMAN	1871	p. 75, 110, 246, pl. 2, fig. 1-2.
»	HINCKS	1871 (b)	p. 74.
»	METZGER	1871 (b)	p. 22, 34.

Clava nodosa Wright.

<i>Clava nodosa</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 378.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 351.
»	HINCKS	1868	p. 9.
»	ALLMAN	1871	p. 249.

Clava squamata (Müller).

Voir : Matériaux I, p. 435 et II, p. 59.

<i>Coryne squamata</i>	SCHULTZE	1850	p. 56.
<i>Clava parasitica</i>	MAITLAND	1851	p. 39.
<i>Coryna squamata</i>	SARS	1851	p. 130, 134.
<i>Coryne squamata</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 304.
»	LEUCKART	1853	p. 86, 87.
<i>Coryna squamata</i>	SARS	1853	p. 378.
<i>Coryne squamata</i>	GEGENBAUR	1854	p. 180, 185, 216.
»	THOMPSON	1856	p. 451.
<i>Clava squamata</i>	MÖRCH	1857	p. 24.

<i>Coryna squamata</i>	SARS	1857 (a) p. 148.
» »	SARS	1857 (b) p. 196.
<i>Clava membranacea</i>	WRIGHT	1857 (b) p. 80, pl. 2, fig. 2-3.
<i>Clava cornea</i>	WRIGHT	1857 (b) p. 80, pl. 2, fig. 4.
<i>Clava parasitica</i>	WRIGHT	1857 (b) p. 80 (Excl. syn. p. p.).
<i>Coryne squamata</i>	SARS	1860 p. 347 (Trad. allem.). (Excl. syn.).
<i>Clava cornea</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 131.
<i>Clava membranacea</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 131.
<i>Clava cornea</i>	NORMAN	1862 p. 152.
» »	WRIGHT	1863 (b) p. 284.
<i>Clava membranacea</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 284.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 351.
<i>Clava cornea</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 351.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 123.
<i>Clava membranacea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 123.
<i>Coryne squamata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 122, 123, fig.
<i>Clava squamata</i>	HINCKS	1868 p. 4, pl. 1, fig. 2.
<i>Clava cornea</i>	HINCKS	1868 p. 5, pl. 1, fig. 3.
» »	NORMAN	1869 p. 322.
<i>Clava squamata</i>	NORMAN	1869 p. 322.
» »	ALLMAN	1871 p. 110... 168, 243, pl. 1.

Gen. *Clavatella* Hincks 1861.

HINCKS (1861 a) a créé ce genre pour un Hydroïde donnant naissance à des Méduses semblables à celles que QUATREFAGES a décrites (1842 a) sous le nom d'*Eleutheria*.

Si l'espèce de QUATREFAGES est identique à celle d'HINCKS, le nom de *Clavatella* doit disparaître et tomber en synonymie d'*Eleutheria*. Mais comme les auteurs qui se sont occupés de ce groupe ne sont pas entièrement d'accord sur la synonymie des espèces, nous conserverons provisoirement les 2 genres.

Clavatella prolifera Hincks.

<i>Clavatella prolifera</i>	HINCKS	1861 (a) p. 74, pl. 7, fig. 1-2, pl. 8.
-----------------------------	--------	--

<i>Clavatella prolifera</i>	HINCKS	1861 (c) p. 158.
<i>Eleutheria</i>	KROHN	1861 p. 157 ss.
<i>Clavatella prolifera</i>	KROHN	1861 p. 157.
»	ALLMAN	1863 (a) p. 100.
»	ALLMAN	1864 (a) p. 358, fig. 3.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 361.
»	HINCKS	1865 (b) p. 414, pl. 1, fig. 6 et pl. 2, fig. 7.
»	PARFITT	1866 (a) p. 5
»	HINCKS	1868 p. 73, pl. 12, fig. 2. 2 a et p. 320, fig. 43-44.
»	ALLMAN	1871 p. 31... 212, 384, fig. 5 et pl. 18.
»	HINCKS	1871 (a) p. 185 ss., fig. 1-4.
»	HINCKS	1871 (b) p. 76.

Gen. *Clavula* Wright 1859.

WRIGHT (1859 (a) p. 106) a créé le genre *Clavula* et décrit sous le nom de *C. Gossii* le Polype qui donne naissance à la Méduse *Turris neglecta*. Ces deux noms étant synonymes, il convient de conserver seulement le dernier qui a la priorité.

Gen. *Clytia* Lamouroux 1812 p. p. — Hincks 1868.

Voir : Matériaux I, p. 436 et II, p. 60.

Le genre *Clytia* tel que l'a établi LAMOUROUX ne pouvait pas être maintenu, car il était synonyme de *Campanularia*. Mais HINCKS (1868, p. 140) l'a modifié et lui a attribué d'autres caractères qui permettent de le conserver.

L'orthographe du nom de *Clytia* a été souvent altérée. C'est ainsi que A. AGASSIZ (1862) écrivait *Clithia*, WRIGHT (1862 c), *Clytea* et van BENEDEN (1867), *Clythia*.

Clytia intermedia L. Agassiz.

<i>Clytia intermedia</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 305, pl. 29, fig. 10-11.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 77, 223, 224.

Clytia johnstoni (Alder).

Voir : Matériaux I, p. 436 : *Clytia volubilis*, et Matériaux II, p. 60.

<i>Campanularia volubilis</i>	HINCKS	1852 p. 84, pl. 3, fig. 5.
» »	GOSSE	1853 (a) p. 296, 434, pl. 18, 19.
» »	GEGENBAUR	1854 p. 167.
? » »	THOMPSON	1854 p. 313, 314.
» »	GOSSE	1855 p. 25, fig. 36.
<i>Campanularia johnstoni</i>	ALDER	1856 (a) p. 359, pl. 13, fig. 8.
<i>Campanularia volubilis</i>	ALDER	1856 (a) p. 360.
<i>Campanularia johnstoni</i>	ALDER	1858 p. 98, 99, 126, pl. 4, fig. 8.
<i>Campanularia volubilis</i>	ALDER	1858 p. 122, 128.
<i>Laomedeia longissima</i> p. p.	ALDER	1858 p. 122, pl. 5, fig. 4.
<i>Campanularia johnstoni</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 255, 452, 453.
» »	WRIGHT	1858 (b) p. 369, pl. 19, fig. 3-4.
» »	ALDER	1859 p. 353.
» »	ALLMAN	1859 (c) p. 315.
» »	HINCKS	1859 (a) p. 126.
<i>Campanularia volubilis</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 194.
<i>Clytia (Trochopyxis) bico-</i> <i>phora</i> et <i>Clytia (Trocho-</i> <i>pyxis) bicophora</i> et <i>Cly-</i> <i>tia bicophora</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 304, pl. 29, fig. 6-9, et p. 354.
<i>Clytia (Platypyxis) cylin-</i> <i>drica</i> p. p. et <i>Clytia cy-</i> <i>lindrica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 306, fig. 41 (non 42-44), pl. 27, fig. 8-9.
<i>Clytia volubilis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354.

<i>Campanularia johnstoni</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 354.
»	»	GREENE	1861 p. 94, fig. 19 (d).
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 291.
<i>Clithia bicophora</i>	AGASSIZ, A.	1862	p. 225.
<i>Campanularia johnstoni</i>	ALDER	1862	p. 316.
»	»	NORMAN	1862 p. 152.
<i>Clytea vicophora</i>	WRIGHT	1862 (c)	p. 308.
<i>Campanularia johnstoni</i>	ALDER	1863	p. 237, 238, 239.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 290.
»	»	WRIGHT	1863 (a) p. 39.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
»	»	ALLMAN	1864 (a) p. 353, 367, 400, 413, 417, 423, fig. 1 et 17.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 372.
<i>Campanularia bicophora</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
<i>Campanularia johnstoni</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 79.
<i>Clytia johnstoni</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 79.
<i>Clytia volubilis</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 79... 80, 223... 226.
<i>Clytia bicophora</i>	AGASSIZ, A.	1865 (a)	p. 94, fig. 14-15.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 72, 78, 79, 171, 223- 226, fig. 108-111.
»	»	AGASSIZ, E. et A.	1865 p. 56, fig. 70-73.
<i>Campanularia johnstoni</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 12.
<i>Campanularia johnstoni</i>	ALDER	1867	p. 50.
<i>Clythia volubilis</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 166, pl. 14, fig. 4-10.
<i>Campanularia johnstoni</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 171.
<i>Campanularia volubilis</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 146, 147, 149, 150. 168, 205, pl. 14, fig. 4-10.
<i>Campanularia johnstoni</i>	NORMAN	1867	p. 199.
»	»	ALLMAN	1868 p. 78.
<i>Campanularia volubilis</i>	HELLER	1868	p. 46, 82.
<i>Clytia johnstoni</i>	HINCKS	1868	p. 143, fig. 15-16, pl. 24, fig. 1.
<i>Campanularia volubilis</i>	DÖNITZ	1869	p. 11.
<i>Clytia johnstoni</i>	HINCKS	1869	pl. 45, fig. 5.
»	»	NORMAN	1869 p. 322.
<i>Campanularia volubilis</i>	HERKLOTS	1870	p. 398, pl. 36, fig. 4.

<i>Campanularia johnstoni</i>	ALLMAN	1871	p. 23... 168, fig. 2, 9, 38.
<i>Clytia (campanularia) volubilis</i>	DU PLESSIS	1871	p. 167, pl. 2.
<i>Clytia johnstoni</i>	HINCKS	1871 (b)	p. 79.
<i>Clythia volubilis</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.

Clytia noliformis (Mac Crady).

<i>Campanularia noliformis</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 192, 194, 196, 216, pl. 11, fig. 4.
<i>Clytia (Platypyxis) cylindrica</i> p. p. et <i>Clytia cylindrica</i> p. p.	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 306, fig. 42-44 (non fig. 41, nec pl. 27, fig. 8-9).
<i>Platypyxis cylindrica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 354.
<i>Campanularia noliformis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 354.
» »	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
<i>Campanularia cylindrica</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
<i>Clytia cylindrica</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 79.
<i>Platypyxis cylindrica</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 77, 80, 223, 224, fig. 112-114.

Gen. *Coppinia* Hassal 1848.

Voir : Matériaux II, p. 61.

Coppinia arcta (Dalyell).

Voir : Matériaux II, p. 61.

<i>Coppinia mirabilis</i>	HASSAL et COPPIN	1852	p. 160, pl. 12, fig. 1-2.
<i>Campanularia intertexta</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 166.
<i>Sertularia arcta</i>	THOMSON	1852	p. 404.
<i>Campanularia intertexta</i>	THOMSON	1852	p. 404.
<i>Coppinia mirabilis</i>	THOMSON	1852	p. 404.
<i>Coppinia arcta</i>	THOMSON	1853 (b)	p. 442, pl. 16, fig. 1.
» »	GOSSE	1855	p. 23, fig. 31''.
<i>Campanularia intertexta</i>	GOSSE	1855	p. 25.

<i>Coppinia arcta</i>	TEMLER	1855	p. 4576.
»	»	ALDER	1858 p. 99, 131.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 355, note.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 154, 294.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 290.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 13.
»	»	ALDER	1867 p. 50.
»	»	NORMAN	1867 p. 199.
»	»	HINCKS	1868 p. 219, pl. 41. fig. 5.
»	»	ALLMAN	1869 (b) p. 88.
»	»	NORMAN	1869 p. 323.
»	»	ALLMAN	1871 p. 54 ... 169, fig. 27.

Gen. *Cordylophora* Allman.

Voir : Matériaux II, p. 62.

AGASSIZ, L. (1860-62, vol. 4, p. 339) écrivait, par erreur, *Cordylomorpha*.

Cordylophora lacustris Allman.

Voir : Matériaux II, p. 62.

<i>Cordylophora lacustris</i>	ALLMAN	1844 (c)	p. 395.
»	»	LANDSBOROUGH	1852 p. 107.
»	»	ALLMAN	1853 (a) p. 367 ss, pl. 25-26.
»	»	HINCKS	1853 p. 180, pl. 6, fig. 1, 2.
»	»	LINDSTRÖM	1855 (a) p. 72.
»	»	THOMPSON	1856 p. 451.
»	»	BENEDEN (van)	1858 p. 125.
<i>Syncoryna lacustris</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 339.
<i>Cordylophora albicola</i>	BUSK	1861	p. 284, pl. 9, fig. 12-14.
<i>Cordylophora lacustris</i>	BUSK	1861	p. 284.
»	»	GREENE	1861 p. 30, fig. 5, 8.
<i>Cordylophora albicola</i>	KIRCHENPAUER	1861	p. 284, pl. 9, fig. 12-14.
<i>Cordylophora lacustris</i>	KIRCHENPAUER	1861	p. 284.
»	»	KIRCHENPAUER	1862 p. 15, 16.

<i>Cordylophora albicola</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 6, 14, 40, 53, 57.
<i>Cordylophora lacustris</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 364, 368.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 352.
<i>Cordylophora albicola</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 352.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 126.
<i>Cordylophora lacustris</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 124.
»	BENEDEN (van)	1867 (b)	p. 708.
»	RETZIUS	1867	p. 124.
»	SEMPER	1867	p. 124.
»	HINCKS	1868	p. 16, 324, pl. 3, fig. 2.
»	LEIDY	1870	p. 113.
<i>Cordylophora americana</i>	LEIDY	1870	p. 113.
<i>Cordylophora albicola</i>	NITSCHKE	1870	p. 9.
»	ALLMAN	1871	p. 254.
<i>Cordylophora lacustris</i>	ALLMAN	1871	p. 40 ... 204, fig. 77, p. 228 et 252, pl. 3.
»	DÖNITZ	1871	p. 430, pl. 11, fig. 1-3.
»	SCHULZE	1871	p. 1 ss., pl. 4-5.
<i>Cordylophora albicola</i>	SCHULZE	1871	p. 43.

Gen. *Corydendrium* van Beneden 1844.

Voir : Matériaux I, p. 437 et II, p. 62.

Corydendrium parasiticum (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 437 et II, p. 62.

<i>Sertolara parassita</i>	CAVOLINI	1853	p. 118.
<i>Sertularia parasitica</i>	GEGENBAUR	1854	p. 169.
<i>Syncoryna parasitica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 339.
<i>Sertularia parasitica</i>	ALLMAN.	1864 (a)	p. 368.
<i>Corydendrium parasiticum</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 352.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 50.
»	ALLMAN	1871	p. 262.

Gen. *Corymbogonium* Allman 1861.

ALLMAN (1861, p. 171) avait créé ce genre pour y placer

l'*Eudendrium capillare* d'ALDER. Mais il a reconnu plus tard qu'il l'avait établi inutilement et l'a supprimé.

Gen. *Corymorpha* Sars 1835.

Voir : Matériaux II, p. 63.

ALLMAN (1871) a attribué au genre *Corymorpha* des limites plus étroites que Sars ne l'avait fait. Il a non seulement adopté le genre *Amalthaea* créé par O. SCHMIDT pour la *Corymorpha uvifera* de Sars, mais encore établi le genre *Halatractus* dans lequel il place la *Corymorpha nana* d'ALDER et le genre *Mono-caulus* où il fait rentrer la *Corymorpha glacialis* de Sars et la *C. pendula* d'AGASSIZ.

Corymorpha nana Alder.

Matériaux II, p. 63.

Voir : *Halatractus nanus* (Alder).

Corymorpha nutans Sars.

Voir : Matériaux II, p. 63.

<i>Corymorpha nutans</i>	FORBES	1851	p. 217, 245.
»	»	LANDSBOROUGH	1852 p. 119.
»	»	KÖLLIKER	1853 (a) p. 302.
»	»	SARS	1853 p. 386.
»	»	GEGENBAUR	1854 p. 164, 172, 217.
»	»	STEENSTRUP	1854 p. 46 ss.
»	»	STIMPSON	1854 p. 9.
»	»	GOSSE	1855 p. 20, fig. 29.
»	»	ALDER	1858 p. 109.
»	»	SARS	1860 p. 341, 343, 345 (Trad. allemande).
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 343.
»	»	GREENE	1861 p. 84, 85, fig. 16 (a).
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 160.

<i>Corymorpha nutans</i>	ALDER	1862	p. 314.
»	ALDER	1863	p. 233, 234.
»	ALLMAN	1863 (b)	p. 1.
»	FULLER	1863	p. 131.
»	HODGE	1863 (b)	p. 80, pl. 2, fig. 1-9.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 367, 370, 397, 414, 417, fig. 15-16.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 369.
»	KÖLLIKER	1865	p. 103.
»	HINCKS	1868	p. 127, pl. 22, fig. 2 et p. 323.
»	NORMAN	1869	p. 324.
»	ALLMAN	1871	p. 45 ... 169, fig. 34, p. 208 et 388, pl. 19.
»	ALLMAN	1871 (a)	p. 21.
»	METZGER	1871 (b)	p. 34.

Gen. *Coryne* Gaertner 1774.

Voir : Matériaux I, p. 437 et II, p. 63.

Coryne caespes Allman.

<i>Coryne caespes</i>	ALLMAN	1871	p. 270.
-----------------------	--------	------	---------

Coryne cerberus Gosse.

<i>Coryne cerberus</i>	GOSSE	1853 (a)	p. 222, 259, 434, pl. 14, fig. 4-6.
»	GOSSE	1855	p. 20.
»	GOSSE	1857	p. 115.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 159, 296 (Excl. syn.).
»	HINCKS	1868	p. 68, 69 (Excl. syn.).

HINCKS regardait *Coryne cerberus* comme synonyme de *Stauridium productum*. Mais HARTLAUB (1895) qui a fait de très intéressantes observations sur cette dernière espèce, a montré que cette synonymie était peu probable.

Coryne fruticosa Hincks.

<i>Coryne fruticosa</i>	HINCKS	1861 (c) p. 158, pl. 6, fig. 5-6.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 356.
»	PARFITT	1866 (a) p. 6.
<i>Syncoryna (Coryne) fruticosa</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 119.
<i>Coryne fruticosa</i>	HINCKS	1868 p. 44, pl. 7, fig. 2.
»	ALLMAN	1871 p. 269.

Coryne fucicola (Filippi).

<i>Halybotrys fucicola</i>	FILIPPI	1866 p. 383, pl. 2.
Espèce douteuse.		

Coryne muscoides (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 438 et II, p. 63.

<i>Tabularia muscoides</i>	THOMPSON	1840 p. 250.
<i>Coryne ramosa</i>	GOSSE	1853 (a) p. 190, 434, pl. 9, fig. 1-7.
»	GOSSE	1855 p. 20.
<i>Coryne muscoides</i>	MÖRCH	1857 p. 24.
<i>Coryne ramosa</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 339.
»	HINCKS	1861 (c) p. 155, 158.
<i>Coryne vaginata</i>	HINCKS	1861 (c) p. 295.
»	HINCKS	1862 (a) p. 30, pl. 7, fig. 1.
<i>Coryne ramosa</i>	HINCKS	1862 (b) p. 361.
<i>Coryne vaginata</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 390.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 356.
<i>Coryne pusilla</i> var. <i>muscoides</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 159.
<i>Coryne muscoides</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 226.
<i>Coryne pusilla</i> var. <i>muscoides</i>	PARFITT	1866 (a) p. 5.
<i>Coryne vaginata</i>	PARFITT	1866 (a) p. 5.
<i>Syncoryna glandulata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 119.
<i>Coryne vaginata</i>	HINCKS	1868 p. 41, pl. 8, fig. 1.

<i>Coryne vaginata</i>	ALLMAN	1871	p. 68... 168, 268, pl. 4, fig. 8, 9.
»	HINCKS	1871 (b)	p. 75.

JOHNSTON (1847, p. 42) qui rapportait par erreur cette espèce à la *Syncoryna ramosa* d'EHRENBERG, l'a décrite sous le nom de *Coryne ramosa*, tout en reconnaissant qu'elle était identique à la *Tubularia muscoides* de LINNÉ, d'AGARDH et de LAMOUREUX. HINCKS (1868, p. 41) en a donné une nouvelle description. Il reconnaît qu'elle est semblable à la *Coryne ramosa* de JOHNSTON, mais néanmoins il lui donne le nouveau nom de *Coryne vaginata*. Pour se conformer aux règles de la nomenclature zoologique, on doit donc donner à cette Coryne le nom de *Coryne muscoides* (Linné).

Coryne nutans Allman.

<i>Coryne nutans</i>	HINCKS	1868	p. 325.
»	ALLMAN	1869 (a)	p. 323.
»	NORMAN	1869	p. 256, 257, 323.
»	ALLMAN	1871	p. 271.

Coryne pusilla Gaertner.

Voir : Matériaux I, p. 438 et II, p. 64.

<i>Syncoryna listerii</i>	BENEDEN (van)	1844 (b)	p. 54, pl. 3, fig. 11-12. Excl. syn.
»	BENEDEN (van)	1844 (c)	p. 313. Excl. syn.
<i>Coryne pusilla</i>	MAITLAND	1851	p. 40.
<i>Syncoryna ramosa</i>	SARS	1851	p. 130, 134.
<i>Coryne pusilla</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 105, pl. 1, fig. 3.
<i>Coryne sessilis</i>	GOSSE	1853 (a)	p. 206, 208, 434, pl. 14, fig. 1-3.
<i>Syncoryna ramosa</i>	SARS	1853	p. 378.
<i>Coryne pusilla</i>	IRVINE	1854	p. 244.
»	GOSSE	1855	p. 20.
<i>Coryne sessilis</i>	GOSSE	1855	p. 20, fig. 26.
<i>Coryne pusilla</i>	TEMPLER	1855	p. 4575.
»	THOMPSON	1856	p. 451.
<i>Coryne glandulosa</i>	WRIGHT	1856	p. 88.
<i>Coryne pusilla</i>	MÖRCH	1857	p. 24.

<i>Coryne pusilla</i>	WRIGHT	1857 (a)	p. 306.
<i>Coryne glandulosa</i>	WRIGHT	1857 (a)	p. 305.
» »	WRIGHT	1857 (b)	p. 83, pl. 2, fig. 7.
<i>Syncoryne Listerii</i>	ALDER	1858	p. 102.
<i>Coryne sessilis</i>	ALDER	1858	p. 103.
<i>Coryne ramosa</i>	ALDER	1858	p. 102.
<i>Coryne pusilla</i>	ALDER	1858	p. 102, 103.
» »	WRIGHT	1858 (a)	p. 341.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 340.
<i>Coryne ramosa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 295, 296.
<i>Syncoryne Listerii</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 295.
<i>Coryne glandulosa</i>	WRIGHT	1861 (a)	p. 359.
<i>Coryne ramosa</i>	ALLMAN	1862	p. 53.
» »	ALDER	1863	p. 226.
<i>Syncoryne Listerii</i>	ALDER	1863	p. 226.
<i>Coryne glandulosa</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 221, 282, 442.
<i>Coryne pusilla</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 382, 385.
» »	ALLMAN	1864 (c)	p. 356.
<i>Coryne ramosa</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 356.
<i>Coryne sessilis</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 356.
<i>Syncoryne Listerii</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 357.
<i>Coryne pusilla</i>	KÖLLIKER	1864	p. 233.
<i>Coryne stipula</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 176.
<i>Coryne pusilla</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 226.
» »	KÖLLIKER	1865	p. 172, pl. 10, fig. 4.
<i>Syncoryne ramosa</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 17, 50, 419.
<i>Coryne sessilis</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 121.
? <i>Coryne pusilla</i>	HELLER	1868	p. 31, 81.
» »	HINCKS	1868	p. 39, pl. 7, fig. 1 et p. 319.
<i>Coryne ramosa</i>	NORMAN	1869	p. 323, 327.
<i>Syncoryne pusilla</i>	HERKLOTS	1870	p. 396, pl. 39, fig. 1.
<i>Coryne pusilla</i>	ALLMAN	1871	p. 64... 200, 266, pl. 4, fig. 1-7.
<i>Coryne ramosa</i>	ALLMAN	1871	p. 269.
<i>Syncoryne Listerii</i> , p. p.	ALLMAN	1871	p. 284.
<i>Coryne pusilla</i>	HINCKS	1871 (b)	p. 74.
<i>Syncoryne pusilla</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.

Dans les Matériaux II, p. 64, dernière ligne, enlever la citation : *Synco-ryna pusilla* BENEDEN (van) 1844 (c) p. 313, qui figure déjà à *Coryne van Benedeni*.

Coryne rosaria L. Agassiz.

<i>Coryne rosaria</i>	AGASSIZ, A.	1860-62 vol. 4, p. 340.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 340.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 152, 176, 222, 223, fig. 289.
» »	ALLMAN	1871 p. 285.

Coryne van Benedeni Hincks.

Matériaux II, p. 65.

Voir : *Actinogonium pusillum*.

Coryne vermicularis Hincks.

<i>Coryne vermicularis</i>	HINCKS	1866 (a) p. 296.
» »	HINCKS	1868 p. 42, pl. 8, fig. 2 et p. 44, fig. 3.
» »	NORMAN	1869 p. 256, 257, 323, 324.
» »	ALLMAN	1871 p. 297.

Gen. *Corynitis* Mac Crady 1859.

Corynitis agassizi Mac Crady.

<i>Corynitis agassizi</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 132, pl. 9, fig. 3-8.
<i>Halocharis spiralis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 239, pl. 20, fig. 10-10 c.
<i>Corynitis agassizi</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 340.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 358.
<i>Halocharis (Corynitis) spi- ralis</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 358 note.
<i>Corynitis agassizi</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 183, 224.
» »	ALLMAN	1871 p. 287.

Gen. *Corynopsis* Allman 1864.

ALLMAN (1864 c) a établi le genre *Corynopsis* pour y placer la *Podocoryne alderi* de HODGE.

Corynopsis alderi (Hodge).

<i>Podocoryne alderi</i>	ALDER	1863	p. 226.
»	HODGE	1863 (b)	p. 82, pl. 2, fig. 10-15.
<i>Corynopsis alderi</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 354.
<i>Podocoryne alderi</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 157.
<i>Corynopsis alderi</i>	HINCKS	1868	p. 34, pl. 6, fig. 2.
»	ALLMAN	1871	p. 355.

Gen. *Corythamnion* Allman 1871

et *Corythamnium* Allman 1859.

ALLMAN (1859 b) a décrit sous le nom d'*Eudendrium bacciferum* (p. 54) ou d'*Eudendrium baccatum* (p. 143) une nouvelle espèce d'Hydroïde pour laquelle il proposait de créer le genre *Corythamnium*. Peu de temps auparavant, WRIGHT (1859 a) avait créé le genre *Garveia*. Lorsqu'il eut connaissance du travail de WRIGHT, ALLMAN reconnut la synonymie de ces deux genres (1859 b, p. 143) et le droit de priorité du nom de *Garveia*. En 1871 (p. 294) ALLMAN écrivait *Corythamnion* au lieu de *Corythamnium*.

Gen. *Cotulina* L. Agassiz 1862.

Ce genre n'a pas été adopté. L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 356) l'avait créé pour y placer la *Sertularella polyzonias* et A. AGASSIZ (1865 c, p. 146) y faisait rentrer également la *Sertularella tricuspidata* et la *Diphasia tamarisca*.

Gen. *Cryptolaria* Busk 1857.

Ce genre a été établi par BUSK (1857, p. 173) pour deux espèces d'Hydroïdes provenant de la Nouvelle Zélande. L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 357) pensait que ce genre devait être voisin d'*Halecium*.

Cryptolaria exserta Johnston.

<i>Cryptolaria exserta</i>	[JOHNSTON]	1858	p. 130, pl. 19, fig. 3.
----------------------------	------------	------	-------------------------

Cryptolaria prima Busk.

<i>Cryptolaria prima</i>	BUSK	1857	p. 173, pl. 16.
--------------------------	------	------	-----------------

Gen. *Cuspidella* Hincks 1866.*Cuspidella costata* Hincks.

<i>Cuspidella costata</i>	HINCKS	1868	p. 210, pl. 40, fig. 5.
---------------------------	--------	------	-------------------------

Cuspidella grandis Hincks.

<i>Cuspidella grandis</i>	HINCKS	1868	p. 210, pl. 40, fig. 4.
»	NORMAN	1869	p. 322.

Cuspidella humilis Hincks.

<i>Campanularia humilis</i>	ALDER	1863	p. 239.
<i>Calicella humilis</i>	ALDER	1863 (a)	p. 290.
<i>Calycella</i> (?) <i>humilis</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 375.
<i>Cuspidella humilis</i>	HINCKS	1866 (a)	p. 298.
<i>Calycella humilis</i>	ALDER	1867	p. 50.
<i>Cuspidella humilis</i>	HINCKS	1868	p. 209, pl. 39, fig. 4.
»	NORMAN	1869	p. 321.

Gen. *Dehitella* Gray 1868.

Voir les remarques aux genres *Ceratella* et *Solanderia*.

Dehitella atrorubens Gray.

<i>Dehitella atrorubens</i>	GRAY	1868	p. 579, fig. 1.
»	WRIGHT	1870	p. 90, fig. 1-2.

Gen. *Dicoryne* Allman 1859.

Van BENEDEN (1867 a) écrivait, par erreur, *Dicoryna* au lieu de *Dicoryne*.

Dicoryne conferta (Alder).

<i>Eudendrium confertum</i>	ALDER	1856 (a)	p. 354, pl. 12, fig. 5-8.
»	ALDER	1858	p. 96, 99, 103, pl. 3, fig. 5-8.
<i>Dicoryne stricta</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 369.
»	ALLMAN	1861	p. 168.
<i>Dicoryne conferta</i>	ALLMAN	1861	p. 168.
<i>Eudendrium confertum</i>	WRIGHT	1861 (b)	p. 123, 124, 126, 129.
<i>Dicoryne conferta</i>	ALDER	1863	p. 228, pl. 8, fig. 1-2.
<i>Eudendrium confertum</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 278, 279, 283.
<i>Dicoryne conferta</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 387.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 366.
»	ALLMAN	1864 (d)	p. 59.
<i>Dycoryne conferta</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 164.
<i>Eudendrium confertum</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 50, pl. 8, fig. 3-4.
<i>Dicoryna confertum</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 126.
<i>Dicoryne conferta</i>	HINCKS	1868	p. 105, pl. 18, fig. 1.
»	NORMAN	1868	p. 440.
»	NORMAN	1869	p. 324.
»	ALLMAN	1871	p. 108 ... 169, 226, 293, pl. 8.

Gen. *Diphasia* L. Agassiz 1862.

Voir : Matériaux I. p. 439 et II, p. 66.

L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 355) avait établi le genre

Diphasia sans en donner une diagnose complète. HINCKS (1868) et ALLMAN (1888) ont adopté ce genre en en définissant les caractères.

Beaucoup d'espèces que l'on faisait figurer autrefois dans le gen. *Sertularia* doivent prendre place ici.

E. et A. AGASSIZ (1865) écrivaient par erreur : *Dyphasia*.

Diphasia alata Hincks.

<i>Sertularia alata</i>	HINCKS	1855	p. 127, pl. 2.
» »	ALDER	1860	p. 74, note.
» »	NORMAN	1862	p. 152.
» »	NORMAN	1867	p. 196, 200.
<i>Diphasia alata</i>	HINCKS	1868	p. 258, pl. 48, fig. 2.
» »	NORMAN	1869	p. 261, 321.

Diphasia attenuata Hincks.

Voir : Matériaux I, p. 439 et II, p. 66.

<i>Sertularia attenuata</i>	HINCKS	1866 (a)	p. 298.
» »	PARFITT	1866	p. 426.
<i>Dynamena pinaster</i>	HELLER	1868	p. 35, 81.
<i>Diphasia attenuata</i>	HINCKS	1868	p. 247, pl. 49, fig. 1.
» »	ALLMAN	1871	p. 158.

Diphasia corniculata (Murray).

<i>Sertularia corniculata</i>	MURRAY	1860 (a)	p. 251, pl. 11, fig. 3.
<i>Diphasia corniculata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 143, 223.

Diphasia coronifera Allman.

<i>Diphasia coronifera</i>	ALLMAN	1871	p. 170.
----------------------------	--------	------	---------

Diphasia fallax (Johnston).

Syn. : *Sertularia fallax* Johnston.

Voir : Matériaux II, p. 113.

<i>Dynamena pinnata</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
-------------------------	---------	------	---------

<i>Sertularia fallax</i>	MAITLAND	1851	p. 49.
» »	SARS	1851	p. 131, 137.
» »	LANDSBOROUGH	1852	p. 129.
» »	SARS	1853	p. 387.
» »	IRVINE	1854	p. 245.
» »	STIMPSON	1854	p. 9.
» »	GOSSE	1855	p. 22.
» »	ALDER	1856 (a)	p. 358.
» »	TRASK	1857	p. 112.
» »	ALDER	1858	p. 96, 99, 114, 125.
» »	WRIGHT	1858 (a)	p. 453, pl. 23, fig. · 11-14.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 155.
» »	WRIGHT	1861 (b)	p. 129.
» »	WRIGHT	1863 (b)	p. 283.
» »	ALLMAN	1864 (a)	p. 373.
<i>Dynamena pinnata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 6, 7, 11.
<i>Diphasia fallax</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 142, 225.
<i>Sertularia fallax</i>	HINCKS	1865 (b)	p. 409.
» »	ALDER	1867	p. 49.
» »	NORMAN	1867	p. 200.
<i>Diphasia fallax</i>	HINCKS	1868	p. 249, fig. 31, pl. 49, fig. 2.
» »	HINCKS	1869	pl. 46, fig. 3.
» »	NORMAN	1869	p. 321.
<i>Sertularia fallax</i>	HERKLOTS	1870	p. 405, pl. 38, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871	p. 34 ... 74.

Diphasia pinaster (Ellis et Solander).

Syn. : *Dynamena pinaster* Lamouroux.

Syn. : *Sertularia pinaster* Ellis et Solander.

Voir : Matériaux I, p. 442 et II, p. 69.

<i>Sertularia pinaster</i>	FORBES	1851	p. 245.
» »	LANDSBOROUGH	1852	p. 128.
<i>Sertularia margarita</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 128.
<i>Sertularia margareta</i>	THOMSON	1852	p. 403.

<i>Sertularia margarita</i>	THOMSON	1853 (a) p. 78.
<i>Sertularia pinasta</i>	THOMSON	1853 (a) p. 78.
<i>Sertularia marguretta</i>	IRVINE	1854 p. 245.
<i>Sertularia margareta</i>	STIMPSON	1854 p. 8.
» »	GOSSE	1855 p. 22.
<i>Sertularia pinaster</i>	GOSSE	1855 p. 22.
» »	THOMPSON	1856 p. 454.
<i>Sertularia margarita</i>	THOMPSON	1856 p. 454.
<i>Sertularia pinaster</i>	ALDER	1858 p. 114.
<i>Sertularia margareta</i>	ALDER	1858 p. 114.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 355.
<i>Sertularia pinaster</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 355.
» »	HINCKS	1861 (c) p. 254.
<i>Sertularia margareta</i>	HINCKS	1861 (c) p. 254.
<i>Sertularia pinaster</i>	NORMAN	1862 p. 152.
» »	ALDER	1863 (a) p. 288, 289.
<i>Dynamena margareta</i>	KIRCHENPAUER	1864 p. 6, 7.
<i>Dynamena pinaster</i>	KIRCHENPAUER	1864 p. 6, 7.
<i>Sertularia pinaster</i>	HINCKS	1866 (a) p. 299.
<i>Sertularia margareta</i>	PARFITT	1866 (a) p. 8.
<i>Sertularia pinaster</i>	ALDER	1867 p. 49.
» »	NORMAN	1867 p. 200.
<i>Sertularia margareta</i>	NORMAN	1867 p. 200.
<i>Diphasia pinaster</i>	HINCKS	1868 p. 252, pl. 50, fig. 1.
» »	HINCKS	1869 pl. 46, fig. 2.
» »	NORMAN	1869 p. 321.
» »	ALLMAN	1871 p. 169.

Dans les Matériaux I, p. 442, il faut enlever la citation : *Sertularia pectinata* Lamarck 1816, qui doit être placée dans les synonymes de *Diphasia pinnata*. Il en est de même pour les citations de *Sertularia pectinata* qui se trouvent dans les Matériaux II, p. 69 et 70.

Diphasia pinnata (Pallas).

Syn. : *Sertularia pinnata* Pallas.

Voir : Matériaux I, p. 472 et II, p. 115.

<i>Sertularia pectinata</i>	LAMARCK	1816 vol. 2, p. 116.
» »	LAMOUREUX	1816 p. 187.

<i>Sertularia pectinata</i>	DESLONGCHAMPS	1824	p. 680.
♀ » »	BLAINVILLE	1830	p. 445.
♀ » »	BLAINVILLE	1834	p. 481.
» »	EDWARDS, M.	1836	p. 140.
<i>Sertularia nigra</i>	COUCH	1843	p. 209.
<i>Sertularia pectinata</i>	GRAY	1848	p. 75.
<i>Sertularia nigra</i>	BUSK	1851	p. 118.
<i>Sertularia fuscescens</i>	MAITLAND	1851	p. 50.
<i>Sertularia nigra</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 126.
<i>Sertularia pinnata</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 127.
» »	GOSSE	1855	p. 22.
<i>Sertularia nigra</i>	GOSSE	1855	p. 22.
» »	ALDER	1858	p. 97.
<i>Sertularia pinnata</i>	ALDER	1858	p. 97.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
<i>Sertularia nigra</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 155, 254.
<i>Sertularia pinnata</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 155, 254.
<i>Dynamena fuscens</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 9.
? <i>Diphasia nigra</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 222, 224.
<i>Sertularia pinnata</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 8.
<i>Sertularia nigra</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 8.
<i>Diphasia pinnata</i>	HINCKS	1868	p. 255, pl. 42.
» »	HINCKS	1869	pl. 46, fig. 1.
<i>Sertularia nigra</i>	NORMAN	1869	p. 262.
<i>Sertularia pinnata</i>	HERKLOTS	1870	p. 408, pl. 37, fig. 1.
<i>Diphasia pinnata</i>	ALLMAN	1871	p. 158.
» »	HINCKS	1871 (b)	p. 80.

Diphasia rosacea (Linné).

Syn. : *Dynamena rosacea* Lamouroux.

Syn. : *Sertularia rosacea* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 444 et II, p. 71.

<i>Sertularia rosacea</i>	TURTON et KINGSTON	1830	sans pagination.
<i>Dynamena rosacea</i>	BELLAMY	1839	p. 270.
<i>Sertularia rosacea</i>	BUSK	1851	p. 118.

<i>Sertularia rosacea</i>	COUCH	1851 (a) p. 28.
» »	FORBES	1851 p. 245.
» »	MAITLAND	1851 p. 48.
» »	LANDSBOROUGH	1852 p. 125, pl. 4, fig. 12.
» »	GOSSE	1853 (a) p. 434.
? » »	THOMSON	1853 (a) p. 78.
» »	IRVINE	1854 p. 245.
» »	GOSSE	1855 p. 22.
» »	TEMPLER	1855 p. 4575.
» »	THOMPSON	1856 p. 453.
» »	WRIGHT	1856 p. 88.
» »	ALDER	1858 p. 114, 115.
<i>Diphasia rosacea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 355.
<i>Sertularia rosacea</i>	HINCKS	1861 (c) p. 253.
» »	ALDER	1863 (a) p. 289.
» »	PACKARD	1863 p. 404, 422.
» »	ALDER	1864 p. 193.
» »	ALLMAN	1864 (a) p. 372-375, 388, 395, fig. 10.
<i>Dynamena rosacea</i>	KIRCHENPAUER	1864 p. 6, 7, 11.
<i>Diphasia rosacea</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 142, 179, 225.
<i>Diphasia rosacea</i>	AGASSIZ, E. et A.	1865 p. 67, fig. 86.
<i>Sertularia rosacea</i>	HINCKS	1866 (a) p. 299.
» »	PARFITT	1866 (a) p. 8.
» »	ALDER	1867 p. 49.
<i>Dynamena rosacea</i>	HELLER	1868 p. 35.
<i>Diphasia rosacea</i>	HINCKS	1868 p. 245, pl. 48, fig. 1.
» »	HINCKS	1869 pl. 46, fig. 5.
» »	NORMAN	1869 p. 321.
<i>Sertularia rosacea</i>	HERKLOTS	1870 p. 405, pl. 39, fig. 11.
» »	ALLMAN	1871 p. 34 ... 74, fig. 23-25.

Diphasia tamarisca (Linné).

Syn. : *Sertularia tamarisca* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 476 et II, p. 116.

<i>Sertularia tamarisca</i>	LANDSBOROUGH	1852 p. 129, pl. 2, fig. 6.
» »	IRVINE	1854 p. 245.

<i>Sertularia producta</i>	STIMPSON	1854	p. 8.
<i>Sertularia tamarisca</i>	GOSSE	1855	p. 22.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	THOMPSON	1856	p. 455.
»	ALDER	1858	p. 114, 115.
»	ALLMAN	1859 (a)	p. 119, 120.
»	ALLMAN	1859 (c)	p. 311.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 254.
»	NORMAN	1862	p. 152.
»	ALDER	1863 (a)	p. 288, 289.
»	ALDER	1864	p. 193.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 372-375, 388, 395, fig. 11.
<i>Dynamena tamarisca</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 8.
<i>Cotulina tamarisca</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 147, 225, 226.
<i>Sertularia producta</i>	AGASSIZ A.	1865 (c)	p. 145, 225.
<i>Sertularia tamarisca</i>	HINCKS	1865 (b)	p. 409.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 8.
»	ALDER	1867	p. 49.
<i>Dynamena tamarisca</i>	HELLER	1868	p. 34, 81.
<i>Diphasia tamarisca</i>	HINCKS	1868	p. 254, pl. 41.
»	NORMAN	1869	p. 321.
<i>Sertularia tamarisca</i>	ALLMAN	1871	p. 34 ... 74, fig. 26.
<i>Diphasia tamarisca</i>	ALLMAN	1871	p. 169.

Gen. *Diplonema* Greene 1857.

Voir : *Diplura*.

Gen. *Diplura* Greene-Allman 1864.

Voir : Matériaux II, p. 66.

La Méduse de l'Hydroïde auquel STEENSTRUP avait donné le nom de *Coryne fritillaria* a été décrite avec beaucoup de soins par GREENE (1857) qui la nommait *Diplonema islandica*. Cette espèce ne pouvant pas être maintenue dans le genre *Coryne*, on

aurait dû conserver pour elle le genre *Diplonema*. Mais ce nom avait déjà été employé en botanique et GREENE, dans une lettre à ALLMAN (1871, p. 320), a proposé lui-même de le remplacer par le nom générique de *Diplura*.

Diplura fritillaria (Steenstrup).

Voir : Matériaux II, p. 66.

<i>Coryne fritillaria</i>	OWEN	1849	p. 12.
»	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 302.
»	GEGENBAUR	1854	p. 163, 172, 216.
»	LEUCKART	1856 (a)	p. 29.
»	GREENE	1857	p. 248.
<i>Diplonema islandica</i>	GREENE	1857	p. 243, 247, pl. 15, fig. 7.
<i>Coryne fritillaria</i>	WRIGHT	1857 (b)	p. 84.
<i>Steenstrupia fritillariae</i>	SARS	1860	p. 346 (Trad. allem.).
<i>Steenstrupia fritillaria</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 343.
<i>Coryne fritillaria</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 244, note.
<i>Diplonema islandica</i>	GREENE	1861	p. 64, fig. 14 (a).
<i>Coryne fritillaria</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 400.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 354.
<i>Diplura fritillaria</i>	ALLMAN	1864 (d)	p. 62.
<i>Coryna fritillaria</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 121, 123.
<i>Coryne fritillaria</i>	ALLMAN	1871	p. 82.
<i>Diplura fritillaria</i>	ALLMAN	1871	p. 320.

Gen. *Dismorphosa*.

Voir au genre *Dysmorphosa*.

Gen. *Dynamena* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 439 et II, p. 66.

PHILIPPI (1866) écrivait *Dynamene*.

Le genre *Dynamena* devra disparaître, la plupart des espèces qu'il renfermait se plaçant naturellement dans les genres *Sertu-*

laria, *Thuiaria*, *Diphasia* et *Pasythea*. Les tentatives que l'on a faites pour conserver le genre *Dynamena* en lui attribuant des caractères nouveaux ne peuvent qu'embroniller davantage la systématique des Hydroïdes. Nous avons donc réparti toutes les Dynamènes dans les genres auxquels elles appartiennent réellement, en ne laissant figurer provisoirement, sous ce nom générique, que quelques espèces dont la position systématique n'est pas encore définitivement établie.

Dynamena barbata Lamouroux.

Matériaux I, p. 439 et II, p. 67.

BILLARD qui a retrouvé le type de la *Dynamena barbata* de LAMOUROUX, a reconnu que cette espèce appartenait non pas aux Hydroïdes mais aux Bryozoaires.

Dynamena distans Lamouroux.

Matériaux I, p. 440 et II, p. 67.

Voir : *Sertularia lamourouxii*.

Dynamena disticha Lamouroux.

Matériaux I, p. 440 et II, p. 67.

Voir : *Sertularia disticha*.

Dynamena divergens Lamouroux.

Matériaux I, p. 440 et II, p. 67.

Voir : *Sertularia bicuspidata* et *S. lamourouxii*.

Dynamena evansi Lamouroux.

Matériaux I, p. 440 et II, p. 68.

Voir : *Sertularia evansi*.

Dynamena lucernaria Kirchenpauer.

Dynamena lucernaria . KIRCHENPAUER 1864 p. 8, 9, pl. 1, fig. 3.

Dynamena obliqua Lamouroux.

Matériaux I, p. 440 et II, p. 68.

D'après BILLARD (1909), cette espèce n'est qu'une variété de la *Pasythea quadridentata* (Ell. et Sol.) qu'il distingue sous le nom de var. *balei*. Voir cette espèce.

Dynamena operculata Lamouroux.

Matériaux I, p. 441 et II, p. 68.

Voir : *Sertularia operculata*.*Dynamena pinaster* Lamouroux.

Matériaux I, p. 442 et II, p. 69.

Voir : *Diphasia pinaster*.*Dynamena pluridentata* Kirchenpauer.*Dynamena pluridentata* KIRCHENPAUER 1864 p. 9, 14, pl. 1, fig. 10.*Dynamena pulchella* d'Orbigny.

Matériaux II, p. 70.

Voir : *Sertularia pulchella*.*Dynamena pumila* Lamouroux.

Matériaux I, p. 442 et II, p. 70.

Voir : *Sertularia pumila*.*Dynamena rosacea* Lamouroux.

Matériaux I, p. 444 et II, p. 71.

Voir : *Diphasia rosacea*.*Dynamena serra* sec. Heller.

Dynamena serra HELLER 1868 p. 36, 81, pl. 1, fig. 9
Excl. syn.

La *Dynamena serra* décrite par HELLER (1868, p. 36) ne peut pas être, comme le croit cet auteur, la même espèce que celle à laquelle LAMARCK (1816) a donné le nom de *Sertularia serra*. Cette dernière, ainsi que l'a montré BILLARD (1907) est synonyme de *Sertularia operculata* et la figure représentant la *Dynamena serra*, dans le mémoire d'HELLER, ne peut pas s'appliquer à la *S. operculata*.

Dynamena sertularioides Lamouroux.

Matériaux I, p. 445 et II, p. 72.

Voir : *Sertularia sertularioides*.

Dynamena tubiformis Lamouroux.

Matériaux I, p. 445 et II, p. 73.

Voir : *Sertularia sertularioides*.

Dynamena turbinata Lamouroux.

Matériaux I, p. 445 et II, p. 73.

Voir : *Sertularia turbinata*.

Gen. *Dyomea* Vogt 1851.

VOGT (1851, vol. 1, p. 130) plaçait ce genre dans la famille des Campanularides, mais il n'en donne pas de diagnose et ne cite aucune de ses espèces. Ce genre doit donc disparaître.

Gen. *Dysmorphosa* Philippi 1842.

Voir : Matériaux II, p. 73.

Ce genre, tel qu'il a été établi par PHILIPPI, devrait disparaître étant synonyme de *Podocoryne*. Mais il a été conservé par AGASSIZ, HAECKEL et autres auteurs, pour un genre de Méduses de la famille des Margelides auquel appartient la

Méduse de *Podocoryne carnea*. DELLE CHIAJE (1853) écrivait : *Dismorphosa*.

Gen. *Ectopleura* L. Agassiz 1862.

L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 342) a créé ce genre pour la *Tubularia dumortieri* de van BENEDEN. Mais il y faisait rentrer également un certain nombre de Méduses que l'on place aujourd'hui dans d'autres genres.

Ectopleura dumortieri (van Beneden).

Syn. : *Tubularia dumortieri* van Beneden.

Voir : Matériaux II, p. 126.

<i>Tubularia Dumortieri</i>	MAITLAND	1851	p. 42.
»	GEGENBAUR	1854	p. 164, 169, 180, 201, 217.
? »	GOSSE	1855	p. 20.
»	MC CRADY	1859 (b)	p. 155.
<i>Ectopleura Dumortieri</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 342.
<i>Tubularia Dumortieri</i>	SARS	1860	p. 348 (Trad. allem.).
»	GREENE	1861	p. 88.
? »	HINCKS	1861 (c)	p. 160.
»	ALDER	1863	p. 233.
»	CLAPARÈDE	1863 (b)	p. 2.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 367, 368.
<i>Ectopleura Dumortieri</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 368.
<i>Tubularia Dumortieri</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 192.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 111.
<i>Ectopleura Dumortieri</i>	HINCKS	1868	p. 124, pl. 21, fig. 4.
<i>Tubularia Dumortieri</i>	HARTMANN	1870	p. 1.
»	HERKLOTS	1870	p. 394, 397, 411, pl. 39, fig. 3, pl. 42, fig. 12-13.
<i>Ectopleura Dumortieri</i>	ALLMAN	1871	p. 424.
<i>Tubularia Dumortieri</i>	HINCKS	1871 (b)	p. 78.
»	METZGER	1871 (a)	p. 35.

Dans les Matériaux II, p. 126, 2 lignes avant la fin, enlever la citation :
« *Tubularia Dumortierii* JOHNSTON 1847, p. 50, pl. 7, g. 1, 2 » qui doit ren-
trer dans les synonymes de *Tubularia simplex*.

Gen. *Eucoryne* Leidy 1855.

Le nom d'*Eucoryne* étant déjà employé, ALLMAN (1871, p. 368) l'a remplacé par celui d'*Halocordyle*.

Gen. *Eudendrium* Ehrenberg 1834.

Voir : Matériaux I, p. 445 et II, p. 74.

WRIGHT (1858 (a) p. 448) a donné une nouvelle diagnose du genre *Eudendrium*.

Eudendrium annulatum Norman.

<i>Eudendrium annulatum</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 362.
»	NORMAN	1864 p. 83, pl. 9, fig. 4-3.
»	HINCKS	1868 p. 83, pl. 15, fig. 1.
»	NORMAN	1869 p. 256, 257, 323.
»	ALLMAN	1871 p. 458, 338.

Eudendrium arbuscula Wright.

<i>Eudendrium arbuscula</i>	WRIGHT	1859 (a) p. 113, pl. 9, fig. 5-6.
<i>Eudendrium arbusculum</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 124, 126.
<i>Eudendrium arbuscula</i>	ALDER	1863 p. 229.
<i>Eudendrium arbusculum</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 278, 279.
<i>Eudendrium arbuscula</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 362.
»	HINCKS	1868 p. 84, pl. 14, fig. 1.
»	ALLMAN	1871 p. 336.

Eudendrium capillare Alder.

<i>Eudendrium capillare</i>	ALDER	1856 (a) p. 355, pl. 12, fig. 9-12.
»	ALDER	1858 p. 105, pl. 3, fig. 9-12.
»	WRIGHT	1859 (a) p. 113.

<i>Corymbogonium capillare</i>	ALLMAN	1861	p. 171.
»	»	GREENE	1861 p. 84, fig. 16 (b).
<i>Eudendrium capillare</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 159.
»	»	WRIGHT	1861 (b) p. 124.
»	»	HINCKS	1862 (b) p. 360.
»	»	ALDER	1863 p. 229.
<i>Dicoryne capillare</i>	ALDER	1863	p. 230.
<i>Eudendrium capillare</i>	ALDER	1863 (a)	p. 289.
? »	»	WRIGHT	1863 (b) p. 278.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 362.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 6.
»	»	ALDER	1867 p. 49.
»	»	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 18, 50, 113.
»	»	HINCKS	1868 p. 84, pl. 14, fig. 2.
»	»	ALLMAN	1871 p. 335, pl. 14, fig. 1-3.
»	»	HINCKS	1871 (b) p. 77.

Eudendrium dispar L. Agassiz.

<i>Eudendrium dispar</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 285, 342, fig. 36, pl. 27, fig. 10-26.
<i>Thoa dispar</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 342.
<i>Thoa (Eudendrium) dispar</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4. Expl. of pl. 27.
<i>Eudendrium dispar</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 383.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 362.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 159, 160, 224, 225, fig. 249.
»	»	ALLMAN	1871 p. 338.

Eudendrium insigne Hincks.

<i>Eudendrium insigne</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 159, 297.
»	»	HINCKS	1862 (a) p. 30, pl. 7, fig. 2.
<i>Eudendrium humile</i>	ALLMAN	1863 (b)	p. 9.
? <i>Eudendrium humile</i> var.			
<i>corymbifera</i>	ALLMAN	1863 (b)	p. 10.
<i>Eudendrium humile</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 362.
<i>Eudendrium insigne</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 362.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 6.

? Eudendrium humile var.

<i>corymbifera</i>	HINCKS	1868	p. 87.
<i>Eudendrium insigne</i>	HINCKS	1868	p. 86, pl. 14, fig. 3.
»	ALLMAN	1871	p. 337, pl. 14, fig. 4-6.

Eudendrium racemosum (Cavolini).

Voir : Matériaux I, p. 446 et II, p. 74.

<i>? Sertolara capello</i>	CAVOLINI	1853	p. 118.
<i>? Sertularia capillus</i>	CHIAIE, D.	1853	p. 322.
<i>Sertolara racemosa</i>	CAVOLINI	1853	p. 118, 119.
<i>Eudendrium racemosum</i>	CHIAIE, D.	1853	p. 322.
»	GEGENBAUR	1854	p. 185, 186, 195, 199, 217.
»	ALDER	1856 (a)	p. 356.
»	SARS	1857 (a)	p. 154, 155.
»	ALDER	1858	p. 106.
<i>Sertolara racemosa</i>	WRIGHT	1859 (a)	p. 113.
<i>Sertularia (Eudendrium)</i>			
<i>racemosa</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 388.
<i>Eudendrium racemosum</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 387, 407.
<i>Sertularia (Eudendrium)</i>			
<i>racemosa</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 113.
<i>Eudendrium racemosum</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 17, 50, 118, 130.
»	ALLMAN	1871	p. 148, 341.

Eudendrium rameum (Pallas).

Voir : Matériaux I, p. 446 et II, p. 75.

<i>Eudendrium rameum</i>	FORBES	1851	p. 245.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 108, pl. 2, fig. 5.
<i>Sertolara rubella</i>	CAVOLINI	1853	p. 120.
<i>Sertularia rubella</i>	CHIAIE, D.	1853	p. 322.
<i>Eudendrium rameum</i>	IRVINE	1854	p. 244.
»	STIMPSON	1854	p. 9.
»	GOSSE	1855	p. 20.
»	THOMPSON	1856	p. 452.
»	SARS	1857 (a)	p. 154.

<i>Eudendrium rameum</i>	ALDER	1858	p. 96, 99, 103, 106.
»	WRIGHT	1858 (a)	p. 448, note, pl. 23, fig. 1-2.
»	MC CRADY	1859 (b)	p. 167.
»	WRIGHT	1859 (a)	p. 110.
»	GREENE	1861	p. 83.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 297.
»	WRIGHT	1861 (b)	p. 124, 125.
»	HINCKS	1862 (b)	p. 360.
»	KIRCHENPAUER	1862	p. 14.
»	MEYER U. MÖBIUS	1862	p. 231, 236.
»	ALDER	1863	p. 229.
»	ALDER	1863 (a)	p. 289.
»	WRIGHT	1863 (a)	p. 40.
»	WRIGHT	1863 (b)	p. 278, 279.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 362.
»	NORMAN	1864	p. 83.
<i>Tubularia ramea</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 159.
<i>Eudendrium rameum</i>	ALDER	1867	p. 49.
»	HELLER	1868	p. 32.
»	HINCKS	1868	p. 80, fig. 8 (frontis- pice).
»	NORMAN	1869	p. 323.
»	ALLMAN	1871	p. 334.

Eudendrium ramosum (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 446 et II, p. 76.

<i>Tubularia ramosa</i>	SARS	1828	p. 321, pl. 2, fig. 1-2.
? <i>Tubularia</i> (<i>Eudendrium</i>)			
<i>ramosa</i>	MAITLAND	1851	p. 42.
<i>Eudendrium ramosum</i>	SARS	1851	p. 131, 136.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 111.
»	CHIAIE, D.	1853	p. 322.
»	SARS	1853	p. 379, 387.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	STIMPSON	1854	p. 9.
»	GOSSE	1855	p. 20, fig. 27.
»	THOMPSON	1856	p. 452.

<i>Eudendrium ramosum</i>	MÖRCH	1857	p. 24.
»	»	ALDER	1858 p. 103, 104, 105.
»	»	WRIGHT	1858 (a) p. 448.
»	»	Mc CRADY	1859 (b) p. 166, 217.
»	»	MURRAY	1860 (a) p. 250.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 342.
<i>Tubularia ramosa</i>	GRUBE	1861	p. 131.
<i>Eudendrium ramosum</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 159.
»	»	ALDER	1863 p. 232.
<i>Tubularia ramosa</i>	HALLIER	1863	p. 279.
<i>Eudendrium ramosum</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 362.
»	»	NORMAN	1864 p. 83.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 158, 160, 224, 226.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 6.
»	»	HELLER	1868 p. 31, 81.
»	»	HINCKS	1868 p. 82, pl. 13.
»	»	NORMAN	1869 p. 323.
»	»	ALLMAN	1871 p. 28... 332, pl. 13.
»	»	HINCKS	1871 (b) p. 77.

Eudendrium tenue A. Agassiz.

<i>Eudendrium tenue</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 160, 224, 225, fig. 250.
»	»	ALLMAN	1871 p. 340.

Eudendrium vaginatum Allman.

<i>Eudendrium vaginatum</i>	ALLMAN	1863 (b)	p. 10.
»	»	ALLMAN	1864 (a) p. 390.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 362.
»	»	HINCKS	1868 p. 86.
»	»	NORMAN	1869 p. 256, 257, 323.
»	»	ALLMAN	1871 p. 68, 339, pl. 14, fig. 7-8.

Gen. *Filellum* Hincks 1868.

Voir : Matériaux II, p. 77.

Filellum serpens (Hassal).

Voir : Matériaux II, p. 77.

<i>Campanularia serpens</i>	HASSAL a. COPPIN	1852	p. 163, pl. 21, fig. 4.
<i>Reticularia immersa</i>	THOMPSON	1853 (b)	p. 443, pl. 16, fig. 2-3.
» »	GOSSE	1855	p. 22, fig. 31'.
? <i>Campanularia serpens</i>	GOSSE	1855	p. 25.
<i>Halía praetenuis</i>	HINCKS	1855	p. 128.
<i>Reticularia serpens</i>	HINCKS	1856	p. 470.
» »	ALDER	1858	p. 99, 130.
<i>Reticularia immersa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355, note.
<i>Thalia praetenuis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355, note.
<i>Reticularia serpens</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 294.
» »	NORMAN	1862	p. 152.
» »	ALDER	1863 (a)	p. 290.
» »	ALDER	1864	p. 193.
» »	PARFITT	1866 (a)	p. 13.
» »	ALDER	1867	p. 50.
» »	NORMAN	1867	p. 199.
<i>Filellum serpens</i>	HINCKS	1868	p. 214, pl. 41, fig. 4.
» »	NORMAN	1869	p. 322.
» »	ALLMAN	1871	p. 158, 159.

Gen. *Garveia* Wright 1859.*Garveia nutans* Wright.

<i>Eudendrium bacciferum</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 52.
<i>Eudendrium baccatum</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 143.
<i>Garveia nutans</i>	WRIGHT	1859 (a)	p. 109, pl. 8, fig. 5.
» »	WRIGHT	1859 (b)	p. 175.
» »	ALDER	1863	p. 229.
» »	ALLMAN	1864 (a)	p. 366, 367, fig. 6 B.
» »	ALLMAN	1864 (c)	p. 364.
» »	HINCKS	1868	p. 102.
» »	NORMAN	1869	p. 324.
<i>Corythamnion bacciferum</i>	ALLMAN	1871	p. 295 (in syn.).

<i>Garceia nutans</i>	ALLMAN	1871	p. 44, 127, fig. 15, p. 295, pl. 12, fig. 4-11.
-----------------------	--------	------	---

Gen. *Gemmaria* Mac Crady 1859.

MAC CRADY (1859 (b), p. 151) a décrit une nouvelle espèce de Méduse qu'il considérait, avec quelque hésitation, comme étant une forme jeune appartenant au genre *Zanclea* de GEGENBAUR et qu'il nommait *Z. gemmosa*. Mais, n'étant pas absolument certain de sa détermination, il proposait d'adopter pour cette espèce le genre *Gemmaria*, si l'on venait à reconnaître qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le genre *Zanclea*. A. AGASSIZ (1865 (c), p. 184), ALLMAN (1871, p. 289) et HÆCKEL (1879, p. 103) ont montré qu'il s'agissait de deux genres distincts et ont admis le nom de *Gemmaria*.

Gemmaria implexa (Alder).

? <i>Coryne pusilla</i> γ	THOMAS	1847	p. 467.
<i>Tubularia implexa</i>	ALDER	1856 (b)	p. 439.
» »	ALDER	1858	p. 108, pl. 9, fig. 3-6.
? <i>Coryne pusilla</i> γ	ALDER	1858	p. 103.
<i>Coryne pelagica</i>	ALDER	1858	p. 103, pl. 9, fig. 1-2.
<i>Coryne briareus</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 54, 143.
<i>Coryne implexa</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 143.
<i>Tubularia implexa</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 143.
<i>Coryne pelagica</i>	WRIGHT	1859 (a)	p. 108.
<i>Coryne margarica</i>	WRIGHT	1859 (a)	p. 108.
<i>Coryne implexa</i>	WRIGHT	1859 (a)	p. 107, pl. 8, fig. 6-7.
» »	WRIGHT	1859 (b)	p. 175.
» »	ALDER	1862	p. 312.
» »	NORMAN	1862	p. 152.
» »	ALDER	1863	p. 227, pl. 10, fig. 4.
» »	ALLMAN	1864 (a)	p. 426.
<i>Zanclea implexa</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 357.
» »	ALLMAN	1864 (d)	p. 63.

<i>Coryne impressa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 183.
<i>Coryne implexa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 185.
<i>Zanlea implexa</i>	HINCKS	1868 p. 59, pl. 9, fig. 3.
<i>Gemmaria implexa</i>	ALLMAN	1871 p. 119 ... 137, 223, 290, pl. 7.

Gen. *Globiceps* Ayres 1854.

Ce nom étant déjà employé, ALLMAN (1871, p. 368) l'a remplacé par celui d'*Halocordyle*.

Nous continuerons cependant à faire figurer sous le nom de *Globiceps* les Méduses qui ont été placées dans ce genre, mais dont on ne connaît pas le Polype.

Gen. *Gonocladium* Allman 1871.

ALLMAN (1871, p. 170) cite *Gonocladium plumosum* dans une liste d'Hydroïdes des grandes profondeurs et annonce que les espèces nouvelles seront décrites dans son Rapport sur les Hydroïdes du PORCUPINE. Dans cette publication, on ne trouve aucun renseignement sur cette espèce et sur le genre *Gonocladium*, mais ALLMAN y décrit le *Cladocarpus formosus* qui pourrait bien être l'espèce qu'il avait désignée, quelques années auparavant, sous le nom de *Gonocladium plumosum*. Quoiqu'il en soit, le genre *Gonocladium* doit disparaître.

Gen. *Gonothyraea* Allman 1864.

Voir : Matériaux I, p. 448 et II, p. 77.

Gonothyraea gracilis (Sars).

<i>Laomedea gracilis</i>	SARS	1851 p. 138.
<i>Laomedea</i> (<i>Campanularia</i>)		
<i>gracilis</i>	SARS	1857 (a) p. 161, pl. 2, fig. 1-4.
<i>Laomedea gracilis</i>	HINCKS	1861 (c) p. 260, 292.

<i>Gonothyræa gracilis</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 374.
»	HINCKS	1866 (a) p. 299.
<i>Campanularia gracilis</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 147.
<i>Gonothyræa gracilis</i>	HINCKS	1868 p. 183, pl. 36, fig. 1.
»	HINCKS	1871 (b) p. 80.

Gonothyræa gracilis (Sars) var.

<i>Laomedea gracilis</i> var.	SARS	1857 (a) p. 160, pl. 2, fig. 5.
-------------------------------	------	---------------------------------

Gonothyræa hyalina Hincks.

<i>Gonothyræa hyalina</i>	HINCKS	1866 (a) p. 297.
»	HINCKS	1868 p. 184, pl. 35, fig. 2.
»	NORMAN	1869 p. 256, 257, 322.

Gonothyræa loveni Allman.

Voir : Matériaux I, p. 448 et II, p. 77.

<i>Campanularia geniculata</i>	SCHULTZE	1850 p. 52 ss. pl. 1.
»	» van Bened. GEGENBAUR	1854 p. 163 ... 217.
»	» Loven GEGENBAUR	1854 p. 184 ... 217.
?	» THOMSON	1854 p. 313, 314.
»	» LINDSTRÖM	1855 (h) p. 370 ss.
»	» WRIGHT	1856 p. 88.
<i>Laomedea geniculata</i>	GREENE	1857 p. 249.
<i>Campanularia geniculata</i>	SARS	1857 (a) p. 161.
<i>Laomedea dichotoma</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 450, pl. 23, fig. 3-4.
<i>Campanularia dichotoma</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 453.
<i>Laomedea flexuosa</i>	ALLMAN	1859 (b) p. 138.
<i>Laomedea loveni</i>	ALLMAN	1859 (b) p. 138.
<i>Laomedea flexuosa</i>	ALLMAN	1859 (c) p. 310.
<i>Campanularia flexuosa</i>	ALLMAN	1859 (c) p. 316.
<i>Laomedea dichotoma</i>	SARS	1860 p. 349 (Trad. allem.).
<i>Laomedea geniculata</i>	SARS	1860 p. 349 (Trad. allem.).
<i>Campanularia loveni</i>	GREENE	1861 p. 44, 56, 95, fig. 10 (a-e).
<i>Laomedea loveni</i>	HINCKS	1861 (c) p. 260.
»	WRIGHT	1861 (b) p. 126, 129.

<i>Laomedea flexuosa</i>	ALLMAN	1862	p. 56.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var.			
<i>ramosissima</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 18.
<i>Laomedea loveni</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 23.
» »	NORMAN	1862	p. 152.
» »	ALDER	1863	p. 237.
<i>Campanularia geniculata</i>	SARS	1863	p. 34.
<i>Campanularia dichotoma</i>			
(<i>loveni</i>)	WRIGHT	1863	(a) p. 134.
<i>Laomedea loveni</i>	WRIGHT	1863	(b) p. 279, 283.
<i>Campanularia geniculata</i>	ALLMAN	1864	(a) p. 381.
<i>Gonothyrea (Laomedea)</i>			
<i>loveni</i>	ALLMAN	1864	(a) p. 376, fig. 12.
<i>Laomedea loveni</i>	ALLMAN	1864	(a) p. 375 ... 388.
<i>Obelia (Laomedea) dichotoma</i>			
<i>toma</i>	ALLMAN	1864	(a) p. 413.
<i>Gonothyrea loveni</i>	ALLMAN	1864	(c) p. 374.
<i>Campanularia geniculata</i>	AGASSIZ, A.	1865	(c) p. 92.
<i>Gonothyrea loveni</i>	HINCKS	1865	(b) p. 412, pl. 2, fig. 8.
<i>Laomedea loveni</i>	PARFITT	1866	(a) p. 12.
<i>Campanularia geniculata</i>	BENEDEN (van)	1867	(a) p. 150, 159.
<i>Campanularia dichotoma</i>	BENEDEN (van)	1867	(a) p. 17, 48, 149, 156, 157, pl. 15, fig. 1-4.
» » »	WRIGHT	1867	p. 43, note.
<i>Gonothyrea loveni</i>	HINCKS	1868	p. 181, pl. 25, fig. 2.
» »	HINCKS	1869	p. 45, fig. 1.
» »	NORMAN	1869	p. 322.
<i>Laomedea geniculata</i>	HERKLOTS	1870	p. 399, 409, pl. 36, fig. 3 et pl. 44, fig. 20-24.
<i>Campanularia geniculata</i>	ALLMAN	1871	p. 63.
<i>Gonothyrea loveni</i>	ALLMAN	1871	p. 55 ... 168, fig. 28.

Gen. *Grammaria* Stimpson 1854.

STIMPSON (1854, p. 9) a créé ce genre pour y placer la *Grammaria robusta*, qui n'est qu'une forme jeune de la *Campanularia abietina* de SARS, et la *G. gracilis*.

HINCKS (1868, p. 211) croyant que le genre *Grammaria* était synonyme du genre *Salacia* de LAMOUROUX a adopté ce dernier nom. Mais on sait aujourd'hui, que la *Salacia tetracythara* de LAMOUROUX doit rentrer dans le genre *Thuiaria*. Le nom de *Grammaria* a donc été généralement adopté.

Grammaria abietina (Sars).

<i>Campanularia abietina</i>	SARS	1851	p. 131, 138.
»	»	SARS	1853 p. 387.
<i>Grammaria robusta</i>	STIMPSON	1854	p. 9, pl. 1, fig. 3.
<i>Grammaria ramosa</i>	ALDER	1856 (a)	p. 361, pl. 14, fig. 1-4.
<i>Grammaria robusta</i>	ALDER	1856 (a)	p. 362.
<i>Grammaria ramosa</i>	ALDER	1858	p. 96, 99, 130, pl. 6, fig. 1-4.
<i>Grammaria robusta</i>	ALDER	1858	p. 131.
<i>Grammaria ramosa</i>	ALDER	1860	p. 74, note.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 155.
»	»	NORMAN	1862 p. 152.
<i>Grammaria robusta</i>	ALDER	1863	p. 239.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 290.
<i>Grammaria abietina</i>	SARS	1863	p. 34.
<i>Grammaria robusta</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 148, 225.
<i>Salacia abietina</i>	HINCKS	1868	p. 212, pl. 41, fig. 3.
»	»	NORMAN	1869 p. 321.
<i>Grammaria abietina</i>	ALLMAN	1871	p. 169.

Grammaria gracilis Stimpson.

<i>Grammaria gracilis</i>	STIMPSON	1854	p. 9.
»	»	SARS	1863 p. 25, 29.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 148, 225.

Gen. *Gymnocoryne* Hincks 1871.

Gymnocoryne coronata Hincks.

<i>Gymnocoryne coronata</i>	ALLMAN	1871	p. 288.
-----------------------------	--------	------	---------

Gymnocoryne coronata HINCKS 1871 (b) p. 76, pl. 5, fig. 1.

Gen. *Halatractus* Allman 1871.

Halatractus nanus Alder.

Syn. : *Corymorpha nana* Alder.

Voir : Matériaux II, p. 63.

<i>Corymorpha nana</i>	ALDER	1858	p. 108, pl. 9, fig. 7-8.
»	SARS	1860	p. 342, 345 (Trad. allemande).
»	ALDER	1862	p. 314, pl. 15, fig. 1-5.
»	ALDER	1863	p. 233, pl. 11.
<i>Corymorpha nana</i>	HINCKS	1868	p. 130, pl. 22, fig. 3.
<i>Halatractus nanus</i>	ALLMAN	1871	p. 391.

Gen. *Halecium* Oken 1815.

Voir : Matériaux I, p. 448 et II, p. 78.

Halecium beani Johnston.

Voir : Matériaux II, p. 78.

<i>Halecium beani</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 121, pl. 3, fig. 8.
<i>Thoa beani</i>	THOMSON	1852	p. 403
<i>Halecium beani</i>	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 21.
<i>Thoa beani</i>	THOMPSON	1856	p. 453.
<i>Halecium beani</i>	WRIGHT	1857 (a)	p. 305.
»	ALDER	1858	p. 110.
»	HINCKS	1859 (b)	p. 128.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 357, note.
»	GREENE	1861	p. 91, fig. 48 (d).
»	HINCKS	1861 (c)	p. 155, 251, 252.
»	ALDER	1863 (a)	p. 289.
»	ALDER	1864	p. 192.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 7.

<i>Halecium beani</i>	ALDER	1867	p. 49.
»	HINCKS	1868	p. 224, 324, pl. 43, fig. 2 et pl. 44, fig. 3.
»	NORMAN	1869	p. 321.

Halecium capillare (Pourtalès).

<i>Thoa capillaris</i>	POURTALÈS	1869	p. 118.
------------------------	-----------	------	---------

Halecium edwardsianum (d'Orbigny).

Voir : Matériaux II, p. 78.

Halecium filiforme Alder.

<i>Halecium filiforme</i>	ALDER	1862	p. 315.
»	ALDER	1863	p. 236.
»	HINCKS	1868	p. 228, note.

Halecium geniculatum Norman.

<i>Halecium geniculatum</i>	NORMAN	1867	p. 196, 199, 205, 206.
»	HINCKS	1868	p. 229.

Halecium halecinum (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 448 et II, p. 78.

<i>Sertularia halecina</i>	TURTON et KINGSTON	1830	(pas de pagination).
»	THOMPSON	1831	p. 98.
»	BELLAMY	1839	p. 270.
<i>Halecium halecinum</i>	FORBES	1851	p. 245.
<i>Sertularia halecina</i>	MAITLAND	1851	p. 46. (Excl. syn. p. p.)
<i>Halecium halecinum</i>	SARS	1851	p. 131, 136.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 121, pl. 3, fig. 7.
<i>Thoa halecina</i>	THOMSON	1852	p. 403.
»	LEUCKART	1853	p. 86.
<i>Halecium halecinum</i>	SARS	1853	p. 387.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 21, fig. 30.
»	GOSSE	1856	p. 194.

<i>Thoa halecina</i>	THOMPSON	1856	p. 452.
<i>Halecium halecinum</i>	MÖRCH	1857	p. 24.
»	WRIGHT	1857 (b)	p. 82.
»	ALDER	1858	p. 99, 110.
»	ALDER	1859	p. 354.
»	HINCKS	1859 (b)	p. 128.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 357.
»	GREENE	1861	p. 91, fig. 18 (c).
»	HINCKS	1861 (c)	p. 251, 252, 291.
»	ALDER	1863 (a)	p. 289.
»	ALDER	1864	p. 192.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 359, 378, 388.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 147, 225, 226.
»	MC INTOSH	1866	p. 602.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 7.
»	ALDER	1867	p. 49.
<i>Thoa halecina</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 184, pl. 18.
<i>Halecium halecinum</i>	HELLER	1868	p. 33, 81.
»	HINCKS	1868	p. 221, pl. 42.
»	NORMAN	1869	p. 321, 323.
»	HERKLOTS	1870	p. 408, pl. 39, fig. 7.
»	ALLMAN	1871	p. 34 ... 169, fig. 29.
<i>Thoa halecina</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.

Halecium labrosum Alder.

<i>Halecium labrosum</i>	ALDER	1859	p. 354, pl. 13.
»	ALDER	1860	p. 74, note.
»	ALDER	1863	p. 235, 236.
»	ALDER	1867	p. 46, 49.
»	HINCKS	1868	p. 225, pl. 44, fig. 1 et p. 226, fig. 27.
»	NORMAN	1869	p. 321.
»	ALLMAN	1871	p. 158, 169.

Halecium lamourouxianum (d'Orbigny).

Voir : Matériaux II, p. 79.

Halecium muricatum (Ellis et Solander).

Voir : Matériaux I, p. 449 et II, p. 80.

<i>Halecium muricatum</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 122, pl. 3, fig. 9.
<i>Thoa muricata</i>	THOMSON	1852	p. 403.
<i>Halecium muricatum</i>	SARS	1853	p. 387.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 21.
<i>Thoa muricata</i>	THOMPSON	1856	p. 433.
<i>Halecium muricatum</i>	ALDER	1858	p. 96, 99, 110.
»	AGASSIZ	1860-62	vol. 4, p. 337, note.
»	ALDER	1863 (a)	p. 289.
»	PACKARD	1863	p. 403.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 147, 225, 226.
»	ALDER	1867	p. 49.
»	HINCKS	1868	p. 223, pl. 43, fig. 1.
»	NORMAN	1869	p. 321.
»	ALLMAN	1871	p. 169.

Halecium nanum Alder.

<i>Halecium nanum</i>	ALDER	1859	p. 355, pl. 14.
»	HINCKS	1868	p. 221.

Halecium patagonicum (d'Orbigny).

Voir : Matériaux II, p. 80.

Halecium plumosum Hincks.

<i>Halecium plumosum</i>	HINCKS	1868	p. 227, pl. 44, fig. 1.
--------------------------	--------	------	-------------------------

Halecium pulchellum (Pourtalès).

<i>Thoa pulchella</i>	POURTALÈS	1869	p. 118.
-----------------------	-----------	------	---------

Halecium sessile Norman.

<i>Halecium sessile</i>	NORMAN	1867	p. 196, 199, 205, 206.
-------------------------	--------	------	------------------------

<i>Halecium sessile</i>	HINCKS	1868 p. 229, pl. 44, fig. 2.
» »	HINCKS	1871 (b) p. 73, 80.

Halecium siphonatum (Pourtalès).

<i>Thoa siphonata</i>	POURTALES	1869 p. 119.
-----------------------	-----------	--------------

Halecium tehuelchum (d'Orbigny).

Voir : Matériaux II, p. 80.

Halecium tenellum Hincks.

<i>Halecium tenellum</i>	HINCKS	1861 (c) p. 232, pl. 6, fig. 1-4.
» »	ALDER	1863 p. 235.
» »	ALDER	1863 (a) p. 289.
» »	PARFITT	1866 (a) p. 7.
» »	ALDER	1867 p. 46, 49.
» »	HINCKS	1868 p. 226, pl. 40, fig. 1.

Gen. *Halia* Hincks 1855.

HINCKS a établi ce genre pour y placer l'*Halia praetenuis* qu'il considérait comme étant un Polyzoaire. Plus tard (1856) il a reconnu que cette espèce n'était autre que la *Campanularia serpens* de HASSAL, et l'a placée dans le genre *Reticularia* de W. THOMSON. Le nom de *Reticularia* étant déjà employé a été remplacé par celui de *Filellum*. L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 355, note) écrit *Thalia* au lieu de *Halia*.

Gen. *Halicornaria* sec. Allman 1883.

Le genre *Halicornaria* paraît avoir été établi par BUSK dans un mémoire manuscrit qui n'a pas été publié, mais qui est cité par ALLMAN dans le « Voyage of H. M. S. Challenger » (1883, p. 52). BUSK ne mentionne pas ce genre dans le « Voyage of the Rattlesnake » (1852). Le nom d'*Halicornaria* apparaît pour la première

fois dans une note de HINCKS (1865 (b), p. 409, note) où il cite « *Halicornaria (Plumularia) catherina* » mais sans donner aucune diagnose. Cette espèce, du reste, ne peut pas se placer dans le genre *Halicornaria* tel qu'il est compris aujourd'hui.

PARFITT dans son « Catalogue of the Fauna of Devon » (1866 a) admet ce genre, mais il l'écrit : *Halicorneria* Busk, et il n'en donne aucune diagnose. Les 5 espèces qu'il y fait rentrer sont toutes des *Plumularia*, tandis qu'il place les *Aglaophenia* dans le genre *Plumularia*.

ALLMAN (1883) est le premier auteur qui ait donné une diagnose du genre *Halicornaria*; elle a été complétée, plus tard par BALE (1884, p. 173) et par NUTTING (1900, p. 126).

Gen. *Halicorneria* Parfitt 1866.

Voir : *Halicornaria*.

Gen. *Halocharis* L. Agassiz 1862.

L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 239) après avoir établi le genre *Halocharis*, reconnu lui-même (ibid. p. 340) qu'il était synonyme de *Corynitis* Mc Crady.

Gen. *Halocordyle* Allman 1871.

ALLMAN (1871, p. 368) a introduit le nom d'*Halocordyle* pour remplacer ceux de *Globiceps* et d'*Eucoryne* qui avaient été proposés presque en même temps par AYRES et LEIDY et qui, tous deux, avaient déjà été employés en zoologie.

Halocordyle tiarella (Ayres).

<i>Globiceps tiarella</i>	AYRES	1854 p. 193.
<i>Eucoryne elegans</i>	LEIDY	1855 p. 136, pl. 10, fig. 1-5.

<i>Pennaria tiarella</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 153, 216.
<i>Globiceps tiarella</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 344.
<i>Pennaria tiarella</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 411.
<i>Globiceps tiarella</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 361.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 151, 186, 187.
<i>Pennaria tiarella</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 187, 224, 225, fig. 311-315.
<i>Encoryne elegans</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 17, 50.
<i>Halocordyle tiarella</i>	ALLMAN	1871 p. 369.

Gen. *Halybothrys* Filippi 1866.

Ce genre est synonyme de *Coryne* et doit donc disparaître.

Gen. *Heteractis* Allman 1864.

Après avoir créé ce genre (1864 (c), p. 359) pour y faire rentrer la *Corymorpha annulicornis* de SARS, ALLMAN reconnut (1864 (d), p. 61) que le nom d'*Heteractis* avait été déjà employé en botanique et le changea contre celui d'*Heterostephanus*.

Gen. *Heterocordyle* Allman 1864.

Heterocordyle conybearei Allman.

<i>Heterocordyle conybearei</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 365.
» »	ALLMAN	1864 (d) p. 59, pl. 2.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 183.
» »	HINCKS	1868 p. 107, pl. 18, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871 p. 307, pl. 10, fig. 1-7.

Gen. *Heteropyxis* Heller 1868.

Le nom d'*Heteropyxis* a été proposé par HELLER (1868, p. 44) pour remplacer celui de *Lowenia* (voir : Matériaux II, p. 90)

qui avait été déjà donné à un genre d'Echinodermes. Mais ce genre, dans lequel se trouvaient réunies des Plumulaires et des Nemertésies, n'a pas été adopté.

Gen. *Heterostephanus* Allman 1864.

Ce nom a été adopté par ALLMAN pour remplacer celui d'*Heteractis* déjà employé.

Heterostephanus annulicornis (Sars).

<i>Corymorpha ? annulicornis</i>	SARS	1860	p. 344 (Trad. allem.).
<i>Heteractis annulicornis</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 359.
»	»	ALLMAN	1864 (d) p. 61.
<i>Heterostephanus annulicornis</i>	ALLMAN	1871	p. 375.

Gen. *Hincksia* L. Agassiz 1862.

L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 355) avait cru devoir établir ce genre pour y placer la *Campanularia tincta* de HINCKS. Mais BALE (1884) et HARTLAUB (1905), qui ont pu étudier cette espèce, n'ont pas adopté les vues d'AGASSIZ. Le genre *Hincksia* doit donc tomber en synonymie de *Campanularia*.

Gen. *Hippocrene* Mertens 1834.

Une partie des Méduses, décrites sous le nom d'*Hippocrene*, appartient au genre *Bougainvillia*.

Gen. *Hybocodon* L. Agassiz 1860.

Hybocodon prolifer L. Agassiz.

<i>Steenstrupia oweni</i>	GREENE	1857	p. 243, 248, pl. 15, fig. 8.
---------------------------	--------	------	---------------------------------

<i>Hybocodon prolifer</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 3, p. 45, fig. 11-14, p. 109, fig. 68-70, vol. 4, p. 243 et 343, pl. 23 a, fig. 10-11, pl. 25.
<i>Steenstrupia oweni</i>	GREENE	1861	p. 63, 117, fig. 24 (h).
<i>Hybocodon prolifer</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 400.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 368, 369.
»	AGASSIZ, A.	1865 (a)	p. 100, fig. 31.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 193, 224, 225, fig. 325-328.
»	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 74, fig. 102-104.
»	KÖLLIKER	1865	p. 103.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 19, 51.
»	ALLMAN	1871	p. 82, 422.

Gen. *Hydra* Linné 1746.

Voir : Matériaux I, p. 450 et II, p. 81.

Hydra attenuata Pallas.

Voir : Matériaux I, p. 450, II, p. 81.

<i>Hydra pallens</i>	MAITLAND	1851	p. 38.
<i>Hydra attenuata</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 190.
»	HOUGHTON	1860	p. 228.
»	HOUGHTON	1866	p. 276.
»	HINCKS	1868	p. 316.
<i>Hydra pallens</i>	HERKLOTS	1870	p. 390, pl. 34, fig. 6.

Hydra carnea L. Agassiz.

<i>Hydra carnea</i>	AGASSIZ, L.	1851 (a)	p. 354.
»	AYRES	1856	p. 104.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 197, 224.
»	SMITH et VERRILL	1871	p. 448.

Hydra gracilis L. Agassiz.

<i>Hydra gracilis</i>	AGASSIZ, L.	1851 (a)	p. 354.
-----------------------	-------------	----------	---------

<i>Hydra gracilis</i>	AYRES	1856	p. 103.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 197, 225.

Hydra oligactis Pallas.

Voir : Matériaux I, p. 450, II, p. 81.

<i>Hydra fusca</i>	MULLER	1776 (a)	p. 214.
»	SCHUBLER	1820	p. 245.
»	THOMSON	1847	p. 283.
»	OWEN	1849	p. 9, 12, 14, 47.
European brown <i>Hydra</i>	AGASSIZ, L.	1851	p. 354.
<i>Hydra fusca</i>	BRULLÉ	1851	p. 51.
»	MAITLAND	1851	p. 39.
<i>Hydra oligactis</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 191.
<i>Hydra fusca</i>	ALLMAN	1853 (c)	p. 444.
»	WILLIAMS	1853	p. 246.
»	SCHMARDT	1854	p. 1, 5, 25.
»	ALLMAN	1855	p. 156.
»	AYRES	1856	p. 104.
»	THOMPSON	1856	p. 460.
<i>Hydra verrucosa</i>	THOMPSON	1856	p. 460.
<i>Hydra fusca</i>	HOUGHTON	1860	p. 228.
<i>Hydra oligactis</i>	HOUGHTON	1860	p. 229.
<i>Hydra fusca</i>	LEWES	1860	p. 71.
»	GREENE	1861	p. 82.
»	CLARK	1865 (a)	p. 90, fig. 46.
»	HOUGHTON	1866	p. 268, ss., pl. 14, fig. 8.
? <i>Hydra oligactis</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 14.
<i>Hydra fusca</i>	LEYDIG	1867	p. 44.
»	REICHERT	1867	p. 240, ss., pl. 7.
»	BAUDELLOT	1868	p. 129.
<i>Hydra oligactis</i>	HINCKS	1868	p. 315, fig. 42.
<i>Hydra fusca</i>	HERKLOTS	1870	p. 390, pl. 34, fig. 5.
»	ALLMAN	1871	p. 123, 124.
»	SCHULZE	1871	p. 18, 22, pl. 6.

Hydra rubra Lewes.

<i>Hydra rubra</i>	HOUGHTON	1860	p. 228.
--------------------	----------	------	---------

<i>Hydra rubra</i>	LEWES	1860	p. 71.
» »	GREENE	1861	p. 82.

Hydra tenuis Ayres.

<i>Hydra tenuis</i>	AYRES	1856	p. 104.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 197, 223.

Hydra viridis Linné.

Voir : Matériaux I, p. 452, II, p. 82.

<i>Hydra viridis</i>	SCHÜBLER	1820	p. 245.
» »	TURTON et KINGSTON	1830	sans pagination.
» »	BELLAMY	1839	p. 271.
» »	BAUMGÄRTNER	1845	p. 149, ss.
» »	THOMSON	1847	p. 281, pl. 4.
» »	ECKER	1848	p. 5-27, pl. 1.
» »	OWEN	1849	p. 44.
European green <i>Hydra</i>	AGASSIZ, L.	1851	p. 354.
<i>Hydra viridis</i>	BRULLÉ	1851	p. 48.
» »	COHN	1851	p. 264.
» »	ECKER	1851	p. 60.
» »	MAITLAND	1851	p. 37.
» »	SCHULTZE	1851	p. 18, 71, pl. 1, fig. 3.
» »	LANDSBOROUGH	1852	p. 188, pl. 12, fig. 39.
» »	ECKER	1853	p. 1, ss., pl. 1.
» »	ROUGET	1853	p. 388, ss., pl. 6-7.
» »	WILLIAMS	1853	p. 246.
» »	LEYDIG	1854	p. 271, ss.
» »	SCHMARDA	1854	p. 1, 25.
» »	AYRES	1856	p. 104.
» »	THOMPSON	1856	p. 459.
» »	WRIGHT	1857 (a)	p. 305.
» »	ALDER	1858	p. 131.
» »	LEWES	1858	p. 137, ss.
» »	HOUGHTON	1860	p. 228.
» »	LEWES	1860	p. 71.
» »	GREENE	1861	p. 82.

<i>Hydra viridis</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 294.
»	WRIGHT	1861 (a)	p. 359, pl. 18, fig. 5.
»	WRIGHT	1863 (b)	p. 220, 221, 273, 275, pl. 9, fig. 5.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 197.
»	HOUGHTON	1866	p. 272, ss.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 13.
»	LEYDIG	1867	p. 44.
»	REICHERT	1867	p. 240, 265, 271.
»	BAUDELLOT	1868	p. 129.
»	HINCKS	1868	p. 312, fig. 40 et p. 311, fig. 38, 39.
»	LANKESTER	1868	p. 114.
»	GREEF	1869 (a)	p. 7.
»	NORMAN	1869	p. 321.
»	RATZEL	1869	p. 272, pl. 23, fig. 20- 22.
»	HERKLOTS	1870	p. 390, pl. 34, fig. 4.
»	ALLMAN	1871	p. 111... 136.
»	KLEINENBERG	1871	p. 2, ss.
»	SCHULZE	1871	p. 30, 33.

Hydra vulgaris Pallas.

Voir : Matériaux I, p. 453, II, p. 83.

<i>Hydra aurantiaca</i>	THOMSON	1847	p. 283, 287, 288.
<i>Hydra grisea</i>	BRULLÉ	1851	p. 50.
»	MAITLAND	1851	p. 38.
<i>Hydra vulgaris</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 190.
»	ECKER	1853	p. 9, 10, 17.
<i>Hydra aurantiaca</i>	ECKER	1853	p. 17.
<i>Hydra grisea</i>	LAURENT	1853 (a)	p. 15.
»	LAURENT	1853 (b)	p. 39.
<i>Hydra vulgaris</i>	ROUGET	1853	p. 388, ss., pl. 6-7.
<i>Hydra aurantiaca</i>	LEYDIG	1854	p. 271, ss., pl. 10, fig. 3-11.
<i>Hydra grisea</i>	LEYDIG	1854	p. 271, ss.
<i>Hydra vulgaris</i>	LINDSTRÖM	1855 (a)	p. 73.

<i>Hydra vulgaris</i>	THOMPSON	1856	p. 459.
» »	WRIGHT	1857 (a)	p. 305, 307.
» »	ALDER	1858	p. 131.
» »	HOUGHTON	1860	p. 228.
<i>Hydra grisea</i>	HOUGHTON	1860	p. 228.
» »	JÄGER	1860	p. 321, ss.
» »	LEWES	1860	p. 71.
<i>Hydra vulgaris</i>	EHRENBERG	1861	p. 15.
» »	GREENE	1861	p. 25, 82, fig. 3.
? » »	HINCKS	1861 (c)	p. 294.
» »	KÖLLIKER	1865 (a)	p. 91.
<i>Hydra vulgaris (grisea)</i>	KÖLLIKER	1865	p. 178, pl. 17, fig. 3.
<i>Hydra grisea</i>	KÖLLIKER	1865	p. 105.
<i>Hydra vulgaris</i>	HOUGHTON	1866	p. 276, pl. 14, fig. 2.
» »	MÖBIUS	1866	p. 9, 11, pl. 2, fig. 3-6.
» »	PARFITT	1866 (a)	p. 13.
» »	LEYDIG	1867	p. 44.
» »	REICHERT	1867	p. 259, 267.
<i>Hydra grisea</i>	REICHERT	1867	p. 240, ss.
<i>Hydra vulgaris</i>	HINCKS	1868	p. 314, fig. 41.
<i>Hydra grisea</i>	HERKLOTS	1870	p. 388, 390, pl. 34, fig. 3.
<i>Hydra vulgaris</i>	ALLMAN	1871	p. 93.

Gen. *Hydractinia* van Beneden 1841.

Voir : Matériaux I, p. 453 et II, p. 85.

Hydractinia echinata (Fleming).

Voir : Matériaux II, p. 85.

<i>Alcyonidium echinatum</i>	FORBES	1843 (a)	p. 40.
» »	HASSAL	1843 (a)	p. 117.
<i>Echinocorium clavigerum</i>	HASSAL	1843 (a)	p. 118.
<i>Hydractinia echinata</i>	FORBES	1851	p. 245.
<i>Syhydra parasites</i>	KROHN	1851	p. 265, note.
<i>Hydractinia lactea</i>	MAITLAND	1851	p. 40.
<i>Hydractinia echinata</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 104, pl. 1, fig. 1.

<i>Hydractinia grisea</i>	GEGENBAUR	1854	p. 216.
<i>Hydractinia lactea</i>	GEGENBAUR	1854	p. 180, 185, 216.
<i>Hydractinia rosea</i>	GEGENBAUR	1854	p. 185, 216.
<i>Synhydra parasites</i>	GEGENBAUR	1854	p. 216.
<i>Hydractinia echinata</i>	STIMPSON	1854	p. 41.
» »	GOSSE	1855	p. 19, fig. 24.
» »	TEMPLER	1855	p. 4575.
? <i>Clava capitata</i>	THOMPSON	1856	p. 451.
<i>Hydractinia echinata</i>	WRIGHT	1856	p. 88.
<i>Synhydra parasites</i>	SARS	1857 (a)	p. 145.
<i>Hydractinia echinata</i>	WRIGHT	1857 (a)	p. 298, ss., pl. 5-6.
<i>Hydractinia lactea</i>	WRIGHT	1857 (a)	p. 310.
<i>Hydractinia rosea</i>	WRIGHT	1857 (a)	p. 310.
<i>Hydractinia echinata</i>	ALDER	1858	p. 99, 102, 105.
» »	THOMPSON	1858	p. 108.
» »	ALLMAN	1859 (b)	p. 370.
» »	MC CRADY	1859 (b)	p. 168.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 339.
» »	GREENE	1861	p. 86, fig. 17 (c).
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 157.
» »	WRIGHT	1861 (b)	p. 124, 130.
» »	ALDER	1862	p. 312.
» »	ALLMAN	1862	p. 52.
» »	ALDER	1863	p. 225.
» »	WRIGHT	1863 (a)	p. 38.
» »	WRIGHT	1863 (b)	p. 277.
<i>Hydractinia</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 283, pl. 12, fig. 1-7.
<i>Hydractinia echinata</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 356, 359, 395, 404, 416, 423, fig. 2.
» »	ALLMAN	1864 (c)	p. 355.
» »	ALLMAN	1864 (d)	p. 57.
» »	KÖLLIKER	1864	p. 233.
» »	ALLMAN	1865	p. 473.
» »	HINCKS	1865 (b)	p. 1, fig. 5.
» »	MC INTOSH	1866	p. 602.
» »	PARFITT	1866 (a)	p. 5.
» »	ALDER	1867	p. 48.

<i>Hydractinia echinata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 17, fig. et p. 134, pl. 11.
<i>Hydractinia lactea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 135.
<i>Hydractinia echinata</i>	FISCHER	1867	p. 689.
»	NORMAN	1867	p. 199.
»	HINCKS	1868	p. 23, pl. 4.
»	NORMAN	1869	p. 323.
»	HERKLOTS	1870	p. 395, pl. 39, fig. 6.
»	ALLMAN	1871	p. 30... 220, 345, fig. 4, 7, 15, pl. 15 et pl. 16, fig. 10 et 11.
»	METZGER	1871 (a)	p. 35.

Hydractinia polyclina L. Agassiz.

<i>Hydractinia echinata</i>	LEIDY	1855	p. 135, pl. 11, fig. 35.
<i>Hydractinia polyclina</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 3, p. 36, fig. 2, p. 49, fig. 24 et 25, p. 108, fig. 61-62, pl. 16; vol. 4, p. 226, fig. 33-35, p. 339, pl. 26, fig. 18.
»	PACKARD	1863	p. 404, 422.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 359, 388, 396, 424.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 355.
»	CLARK	1864 (a)	p. 397.
»	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 73, fig. 100-101.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 198, 224, 225, 226.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 132.
<i>Hydractinia polycleus</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 17, 50.
<i>Hydractinia polyclina</i>	ALLMAN	1871	p. 34... 347.

Cette espèce est très probablement synonyme d'*H. echinata*. Voir : HINCKS (1868, p. 23) et ALLMAN (1871, p. 347).

Hydractinia sodalis Stimpson.

<i>Hydractinia sodalis</i>	STIMPSON	1859	p. 249.
----------------------------	----------	------	---------

Gen. *Hydrallmania* Hincks 1868.

Voir : Matériaux I, p. 454 et II, p. 86.

HINCKS (1868, p. 273) a créé ce genre pour y placer la *Sertularia falcata* de LINNÉ.

Hydrallmania falcata (Linné).

Syn. : *Sertularia falcata* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 454 et 470, II, p. 86 et 112.

<i>Aglaophenia amathioides</i>	LAMOUREUX	1816	p. 173.
<i>Plumularia falcata</i>	TURTON et KINGSTON	1830	(sans pagination).
»	BELLAMY	1839	p. 271.
»	COUCH	1843	p. 208.
»	BUSK	1851	p. 118.
»	FORBES	1851	p. 245.
<i>Sertularia (Plumularia)</i>			
<i>falcata</i>	MAITLAND	1851	p. 54.
<i>Plumularia falcata</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 144, pl. 8, fig. 22.
»	SARS	1853	p. 387.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	STIMPSON	1854	p. 8.
<i>Plumularia tenerrima</i>	STIMPSON	1854	p. 8.
<i>Plumularia falcata</i>	GOSSE	1855	p. 24.
»	TEMPLER	1855	p. 4575, 4576.
»	ALDER	1856 (a)	p. 357, 358, 359.
»	GOSSE	1856	p. 193.
»	THOMPSON	1856	p. 454, 456, 458.
»	WRIGHT	1856	p. 88.
»	ALDER	1858	p. 99, 113, 115, 118. 125, 126, 130, 131.
»	WRIGHT	1858 (a)	p. 341.
»	ALLMAN	1859 (c)	p. 309.
»	MURRAY	1860 (a)	p. 250.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 356.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 255, 294.

<i>Plumularia falcata</i>	HINCKS	1862 (b) p. 362.
» »	ALDER	1863 (a) p. 290.
» »	PACKARD	1863 p. 422.
» »	ALDER	1864 p. 193.
<i>Plumularia tenerissima</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 144.
<i>Sertularia falcata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 144, 225, 226.
» »	PARFITT	1866 (a) p. 9.
<i>Plumularia falcata</i>	ALDER	1867 p. 49.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 187.
» »	NORMAN	1867 p. 200.
<i>Hydrallmania falcata</i>	HINCKS	1868 p. 273, pl. 58.
<i>Plumularia falcata</i>	ALLMAN	1869 (b) p. 87.
<i>Hydrallmania falcata</i>	NORMAN	1869 p. 321.
<i>Plumularia falcata</i>	HERKLOTS	1870 p. 400, pl. 37, fig. 3.
» »	ALLMAN	1871 p. 55.
<i>Hydrallmania falcata</i>	ALLMAN	1871 p. 165 ... 170.
<i>Plumularia falcata</i>	METZGER	1871 (a) p. 35.
» »	METZGER	1871 (b) p. 21.

Hydrallmania franciscana (Trask).

<i>Plumularia franciscana</i>	TRASK	1857 p. 113, pl. 4, fig. 3.
<i>Plumularia gracilis</i>	MURRAY	1860 (a) p. 251, pl. 12, fig. 1.
<i>Sertularia gracilis</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 145, 223.

Gen. *Hydranthea* Hincks 1868.

Hydranthea margarica Hincks.

<i>Atractylis margarica</i>	HINCKS	1862 (c) pl. 9, fig. 4.
» »	HINCKS	1863 p. 45.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 363.
<i>Hydranthea margarica</i>	HINCKS	1868 p. 100, pl. 19, fig. 1.
» »	ALLMAN	1871 p. 158, 301.

Gen. *Hypsorophus* Allman 1864.

ALLMAN (1864 (c), p. 376) avait donné provisoirement le nom

d'*Hypsorophus* aux espèces qui rentrent dans le genre *Campanulina*, mais il l'a abandonné.

Gen. *Idia* Lamouroux 1816.

Voir : Matériaux I, p. 454 et II, p. 87.

Idia pristis Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 454 et II, p. 87.

<i>Sertularia pristis</i>	BUSK	1852	p. 387, 389, 391, 401.
---------------------------	------	------	------------------------

Gen. *Lafoea* Lamouroux 1821.

Voir : Matériaux II, p. 88.

L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 351) écrivait, par erreur, *Laphoea*, au lieu de *Lafoea*.

Lafoea calcarata A. Agassiz.

<i>Lafoea calcarata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 122, 131, 132, 138, 224, fig. 184-194.
-------------------------	-------------	----------	--

Lafoea dumosa (Fleming).

Voir : Matériaux II, p. 88.

<i>Campanularia dumosa</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
»	»	FORBES	1851 p. 246.
»	»	SARS	1851 p. 131, 138.
»	»	BUSK	1852 p. 386, 388, 401.
»	»	HASSAL et COPPIN	1852 p. 163.
»	»	LANDSBOROUGH	1852 p. 168, pl. 11, fig. 35.
»	»	HINCKS	1853 p. 178.
»	»	SARS	1853 p. 387.
»	»	THOMSON	1853 (b) p. 443.
»	»	IRVINE	1854 p. 245.
»	»	GOSSE	1855 p. 25.
»	»	LEIDY	1855 p. 138.

<i>Campanularia dumosa</i>	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	»	ALDER	1856 (a) p. 361.
»	»	HINCKS	1856 p. 470, note.
? »	»	THOMPSON	1856 p. 459.
»	»	ALDER	1858 p. 99, 129.
<i>Laphoea dumosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 351. Ex. syn. p. p.
<i>Laphoea cornuta</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 351.
<i>Lafoea cornuta</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 352, note.
<i>Campanularia dumosa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 156.
<i>Calicella dumosa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 293, 294.
<i>Laphoea cornuta</i>	AGASSIZ, A.	1862 (a)	p. 351.
<i>Calicella dumosa</i>	ALDER	1863 (a)	p. 290.
? <i>Lafoea ramosa</i>	PACKARD	1863	p. 404.
<i>Campanularia dumosa</i>	SARS	1863	p. 25, 26, 35.
<i>Lafoea cornuta</i>	SARS	1863	p. 25, 29.
<i>Lafoea dumosa</i>	SARS	1863	p. 26, 30.
<i>Calicella dumosa</i>	ALDER	1864	p. 193.
<i>Lafoea cornuta</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 377, 382.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 378, 379.
<i>Lafoea dumosa</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 375, 379.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 126, 225, 226.
<i>Laphoea cornuta</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 91, fig. 4.
<i>Lafoea cornuta</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 122, 126, 225, 226.
»	»	AGASSIZ, E. et A.	1865 p. 67, fig. 87.
? <i>Campanularia dumosa</i>	MC INTOSH	1866	p. 602, fig. 1.
<i>Calicella dumosa</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 13.
<i>Lafoea (Calycella) dumosa</i>	ALDER	1867	p. 50.
<i>Lafoea dumosa</i>	NORMAN	1867	p. 199.
<i>Campanularia dumosa</i>	HELLER	1868	p. 46, 82. pl. 3, fig. 1.
<i>Lafoea dumosa</i>	HINCKS	1868	p. 200, pl. 41, fig. 1 et p. 201, fig. 23.
»	»	NORMAN	1869 p. 322.
»	»	ALLMAN	1871 p. 157 ... 169.

Dans les Matériaux II, p. 88, ligne 16, après « JOHNSTON 1825 p. 222 » ajouter : « pl. 3, fig. 2-3. »

Lafoea dumosa (Fleming) var. *robusta* Sars.

<i>Lafoea dumosa</i> var. <i>robusta</i> Sars	1863	p. 29.
---	------	--------

Lafoea fruticosa Sars.

<i>Campanularia fruticosa</i>	SARS	1851	p. 131, 138.
»	»	SARS	1853 p. 387.
<i>Campanularia gracillima</i>	ALDER	1856 (a)	p. 361, pl. 14, fig. 5-6.
»	»	HINCKS	1856 p. 470, note.
»	»	ALDER	1858 p. 99, 129, pl. 6, fig. 5-6.
»	»	ALDER	1860 p. 74, note.
<i>Campanularia fruticosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355, note.
<i>Calicella fruticosa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 293.
<i>Calicella gracillima</i>	NORMAN	1862	p. 152.
<i>Campanularia fruticosa</i>	ALDER	1863	p. 239.
<i>Campanularia gracillima</i>	SARS	1863	p. 31.
<i>Lafoea fruticosa</i>	SARS	1863	p. 30.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 379.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 13.
<i>Lafoea (Calycella) fruticosa</i>	ALDER	1867	p. 50.
<i>Lafoea fruticosa</i>	HINCKS	1868	p. 202, pl. 44, fig. 2.
»	»	NORMAN	1869 p. 322.
»	»	ALLMAN	1871 p. 169.

Lafoea halecioides Allman.

<i>Lafoea halecioides</i>	ALLMAN	1871	p. 170.
---------------------------	--------	------	---------

Lafoea parvula Hincks.

<i>Campanularia parvula</i>	HINCKS	1853	p. 178, pl. 5, A.
»	»	GOSSE	1855 p. 25.
»	»	HINCKS	1856 p. 470, note.
»	»	THOMPSON	1856 p. 491.
<i>Lafoea parvula</i>	HINCKS	1868	p. 203, pl. 40, fig. 1 et p. 204, fig. 24.
»	»	ALLMAN	1871 p. 158.

Lafoea pocillum Hincks.

<i>Lafoea pocillum</i>	HINCKS	1868	p. 204, pl. 40, fig. 2.
------------------------	--------	------	-------------------------

Lafoea pygmaea Hincks.

<i>Lafoea pygmaea</i>	HINCKS	1868	p. 205, pl. 40, fig. 3.
»	HINCKS	1869	p. 45, fig. 3.
»	ALLMAN	1871	p. 158.

Gen. *Lafoeina* Sars 1869.

SARS (1869, p. 251 de la trad. anglaise) en créant ce genre n'en a pas donné de diagnose.

Lafoeina tenuis Sars.

<i>Lafoeina tenuis</i>	SARS	1869	p. 251 (Trad. anglaise).
»	ALLMAN	1871	p. 165, 170.

Gen. *Laomedea* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 428, 454 et II, p. 89.

Il serait bon d'abandonner définitivement le nom de *Laomedea*, car tous les auteurs qui ont admis ce genre en ont donné des diagnoses différentes. La plupart des espèces qui ont été décrites sous le nom de *Laomedea* rentrent dans les genres : *Campanularia*, *Campanulina*, *Gonothyraea*, *Leptoscyphus*, *Obelia*, *Opercularella*, *Plumularia* et *Thyroscyphus* où nous les avons placées.

Nous ferons encore figurer, provisoirement, dans le genre *Laomedea* quelques espèces auxquelles nous ne pouvons pas attribuer une place définitive.

Laomedea diaphana A. Agassiz.

<i>Laomedea diaphana</i>	AGASSIZ, A.	1862	p. 225.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 171.

Laomedea gigantea A. Agassiz.

Laomedea gigantea AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 94, 225.

Laomedea gracilis Pickering.

Matériaux II, p. 89.

Voir : *Obelia geniculata*.

La *Laomedea gracilis* de PICKERING a été trop incomplètement décrite et figurée pour qu'il soit possible de la déterminer exactement. Nous l'avions indiquée comme espèce douteuse (Matériaux II, p. 89), mais nous croyons qu'il est plus naturel de la considérer comme synonyme probable (?) de l'*Obelia geniculata*. Dans tous les cas, il ne faut pas la confondre avec la *Laomedea gracilis* de Sars (= *Gonothyraea gracilis*).

Laomedea pacifica A. Agassiz.

Laomedea pacifica AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 94, 222, 223.

Laomedea rigida A. Agassiz.

Laomedea rigida AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 93, 223.

Laomedea torresi Busk.

Laomedea torresi BUSK 1852 p. 388, 402.

Gen. *Lar* Gosse 1857.

Lar sabellarum Gosse.

<i>Lar sabellarum</i>	GOSSE	1857 p. 116, pl. 20.
»	WRIGHT	1861 (b) p. 127, pl. 5, fig. 8.
»	WRIGHT	1863 (b) p. 281.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 356.
»	HINCKS	1868 p. 35, 36, fig. 2.
»	ALLMAN	1871 p. 425.

Gen. *Leptoscyphus* Allman 1864.*Leptoscyphus tenuis* Allman.

<i>Laomedeia tenuis</i>	ALLMAN	1859 (b) p. 367.
»	ALLMAN	1864 (a) p. 377, 382.
<i>Leptoscyphus tenuis</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 379.
<i>Laomedeia tenuis</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 164.
<i>Leptoscyphus tenuis</i>	HINCKS	1868 p. 197, pl. 34, fig. 2.
»	ALLMAN	1871 p. 58, 63.

Gen. *Lineolaria* Hincks 1861.*Lineolaria spinulosa* Hincks.

<i>Lineolaria spinulosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 356.
»	HINCKS	1861 (b) p. 280, pl. 13.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 380.

Gen. *Lovenella* Hincks 1868.

Voir : Matériaux II, p. 90.

Lovenella clausa (Loven).

Voir : Matériaux II, p. 90.

<i>Lovenella clausa</i>	HINCKS	1868 p. 177, pl. 32, fig. 2 et p. 178, fig. 19.
»	HINCKS	1871 (b) p. 79, pl. 5, fig. 2.

Gen. *Lytoscyphus* Pictet 1893.

Voir : Matériaux II, p. 90.

Lytoscyphus articulatus (Lamouroux).

Voir : Matériaux II, p. 90.

Nous avons placé dans ce genre la *Laomedeia articulata* de LAMOUROUX.

BILLARD (1909) n'a malheureusement pas pu en retrouver le type, mais il croit qu'elle doit être considérée comme synonyme de *Lytoscyphus fruticosus* (Esper). Cependant, comme LAMOUREUX admettait qu'il s'agissait de 2 espèces distinctes, mais qu'il n'a pas donné de renseignements précis à cet égard, il nous semble préférable de mettre la *Laomedea articulata* dans les espèces indéterminables.

Lytoscyphus fruticosus (Esper).

Voir : Matériaux I, p. 471 et II, p. 91. .

Gen. *Manicella* Allman 1859.

Le genre *Manicella* est synonyme de *Bimeria* qui a la priorité ainsi qu'ALLMAN lui-même l'a reconnu (1871, p. 297).

Gen. *Merona* Norman 1865.

NORMAN (1865, p. 261) a créé ce genre pour une espèce qu'il avait d'abord décrite sous le nom de *Tubiclava cornucopiae*. ALLMAN (1871, p. 257) a adopté le genre *Merona*, mais non pas HINCKS (1868, p. 10) qui maintient l'espèce de NORMAN dans le genre *Tubiclava*.

Merona cornucopiae Norman.

<i>Tubiclava cornucopiae</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 351.
» »	NORMAN	1864 p. 82, pl. 9, fig. 4-5.
<i>Merona cornucopiae</i>	NORMAN	1865 p. 262.
<i>Tubiclava cornucopiae</i>	ALDER	1867 p. 45, 48.
» »	HINCKS	1868 p. 11, pl. 2, fig. 2.
<i>Merona cornucopiae</i>	NORMAN	1868 p. 440.
<i>Tubiclava cornucopiae</i>	NORMAN	1869 p. 256, 261, 323.
<i>Merone cornucopiae</i>	ALLMAN	1871 p. 169.
<i>Merona cornucopiae</i>	ALLMAN	1871 p. 258.

Gen. *Monocaulus* Allman 1864-1871.

ALLMAN en créant ce genre (1864 (c), p. 370) lui donna le nom de *Monocaulos* qu'il changea plus tard en *Monocaulus* (1871, p. 375). Il l'a établi pour y faire rentrer la *Corymorpha glacialis* de SARS et la *Corymorpha pendula* d'AGASSIZ.

Monocaulus glacialis (Sars).

<i>Corymorpha glacialis</i>	SARS	1860	p. 345, 348, 350. (Trad. allemande.)
»	»	ALDER	1862 p. 315.
»	»	ALDER	1863 p. 235.
<i>Monocaulos glacialis</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 370.
<i>Monocaulus glacialis</i>	ALLMAN	1871	p. 396.

Monocaulus pendulus (L. Agassiz).

<i>Corymorpha pendula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 276, 343, pl. 26, fig. 7-17.
<i>Monocaulos pendula</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 370.
<i>Corymorpha pendula</i>	AGASSIZ, A.	1865 (a)	p. 100, fig. 31.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 192, 225, fig. 324.
<i>Monocaulus pendulus</i>	ALLMAN	1871	p. 397.

[Gen. *Monostaechas* Allman 1877].*Monostaechas quadridens* (Mac Crady).

<i>Plumularia quadridens</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 199.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 358.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 140, 223, 224.

Gen. *Myriothele* Sars 1851.

Voir : Matériaux II, p. 91.

Bien que le nom générique de *Candelabrum* ait la priorité sur

celui de *Myriothele*, ce dernier a été généralement adopté pour plusieurs raisons qui ont été exposées par ALLMAN (1864 (d) p. 63).

Myriothele cocksi (Vigurs).

Voir : Matériaux II, p. 92.

<i>Arum cocksi</i>	COCKS	1852	p. 22.
»	COCKS	1853 (a)	p. 34, pl. 3, fig. 7-12.
<i>Spadix purpurea</i>	COCKS	1853 (b)	p. 365.
»	GOSSE	1853 (b)	p. 126.
<i>Spadix cocksi</i>	GOSSE	1853 (b)	p. 386.
<i>Spadix purpurea</i> p. p.	FORBES	1854	p. 31. Excl. syn.
<i>Myriothele arctica</i> p. p.	FORBES	1854	p. 31. Excl. syn.
<i>Arum cocksi</i>	SARS	1857 (b)	p. 195.
<i>Spadix cocksi</i>	SARS	1857 (b)	p. 195.
<i>Myriothele arctica</i>	WRIGHT	1858 (d)	p. 433.
»	WRIGHT	1859 (a)	p. 108.
<i>Candelabrum arcticum</i> p. p. AGASSIZ, L.		1860-62	vol. 4, p. 341. Ex. syn. p. p.
<i>Myriothele arctica</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 157.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 411.
»	ALLMAN	1864 (d)	p. 63.
<i>Myriothele phrygia</i>	HINCKS	1868	p. 77, pl. 12, fig. 3. Excl. syn. p. p.
»	ALLMAN	1871	p. 168 et 382. Excl. syn. p. p.

Myriothele phrygia (Fabricius).

Voir : Matériaux II, p. 92.

<i>Myriothele arctica</i>	SARS	1851	p. 126, 131, 134.
<i>Myristhela arctica</i>	ALDER	1853	p. 35.
<i>Myriothele arctica</i> p. p.	FORBES	1854	p. 31. Excl. syn.
»	GOSSE	1855	p. 20, fig. 25.
<i>Corymorphia phrygia</i>	MÖRCH	1857	p. 24.
<i>Myriothele arctica</i>	SARS	1857 (b)	p. 192, 194.
»	SARS	1860	p. 342 (Trad. allem.).

<i>Candelabrum arcticum</i> p. p.	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 341. Ex. syn. p. p.
<i>Candelabrum phrygium</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 341.
<i>Myriothele arctica</i>	SARS	1861	p. 693.
<i>Candelabrum phrygia</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 358.
<i>Candelabrum arcticum</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 358.
<i>Candelabrum phrygium</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 186, 225, 226.
<i>Myriothele arctica</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 5.
<i>Myriothele phrygia</i> p. p.	ALLMAN	1871	p. 382. Excl. syn. p. p.

Gen. *Nemertesia* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 455 et II, p. 92.

Nemertesia antennina Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 455 et II, p. 92.

<i>Cymodocea ramosa</i>	LAMOUROUX	1816	p. 216, pl. 7, fig. 1 a, A.
<i>Cymodocea simplex</i>	LAMOUROUX	1816	p. 216, pl. 7, fig. 2 a, A.
<i>Sertularia antennina</i>	TURTON et KINGSTON	1830	(sans pagination).
<i>Antennularia antennina</i>	BELLAMY	1839	p. 270.
»	FORBES	1851	p. 245.
<i>Sertularia (Antennularia)</i>			
<i>antennina</i>	MAITLAND	1851	p. 52.
<i>Antennularia antennina</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 141, pl. 7, fig. 20.
»	GOSSE	1853 (a)	p. 311, 313, 434, pl. 11.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 24, fig. 33.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	GOSSE	1856	p. 194.
»	THOMPSON	1856	p. 456.
»	ALDER	1858	p. 99, 117, 118.
<i>Nemertesia antennina</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 358.
<i>Antennularia antennina</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 225.
»	ALLMAN	1862	p. 57.
»	ALDER	1863 (a)	p. 290.
»	ALDER	1864	p. 193.

<i>Antennularia antennina</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 378.
»	»	ALLMAN	1864 (b) p. 203, 205, pl. 14, fig. 5.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 10.
»	»	ALDER	1867 p. 49.
»	»	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 187.
»	»	NORMAN	1867 p. 200.
»	»	HELLER	1868 p. 38, 81.
»	»	HINCKS	1868 p. 280, pl. 61.
»	»	NORMAN	1869 p. 321.
»	»	HERKLOTS	1870 p. 403, pl. 37, fig. 6.
»	»	ALLMAN	1871 p. 47... 169, fig. 50, 54.

Dans les Matériaux II, p. 94, supprimer les 2 citations suivantes :

<i>Aglaophenia tetrasticha</i>	MENEGHINI	1845	p. 12, 15 [pl. 14, fig. 2].
<i>Lowenia tetrasticha</i>	MENEGHINI	1845	p. 12, 15, pl. 14, fig. 2.

qui se rapportent à la *Nemertesia tetrasticha*.

Nemertesia cymodocea (Busk).

<i>Antennularia cymodocea</i>	BUSK	1851	p. 119.
-------------------------------	------	------	---------

Nemertesia janini Lamouroux.

Matériaux I, p. 456 et II, p. 93.

Voir : *Nemertesia ramosa*.

Nemertesia ramosa Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 457 et II, p. 93.

Syn. : *Nemertesia janini* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 456 et II, p. 93.

<i>Sertularia antennina</i> β	LINNÉ	1758	p. 811.
»	»	LINNÉ	1767 p. 1310.
»	»	GMELIN	1788-93 p. 3851.
<i>Aglaophenia gracilis</i>	LAMOUREUX	1816	p. 171.
<i>Cymodocea comata</i>	LAMOUREUX	1821	p. 15, pl. 67, fig. 12, 13.

<i>Antennularia ramosa</i>	BUSK	1851	p. 119.
»	»	FORBES	1851 p. 245.
<i>Sertularia (Antennularia)</i>			
<i>ramosa</i>	MAITLAND	1851	p. 53.
<i>Antennularia ramosa</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 142, pl. 7, fig. 21.
»	»	GOSSE	1855 p. 24.
»	»	TEMPLER	1855 p. 4576.
»	»	ALDER	1856 (a) p. 356.
<i>Antennularia arborescens</i>	THOMPSON	1856	p. 456.
<i>Antennularia ramosa</i>	ALDER	1858	p. 99, 106, 117.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 255.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 290.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 10.
»	»	ALDER	1867 p. 49.
<i>Antennularia janini</i>	HELLER	1868	p. 39, 81.
<i>Antennularia ramosa</i>	HINCKS	1868	p. 282, pl. 62.
»	»	NORMAN	1869 p. 321.
»	»	HERKLOTS	1870 p. 403, pl. 37, fig. 8.
»	»	ALLMAN	1871 p. 158.

BILLARD, en étudiant la collection d'Hydroïdes de LAMOUROUX, a pu constater que la *Nemertesia janini* était synonyme de *N. ramosa*. On devra donc réunir les citations bibliographiques de ces deux espèces. En outre, d'après BILLARD, l'*Aglaophenia gracilis* et la *Cymodocea comata* de LAMOUROUX que nous avons indiquées comme étant indéterminables, doivent être également considérées comme synonymes de *Nemertesia ramosa*.

Nemertesia tetrasticha (Meneghini).

<i>Aglaophenia tetrasticha</i>	MENEGHINI	1845	p. 12, 15 [pl. 14, fig. 2].
<i>Lowenia tetrasticha</i>	MENEGHINI	1845	p. 12, 15, pl. 14, fig. 2.
<i>Heteropyxis tetrasticha</i>	HELLER	1868	p. 44, 82.

M. le Dr E. STECHOW a constaté que l'*Aglaophenia* ou *Lowenia tetrasticha* de MENEGHINI n'est pas synonyme de *Nemertesia ramosa*, comme nous l'avions indiqué par erreur, mais qu'elle représente bien une espèce distincte de *Nemertesia*. Il convient donc de rétablir sa synonymie comme ci-dessus :

Nemertesia triseriata (Pourtalès).

Antennularia triseriata POURTALÈS 1869 p. 118.

Gen. *Nemopsis* L. Agassiz 1850.

Le genre *Nemopsis* avait été créé par L. AGASSIZ pour une nouvelle espèce de Méduse, *N. bachei*. Mais MAC CRADY (1859 (b) p. 160) a décrit sous le nom de *N. gibbesii* une espèce qui paraît être synonyme de *N. bachei* et dont il a pu étudier la forme Polype. Le nom de *Nemopsis* s'applique donc également au Polype.

Nemopsis bachei L. Agassiz.

Matériaux II, p. 140.

<i>Nemopsis bachei</i>	AGASSIZ, L.	1850 (a) p. 289, fig.
» »	MC CRADY	1859 (b) p. 161.
<i>Nemopsis gibbesii</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 160, 162, 163, 187, pl. 10, fig. 1-7.
<i>Nemopsis bachei</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 345.
<i>Nemopsis gibbesii</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 370.
<i>Nemopsis bachei</i>	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 98, fig. 26-27.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 149, 224, fig. 227- 231.
<i>Nemopsis gibbesii</i>	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 99.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 149.
» »	ALLMAN	1871 p. 362.

Gen. *Obelia* Péron et Lesueur 1810 — Emend. Hincks 1868.

Voir : Matériaux I, p. 457 et II, p. 95.

L'ancien genre *Obelia* de PÉRON et LESUEUR a été modifié par HINCKS qui lui a attribué de nouveaux caractères.

Obelia commissuralis Mac Crady.

<i>Laomedea dichotoma</i>	LEIDY	1855	p. 138, pl. 11, fig. 36.
<i>Obelia commissuralis</i>	Mc CRADY	1859 (b)	p. 186, 197, pl. 11, fig. 5-7.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62, vol. 4, p. 315 et 351, pl. 33 et pl. 34, fig. 10-21.
»	»	AGASSIZ, A.	1862 p. 225.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 372.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 91, fig. 5.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 86, 88-91, 93, 223- 225, fig. 134-135.

Obelia diaphana (L. Agassiz).

Matériaux II, p. 140.

Voir : *Obelia geniculata*.*Obelia dichotoma* (Linné).Syn. : *Campanularia dichotoma* Lamarck.Syn. : *Laomedea dichotoma* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 429 et II, p. 49.

<i>Campanularia dichotoma</i>	TURTON et KINGSTON	1830	sans pagination.
<i>Sertularia dichotoma</i>	EHRENBERG	1836 (d)	p. 33.
<i>Campanularia dichotoma</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
<i>Laomedea dichotoma</i>	DESOR	1851 (a)	p. 66.
<i>Campanularia (Laomedea)</i>			
<i>dichotoma</i>	MAITLAND	1851	p. 44.
<i>Laomedea dichotoma</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 158, pl. 10, fig. 30.
<i>Campanularia dichotoma</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 300 ss.
»	»	GEGENBAUR	1854 p. 164, 172, 173, 217.

<i>Laomedea dichotoma</i>	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 24.
»	GOSSE	1856	p. 24, 61.
»	THOMPSON	1856	p. 458.
»	GREENE	1857	p. 249.
»	ALDER	1858	p. 121, 122. (Excl. syn. p. p.).
»	COSTE	1858	p. 711.
»	ALLMAN	1859 (b)	p. 137, 368, note.
»	ALLMAN	1859 (c)	p. 314, 316.
»	ALLMAN	1861	p. 170.
<i>Campanularia dichotoma</i>	GREENE	1861	p. 56, fig. 10 (f).
<i>Laomedea dichotoma</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 258.
»	KIRCHENPAUER	1862	p. 23, 53.
»	ALDER	1863	p. 237.
<i>Sertularia dichotoma</i>	HALLIER	1863	p. 280.
<i>Laomedea dichotoma</i>	ALDER	1864	p. 193.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 400, 414.
<i>Obelia dichotoma</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 372. (Ex. syn. p. p.).
<i>Campanularia dichotoma</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 412.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 89.
»	HINCKS	1866 (a)	p. 297.
<i>Laomedea dichotoma</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
»	ALDER	1867	p. 49.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 154.
<i>Obelia dichotoma</i>	HINCKS	1868	p. 156, pl. 28, fig. 1.
? <i>Laomedea dichotoma</i>	HELLER	1868	p. 44, 82.
<i>Laomedea dichotoma</i>	HERKLOTS	1870	p. 399, pl. 36, fig. 5.
»	ALLMAN	1871	p. 28, 36.
<i>Obelia dichotoma</i>	ALLMAN	1871	p. 127... 151, fig. 55.
<i>Campanularia dichotoma</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.

Dans les Matériaux II, p. 50, ligne 7, après : « JOHNSTON, 1847, p. 102 » enlever : « et 466 ». En outre, ligne 10, enlever : « *Laomedea dichotoma*

THOMAS, 1847, p. 472 ». Ces 2 citations, d'après HINCKS (1861 (c), p. 259) se rapportent à l'*Obelia longissima*.

Obelia flabellata Hincks.

Voir : Matériaux II, p. 95.

Syn. : *Obelia plana* (Sars).

Voir : Matériaux II, p. 140.

<i>Campanularia dichotoma</i>	OWEN	1849 p. 41, 42, pl. 1, fig. 2.
<i>Thaumantias plana</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 184, 186, 197.
<i>Eucope plana</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 351.
<i>Campanularia dichotoma</i>	AGASSIZ, A.	1865 p. 89.
<i>Laomedea dichotoma</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 82, 223, 226.
<i>Campanularia flabellata</i>	HINCKS	1866 (a) p. 297.
<i>Obelia flabellata</i>	HINCKS	1868 p. 157, pl. 29.

Obelia fusiformis (A. Agassiz).

<i>Laomedea divaricata</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 195.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 86.
<i>Eucope fusiformis</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 86, 90, 224, fig. 132-133.
? <i>Eucope divaricata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 91, 223.

Obelia gelatinosa (Pallas).

Syn. : *Campanularia gelatinosa* Fleming.

Syn. : *Laomedea gelatinosa* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 430 et II, p. 50.

<i>Campanularia gelatinosa</i>	BELLAMY	1839 p. 271.
<i>Campanularia</i> (<i>Laomedea</i>) <i>gelatinosa</i>	MAITLAND	1851 p. 45.

<i>Laomedea gelatinosa</i>	SARS	1851	p. 130, 138.
»	HINCKS	1852	p. 85.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 161, pl. 10, fig. 32.
»	GOSSE	1853 (a)	p. 148, 134.
»	SARS	1853	p. 379.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	STIMPSON	1854	p. 8.
»	GOSSE	1855	p. 24.
? <i>Laomedea flemingii</i>	GOSSE	1855	p. 24.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	TEMPLER	1855	p. 4576.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var. β	ALDER	1856 (b)	p. 440, pl. 16, fig. 3.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	HUXLEY	1856	p. 564.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	THOMPSON	1856	p. 458.
»	GREENE	1857	p. 249.
»	SARS	1857 (a)	p. 159.
»	ALDER	1858	p. 123, pl. 5, fig. 3.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	ALDER	1858	p. 97.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 155, 259.
»	KIRCHENPAUER	1862	p. 6, 16, 22, 23, 40... 57.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var. <i>cupressina</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 18, 53.
<i>Campanularia flemingii</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 19.
<i>Laomedea flemingii</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 22. Excl. syn.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	PACKARD	1863	p. 404.
<i>Sertularia gelatinosa</i>	ALLMAN	1864 (d)	p. 62.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 82, 86, 94, 226.
»	MC INTOSH	1866	p. 602.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 12.
<i>Obelia gelatinosa</i>	HINCKS	1868	p. 151, pl. 26, fig. 1 et p. 152, fig. 17.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	DÖNITZ	1869	p. 11.
<i>Obelia gelatinosa</i>	NORMAN	1869	p. 322.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.
»	METZGER	1871 (b)	p. 22.

Obelia geniculata (Linné).Syn. : *Laomedea geniculata* Lamouroux.Syn. : *Campanularia geniculata* Fleming.

Voir : Matériaux I, p. 430 et II, p. 51.

Syn. : *Laomedea lairii* Lamouroux.Syn. : *Campanularia lairii* M. Edwards.

Voir : Matériaux I, p. 431 et II, p. 53.

Syn. : ? *Laomedea gracilis* Pickering.

Voir : Matériaux II, p. 89.

Syn. : *Obelia diaphana* (L. Agassiz).

Voir : Matériaux II, p. 140.

Syn. : *Obelia lucifera* (Farbes).

Voir : Matériaux II, p. 140.

<i>Campanularia geniculata</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
<i>Laomedea geniculata</i>	COUCH	1843	p. 209.
<i>Sertularia cavolinii</i>	KÖLLIKER	1843	p. 81.
<i>Campanularia geniculata</i>	OWEN	1849	p. 12.
<i>Thaumantias lucifera</i>	PEACH	1850	p. 48.
<i>Laomedea geniculata</i>	COUCH	1851 (a)	p. 26, pl. B, fig. 1-9.
<i>Campanularia (Laomedea)</i>			
<i>geniculata</i>	MAITLAND	1851	p. 45.
? <i>Thaumantias lucifera</i>	PEACH	1851	p. 21, pl. 1, fig. 7-9.
<i>Laomedea geniculata</i>	SARS	1851	p. 130, 138.
" "	HINCKS	1852	p. 85.
" "	LANDSBOROUGH	1852	p. 96, 101, 160, pl. 10, fig. 31.
? <i>Sertularia geniculata</i>	CAVOLINI	1853	p. 117.
<i>Laomedea geniculata</i>	GOSSE	1853 (a)	p. 39, 82, 84, 252, 290, 434, pl. 4.
<i>Campanularia cavolinii</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 302, note.
<i>Campanularia geniculata</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 303.
<i>Sertularia cavolinii</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 302, note.
<i>Laomedea geniculata</i>	SARS	1853	p. 379.
<i>Campanularia cavolinii</i>	GEGENBAUR	1854	p. 217.

<i>Laomedea geniculata</i>	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 24, fig. 35.
»	LINDSTRÖM	1855 (a)	p. 73.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	GOSSE	1856	p. 24, 33.
<i>Campanularia geniculata</i>	HUXLEY	1856	p. 564.
<i>Laomedea geniculata</i>	THOMPSON	1856	p. 458.
»	GREENE	1857	p. 249.
<i>Thaumantias lucifera</i>	GREENE	1857	p. 175, 176, 243.
<i>Thaumantias diaphana</i>	MÖRCH	1857	p. 24.
<i>Laomedea geniculata</i>	ALDER	1858	p. 98, 122, 123.
»	LEWES	1858	p. 280.
»	WRIGHT	1858 (a)	p. 432, 453, pl. 23, fig. 15.
»	ALLMAN	1859 (b)	p. 137, 367, 368, note.
<i>Campanularia (Laomedea)</i> <i>geniculata</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 137.
<i>Thaumantias lucida</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 186.
? <i>Laomedea gracilis</i>	DANA	1859	p. 447.
<i>Laomedea geniculata</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 196.
<i>Eucope diaphana</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 322 et 352, pl. 34, fig. 1-9. (Ex. syn.).
<i>Eucope lucifera</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 351.
<i>Campanularia geniculata</i>	GREENE	1861	p. 90.
<i>Thaumantias lucifera</i>	GREENE	1861	p. 129.
<i>Laomedea geniculata</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 259.
»	WRIGHT	1861 (b)	p. 127.
»	KIRCHENPAUER	1862	p. 17, 23.
<i>Campanularia geniculata</i>	MEYER U. MÖBIUS	1862	p. 231.
<i>Laomedea geniculata</i>	ALDER	1863 (a)	p. 290.
<i>Sertularia geniculata</i>	HALLIER	1863	p. 280.
<i>Laomedea geniculata</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 280.
<i>Obelia (Laomedea) genicu-</i> <i>lata</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 401, fig. 18.
<i>Obelia geniculata</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
<i>Obelia diaphana</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 372.
<i>Laomedea geniculata</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 401, 414, 425.

<i>Campanularia geniculata</i>	KÖLLIKER	1864	p. 233.
<i>Eucope alternata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 83, 86, 224.
<i>Eucope diaphana</i>	AGASSIZ, A.	1865 (a)	p. 91, fig. 7-9.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 62, 82, 83, 86, 87, 90, 224-226, fig. 115-125.
? <i>Laomedea gracilis</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 223.
<i>Thaumantias lucida</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 85.
<i>Medusa fimbriata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 79, 85.
<i>Thaumantias diaphana</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 86.
<i>Laomedea geniculata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 68, 82, 85, 226.
<i>Eucope diaphana</i>	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 50, fig. 57-64.
<i>Campanularia geniculata</i>	HINCKS	1866 (a)	p. 297.
<i>Laomedea geniculata</i>	Mc INTOSH	1866	p. 602.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 12.
»	ALDER	1867	p. 49.
<i>Thaumantias lucida</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 52, 54.
<i>Campanularia geniculata</i>	MARCUSEN	1867	p. 358.
<i>Obelia geniculata</i>	NORMAN	1867	p. 199.
<i>Obelia (Laomedea) geniculata</i>	ALLMAN	1868	p. 77.
<i>Laomedea geniculata</i>	HELLER	1868	p. 45, 82.
<i>Obelia geniculata</i>	HINCKS	1868	p. 149, pl. 25, fig. 1.
<i>Thaumantias diaphana</i>	HINCKS	1868	p. 149, note.
<i>Campanularia geniculata</i>	DÖNITZ	1869	p. 10.
<i>Obelia geniculata</i>	HINCKS	1869	p. 231, 232.
»	NORMAN	1869	p. 322.
<i>Eucope lucifera</i>	NORMAN	1869	p. 326.
<i>Obelia geniculata</i>	ALLMAN	1871	p. 35... 168, fig. 10, 49, 59.
<i>Laomedea geniculata</i>	ALLMAN	1871	p. 36.
<i>Schizocladium ramosum</i>	ALLMAN	1871	p. 151, 152, fig. 61.
»	ALLMAN	1871 (a)	p. 18, pl. 2.
<i>Campanularia geniculata</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.
<i>Thaumantias lucida</i>	PANCERI	1871	p. 141.
<i>Campanularia geniculata</i>	SCHULZE	1871	p. 21.
<i>Laomedea geniculata</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 186.
<i>Obelia gymnophthalma</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 186.

Obelia longissima (Pallas).

Voir : Matériaux I, p. 457 et II, p. 95.

<i>Laomedea dichotoma</i>	THOMAS	1847	p. 472.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	KROHN	1851	p. 267, note.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	GEGENBAUR	1854	p. 163, 164, 169, 172, 173, 217.
<i>Laomedea dichotoma</i> ♂	ALDER	1856 (a)	p. 360.
» » »	ALDER	1856 (b)	p. 440, pl. 16, fig. 4.
<i>Laomedea longissima</i>	ALDER	1858	p. 99, 121, 127. La pl. 5, fig. 4 se rap- porte non pas à cette espèce, mais à <i>Cam- panularia johnstoni</i> .
<i>Campanularia</i>	LEWES	1858	p. 293 ss., pl. 4, fig. 1.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 351.
<i>Laomedea longissima</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 259.
<i>Laomedea gelatinosa</i> var. <i>ramulosa</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 18.
<i>Laomedea longissima</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 23, 40, 53, 57.
» »	ALDER	1863	p. 237, 238.
» »	ALDER	1863 (a)	p. 290.
» »	ALDER	1864	p. 193.
? <i>Campanularia</i> (<i>Laome- dea</i>) <i>dichotoma</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 412.
<i>Laomedea dichotoma</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 412, 414, 423.
<i>Sertularia longissima</i>	ALLMAN	1864 (d)	p. 62.
<i>Laomedea gelatinosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 82.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 82, 89.
<i>Laomedea longissima</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
» »	ALDER	1867	p. 49.
<i>Campanularia longissima</i> Pall.	SEC. BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 152.
<i>Campanularia gelatinosa</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 149, 151, 153, 154, pl. 14, fig. 11-14.
<i>Obelia longissima</i>	HINCKS	1868	p. 154, pl. 27.
» »	NORMAN	1869	p. 322.

<i>Laomedea gelatinosa</i>	HERKLOTS	1870	p. 400, 409, pl. 36, fig. 6 et pl. 42, fig. 1-11.
<i>Obelia longissima</i>	ALLMAN	1871	p. 169.

Obelia piriformis (A. Agassiz).

<i>Laomedea gelatinosa</i>	LEIDY	1855	p. 138.
<i>Eucope pyriformis</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 82, 86, 88-91, 224, 225, fig. 127-129.

Obelia plicata Hincks.

<i>Obelia plicata</i>	HINCKS	1868	p. 159, pl. 30, fig. 1.
»	NORMAN	1869	p. 256, 257, 322.

Gen. *Opercularella* Hincks 1868.

Voir : Matériaux II, p. 95.

Opercularella lacerata (Johnston).

Voir : Matériaux II, p. 95.

<i>Laomedea lacerata</i>	HINCKS	1852	p. 86, pl. 3, fig. 6.
<i>Campanularia lacerata</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 167.
»	THOMSON W.	1853 (b)	p. 443.
»	GOSSE	1855	p. 25.
<i>Laomedea lacerata</i>	GOSSE	1855	p. 24.
»	HINCKS	1855	p. 130.
»	ALDER	1856 (b)	p. 441.
<i>Campanularia lacerata</i>	WRIGHT	1856	p. 88.
<i>Laomedea lacerata</i>	ALDER	1858	p. 124.
»	WRIGHT	1858 (a)	p. 453, 454, pl. 24.
»	WRIGHT	1858 (b)	p. 352.
»	ALLMAN	1859 (b)	p. 367.
»	WRIGHT	1859 (b)	p. 174, note.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 354.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 291, 292, 293.
<i>Campanularia lacerata</i>	WRIGHT	1861 (b)	p. 125.
<i>Laomedea lacerata</i>	ALDER	1863	p. 238.
»	ALDER	1863 (a)	p. 290.

<i>Campanularia lacerata</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 279.
<i>Calycella lacerata</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 375.
<i>Calycella (Laomedea) lacerata</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 372.
<i>Laomedea lacerata</i>	PARFITT	1866 (a) p. 12.
<i>Calycella lacerata</i>	ALDER	1867 p. 50.
<i>Campanularia lacerata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 149, 159, 160, pl. 15, fig. 5-13.
<i>Campanularia proboscidea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 159.
<i>Laomedea lacerata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 160.
<i>Opercularella lacerata</i>	HINCKS	1868 p. 194, pl. 39, fig. 1.
<i>Calycella lacerata</i>	ALLMAN	1871 p. 48 ... 50, fig. 22.

Gen. *Ophiodes* Hincks 1866.

Ophiodes mirabilis Hincks.

<i>Ophiodes mirabilis</i>	HINCKS	1866 (b) p. 422, pl. 14.
»	HINCKS	1868 p. 231, pl. 45, fig. 2.
»	ALLMAN	1871 p. 158.

Gen. *Orthopyxis* L. Agassiz 1862.

Ce genre a été établi par L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 397 et 355) pour y placer son *O. poterium* (= *Campanularia caliculata*), mais il n'a pas été adopté.

Gen. *Parypha* L. Agassiz 1862.

L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 342) avait divisé la famille des *Tubularidae* en 4 genres : *Tubularia*, *Thamnocnidia*, *Parypha* et *Ectopleura*, mais il n'en a donné aucune diagnose. Les genres *Thamnocnidia* et *Parypha* n'ont pas été adoptés, les espèces qu'ils renfermaient pouvant très bien prendre place dans le genre *Tubularia*.

Gen. *Pasythea* Lamouroux 1812.

Voir : Matériaux I, p. 458 et II, p. 96.

Pasythea gracilis Dana.

Voir : Matériaux II, p. 96.

<i>Pasythea gracilis</i>	DANA	1859 p. 146.
--------------------------	------	--------------

Pasythea hexodon Busk.

<i>Pasythea hexodon</i>	BUSK	1852 p. 387, 395.
-------------------------	------	-------------------

Pasythea quadridentata (Ellis et Solander).

Voir : Matériaux I, p. 458 et II, p. 96.

<i>Pasythea quadridentata</i>	BUSK	1852 p. 395.
-------------------------------	------	--------------

Pasythea quadridentata (Ell. et Sol.) var. *balei* Billard.

Syn. : *Dynamena obliqua* Lamouroux.

Syn. : *Sertularia obliqua* M. Edwards.

Voir : Matériaux I, p. 440 et II, p. 68.

<i>Dynamena obliqua</i>	KIRCHENPAUER	1864 p. 8, 11.
-------------------------	--------------	----------------

Gen. *Pennaria* Oken 1815.

Voir : Matériaux I, p. 458 et II, p. 96.

Pennaria disticha Goldfuss.

Voir : Matériaux I, p. 459 et II, p. 96.

<i>Pennaria carolinii</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 302 (note), 303.
»	GEGENBAUR	1854 p. 217.
»	SARS	1857 (a) p. 156.
»	MC CRADY	1859 (b) p. 216.
<i>Sertularia pennaria</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 152, 154.

<i>Pennaria distycha</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 344.
<i>Pennaria disticha</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 344.
<i>Pennaria distycha</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 361.
» »	ALLMAN	1864 (a) p. 411.
<i>Pennaria carolinii</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 387.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 17, 50.
» »	ALLMAN	1871 p. 148.
» »	ALLMAN	1871 p. 364, fig. 80.

Dans les Matériaux I, p. 459, il faut enlever, des synonymes de *Pennaria disticha*, les 2 citations relatives à la *Sertularia pennaria* de LINNÉ.

Pennaria gibbosa L. Agassiz.

<i>Pennaria gibbosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 3, p. 15, fig. 1-2, vol. 4, p. 278 et 344.
» »	ALLMAN	1864 (a) p. 381, 382.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 361.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 186, 223.
» »	ALLMAN	1871 p. 366.

Gen. *Perigonimus* Sars 1846.

Voir : Matériaux II, p. 97.

Perigonimus (?) *bitentaculatus* (Wright).

<i>Atractylis bitentaculata</i>	WRIGHT	1867 p. 45, pl. 1, fig. 5.
<i>Perigonimus</i> (?) <i>bitentaculatus</i>	HINCKS	1868 p. 98, fig. 9.
<i>Atractylis bitentaculata</i>	ALLMAN	1871 p. 329.

Perigonimus (?) *coccineus* (Wright).

<i>Atractylis coccinea</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 130.
» »	WRIGHT	1861 (c) p. 150.
» »	WRIGHT	1863 (b) p. 251.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 363.

<i>Perigonimus</i> (?) <i>coccineus</i>	HINCKS	1868	p. 97.
»	»	HINCKS	1871 (b) p. 77.

Perigonimus (?) *linearis* (Alder).

<i>Atractylis linearis</i>	ALDER	1862	p. 313, pl. 14, fig. 1-3.
»	»	ALDER	1863 p. 239, pl. 10, fig. 1-3.
<i>Perigonimus</i> (?) <i>linearis</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 365.
»	»	HINCKS	1868 p. 96, pl. 17, fig. 3.
»	»	ALLMAN	1871 p. 328.

Perigonimus (?) *miniatus* (Wright).

<i>Atractylis miniata</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 351.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 363.
<i>Perigonimus miniatus</i>	HINCKS	1868	p. 97.

Perigonimus minutus Allman.

<i>Perigonimus minutus</i>	ALLMAN	1863 (b)	p. 11.
»	»	ALDER	1864 p. 191.
? <i>Atractylis minutus</i>	ALDER	1864	p. 192.
<i>Perigonimus minutus</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 365.
? <i>Atractylis minutus</i>	ALDER	1867	p. 48.
<i>Perigonimus minutus</i>	HINCKS	1868	p. 90 (Excl. syn.).
»	NORMAN	1869	p. 256, 257, 323.
»	ALLMAN	1871	p. 169, 324, pl. 11, fig. 4-6.

Perigonimus muscoides Sars.

Voir : Matériaux II, p. 97.

<i>Perigonimus muscoides</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 302.
»	SARS	1853	p. 387.
»	GEGENBAUR	1854	p. 166, 193, 216.
»	SARS	1857 (a)	p. 151.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 365.
»	ALLMAN	1871	p. 322.

Perigonimus palliatus (Wright).

<i>Atractylis palliata</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 129, pl. 4, fig. 6 et 7.
» »	WRIGHT	1863 (b) p. 250, pl. 11, fig. 6-8.
<i>Perigonimus palliatus</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 365.
<i>Perigonimus (Atractylis)</i> <i>palliatus</i>	ALLMAN	1864 (d) p. 57.
<i>Atractylis palliata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 129.
<i>Perigonimus palliatus</i>	HINCKS	1868 p. 93, pl. 17, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871 p. 325.

Perigonimus (?) quadritentaculatus (Wright).

<i>Atractylis quadritentaculata</i>	WRIGHT	1867 p. 45, pl. 1, fig. 6.
<i>Perigonimus (?) quadriten-</i> <i>taculatus</i>	HINCKS	1868 p. 98, 99, fig. 10.
<i>Atractylis quadritentaculata</i>	ALLMAN	1871 p. 329.

Perigonimus repens (Wright).

<i>Eudendrium pusillum</i>	WRIGHT	1857 (b) p. 84. 90, pl. 2, fig. 8-9.
<i>Eudendrium repens</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 448.
<i>Atractylis repens</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 450, pl. 22, fig. 4-5.
» »	WRIGHT	1861 (b) p. 130.
» »	ALDER	1862 p. 313.
» »	ALDER	1863 p. 230.
» »	ALLMAN	1863 (b) p. 11.
<i>Eudendrium pusillum</i>	ALLMAN	1863 (b) p. 11.
<i>Atractylis repens</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 250, 350.
<i>Perigonimus repens</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 365.
<i>Perigonimus pusillus</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 365.
<i>Atractylis repens</i>	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 91.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 124.
<i>Eudendrium pusillum</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 129.
<i>Perigonimus repens</i>	HINCKS	1868 p. 90, pl. 16, fig. 2.
» »	NORMAN	1869 p. 324.

<i>Perigonimus repens</i>	ALLMAN	1871 p. 323.
»	HINCKS	1871 (b) p. 77.

D'après HARTLAUB (1895), *Tiara pileata* est la forme Méduse de *Perigonimus repens*.

Perigonimus serpens Allman.

<i>Perigonimus serpens</i>	ALLMAN	1863 (b) p. 10.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 365.
»	HINCKS	1868 p. 95, pl. 16, fig. 3.
»	ALLMAN	1871 p. 158, 169, 327, pl. 11, fig. 7-9.
»	HINCKS	1871 (b) p. 77.

Perigonimus sessilis (Wright).

<i>Eudendrium sessile</i>	WRIGHT	1857 (b) pl. 3, fig. 16-17.
»	WRIGHT	1858 (a) p. 448.
<i>Atractylis sessilis</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 450.
<i>Perigonimus sessilis</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 365.
?	NORMAN	1867 p. 199.
»	HINCKS	1868 p. 93, pl. 17, fig. 1.
»	ALLMAN	1871 p. 325.

Perigonimus vestitus Allman.

<i>Perigonimus vestitus</i>	ALLMAN	1864 (d) p. 57.
»	HINCKS	1868 p. 94.
»	ALLMAN	1871 p. 326, pl. 11, fig. 1-3.

Gen. *Platypyxis* L. Agassiz 1862.

Le genre *Platypyxis* de L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 306 et 354) n'a pas été adopté. Il ne renfermait qu'une espèce, *P. cylindrica* qui est synonyme de *Clytia noliformis*.

Gen. *Plumularia* Lamarck 1816.

Voir : Matériaux I, p. 459 et II, p. 97.

Plumularia bifrons (Heller).

Anisocalyx bifrons HELLER 1868 p. 43, 82, pl. 2, fig. 6.

Plumularia campanula Busk.

Plumularia campanula BUSK 1852 p. 388, 401.

Plumularia catharina Johnston.

Voir : Matériaux II, p. 97.

<i>Plumularia catherina</i>	FORBES	1851	p. 245.
»	BUSK	1852	p. 401.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 151, pl. 9, fig. 27.
»	SARS	1853	p. 387.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 24.
<i>Plumularia catherina</i>	ALDER	1858	p. 96, 99, 120.
<i>Plumularia catharina</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 358.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 258.
<i>Plumularia catherina</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 154.
»	ALDER	1863 (a)	p. 290.
<i>Plumularia catharina</i>	ALDER	1864	p. 193.
?	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 224.
<i>Halicornaria (Plumularia) catherina</i>	HINCKS	1865 (b)	p. 409, note.
<i>Plumularia catharina</i>	MC INTOSH	1866	p. 602.
»	ALDER	1867	p. 49.
»	HINCKS	1868	p. 299, pl. 66, fig. 2 et p. 301, fig. 35.
»	NORMAN	1869	p. 321.
»	ALLMAN	1871	p. 169.

Plumularia diaphana Heller.

Anisocalyx diaphanus HELLER 1868 p. 42, 82, pl. 2, fig. 5.

REV. SUISSE DE ZOOL. T. 18. 1910.

Plumularia disticha Heller.

<i>Heteropyxis disticha</i>	HELLER	1868	p. 44, 82, pl. 2, fig. 9-10.
-----------------------------	--------	------	------------------------------

Plumularia echinulata Lamarck.

Voir : Matériaux I, p. 459 et II, p. 98.

<i>Plumularia echinulata</i>	GOSSE	1855	p. 24.
»	»	ALDER	1858 p. 98, 119.
»	»	HINCKS	1859 (b) p. 128.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 257, pl. 7, fig. 5-6.
<i>Halicorneria echinulata</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
<i>Plumularia echinulata</i>	HINCKS	1868	p. 302, pl. 65, fig. 2.

Plumularia frutescens (Ellis et Solander).

Voir : Matériaux I, p. 460 et II, p. 98.

Sertularia (Plumularia)

<i>frutescens</i>	MAITLAND	1851	p. 55.
<i>Plumularia frutescens</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 156, pl. 9, fig. 29.
»	»	SARS	1853 p. 387.
»	»	IRVINE	1854 p. 245.
»	»	GOSSE	1855 p. 24.
»	»	THOMPSON	1856 p. 458.
»	»	ALDER	1858 p. 96, 99, 120.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 358.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 258.
»	»	NORMAN	1862 p. 152.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 290.
»	»	ALDER	1867 p. 49.
»	»	NORMAN	1867 p. 200.
»	»	HELLER	1868 p. 40, 82.
»	»	HINCKS	1868 p. 307, pl. 67, fig. 3 et p. XVIII, fig. 7.
»	»	HINCKS	1869 pl. 46, fig. 4.
»	»	NORMAN	1869 p. 321.
»	»	HERKLOTS	1870 p. 402, pl. 36, fig. 1.
»	»	ALLMAN	1871 p. 169.

Plumularia gaimardi (Lamouroux).

Matériaux II, p. 99.

Voir : *Plumularia setacea* var. *gaimardi*.*Plumularia glutinosa* (Lamouroux).

<i>Aglaophenia glutinosa</i>	LAMOUREUX	1816	p. 171.
»	»	LAMOUREUX	1824 (c) p. 18.
<i>Plumularia glutinosa</i>	BLAINVILLE	1830	p. 443.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 478.
<i>Plumularia gelatinosa</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 167.

Nous avons considéré l'*Aglaophenia glutinosa* de LAMOUREUX comme étant une espèce indéterminable. Mais BILLARD, qui en a retrouvé le type, a reconnu qu'il s'agissait d'une bonne espèce rentrant dans le genre *Plumularia* et probablement synonyme de l'*Heteroplon pluma* de ALLMAN (1883).

Plumularia halecioides Alder.

<i>Plumularia halecioides</i>	ALDER	1859	p. 353, pl. 12.
»	»	ALDER	1860 p. 74, note.
»	»	ALDER	1863 p. 237.
»	»	HINCKS	1868 p. 306, pl. 67, fig. 2.
<i>Plumularia halecioides</i>	NORMAN	1869	p. 321.

Plumularia helleri Hincks.

Voir : Matériaux II, p. 99.

<i>Anisocalyx setacens</i>	HELLER	1868	p. 41, 43, 82.
----------------------------	--------	------	----------------

Plumularia hians Busk.

<i>Plumularia hians</i>	BUSK	1852	p. 388, 396.
-------------------------	------	------	--------------

Plumularia longicornis Busk.

<i>Plumularia longicornis</i>	BUSK	1852	p. 388, 399.
-------------------------------	------	------	--------------

Plumularia obliqua (Johnston).

Voir : Matériaux II, p. 99.

<i>Laomedeia obliqua</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 162, pl. 10, fig. 33.
»	GOSSE	1853 (a)	p. 434.
»	GOSSE	1855	p. 24.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 358.
<i>Plumularia obliqua</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 258.
<i>Laomedeia obliqua</i>	COUCH	1864	p. 38.
<i>Halicorneria obliqua</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
<i>Plumularia obliqua</i>	HINCKS	1868	p. 304, pl. 67, fig. 1 et p. 305, fig. 36.
»	NORMAN	1869	p. 262.
»	ALLMAN	1871	p. 157, 160.

Le nom de *Laomedeia obliqua* a été employé pour la première fois par THOMPSON en 1844. Mais cet auteur ne donne aucune description de l'animal auquel il l'attribue, de sorte que l'on ne sait pas s'il s'agit de la même espèce que celle dont JOHNSTON (1847) a donné une bonne description accompagnée d'une figure. C'est donc le nom de JOHNSTON qui doit figurer comme nom d'auteur.

Plumularia pinnata (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 460 et II, p. 100.

Sertularia (*Plumularia*)

<i>pinnata</i>	MAITLAND	1851	p. 53.
<i>Plumularia pinnata</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 147, pl. 8, fig. 25.
»	GOSSE	1853 (a)	p. 287, 434, pl. 17.
»	SARS	1853	p. 387.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 24, fig. 34.
»	GOSSE	1856	p. 194.
»	THOMPSON	1856	p. 457.
»	ALDER	1858	p. 99, 118-120.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 358.
»	GREENE	1861	p. 44.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 257.

<i>Plumularia pinnata</i>	ALLMAN	1862	p. 61, 64.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 290.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
»	»	ALLMAN	1864 (a) p. 368, 387.
<i>Halicorneria pinnata</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
<i>Plumularia pinnata</i>	ALDER	1867	p. 46, 49.
<i>Plumularia pinnata</i>	NORMAN	1867	p. 200.
<i>Anisocalyx pinnatus</i>	HELLER	1868	p. 43.
<i>Plumularia pinnata</i>	HINCKS	1868	p. 295, pl. 65, fig. 4.
»	»	NORMAN	1869 p. 321.
»	»	HERKLOTS	1870 p. 401, pl. 37, fig. 7.
»	»	ALLMAN	1871 p. 45 ... 169.
»	»	METZGER	1871 (a) p. 35.

Plumularia pinnatifrons (Heller).

<i>Anisocalyx pinnatifrons</i>	HELLER	1868	p. 43, 82, pl. 2, fig. 7-8.
--------------------------------	--------	------	-----------------------------

Plumularia ramosa Busk.

<i>Plumularia ramosa</i>	BUSK	1852	p. 388, 398.
--------------------------	------	------	--------------

Plumularia ramulifera Allman.

<i>Plumularia ramulifera</i>	ALLMAN	1871	p. 170.
------------------------------	--------	------	---------

Plumularia scabra Lamarck.

<i>Plumularia scabra</i>	LAMARCK	1816	vol. 2, p. 127.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 443.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 478.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 164.
<i>Plumularia effusa</i>	BUSK	1852	p. 388, 400.

Nous avons considéré à tort (d'après KIRCHENPAUER) la *Plumularia scabra* de LAMARCK comme synonyme d'*Aglaophenia urens*. Mais BILLARD (1907) a retrouvé les échantillons-types de la collection LAMARCK et a reconnu qu'ils « correspondent absolument au *Plumularia effusa* Busk ; ce dernier nom doit donc tomber en synonymie. »

Plumularia secundaria (Gmelin).

Voir : Matériaux I, p. 461 et II, p. 100.

<i>Anisocalyx secundarius</i>	HELLER	1868	p. 12, 82.
<i>Sertularia secundaria</i> Cav.	HINCKS	1868	p. 301 (Syn.?)

Plumularia setacea (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 461 et II, p. 101.

<i>Plumularia setacea</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
»	»	COUCH	1843 p. 208, 209.
»	»	BUSK	1851 p. 119.
<i>Sertularia (Plumularia)</i>			
<i>setacea</i>	MAITLAND	1851	p. 53.
<i>Plumularia setacea</i>	GOSSE	1853 (a)	p. 143, 311, 434, pl. 20, fig. 6-7.
<i>Plumularia setacea</i>	IRVINE	1854	p. 245.
<i>Plumularia setacea</i>	GOSSE	1855	p. 24.
»	»	TEMPLER	1855 p. 4576.
»	»	THOMPSON	1856 p. 457.
»	»	SARS	1857 (a) p. 164.
»	»	ALDER	1858 p. 98, 119, 120.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 358.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 257.
»	»	ALLMAN	1863 (b) p. 11.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
<i>Halicorneria setacea</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
<i>Plumularia setacea</i>	ALDER	1867	p. 79.
»	»	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 187.
»	»	NORMAN	1867 p. 200.
»	»	REICHERT	1867 p. 203, 268.
»	»	HINCKS	1868 p. 296, pl. 66, fig. 1, p. 299, fig. 34 et p. 325, fig. 45.
»	»	DÖNITZ	1869 p. 10.
»	»	NORMAN	1869 p. 321.
»	»	HINCKS	1869 p. 231.

<i>Plumularia setacea</i>	HERKLOTS	1870	p. 401, pl. 36, fig. 2.
»	»	ALLMAN	1871 p. 169.
»	»	HINCKS	1871 (b) p. 77.

Plumularia setacea (L.) var. *gaimardi* Billard.

Syn. : *Plumularia gaimardi* Lamouroux.

Voir : Matériaux II, p. 99.

L'échantillon type de l'*Aglaophenia gaimardi* de LAMOUROUX a été retrouvé et étudié par BILLARD (1909) qui a reconnu qu'il s'agissait d'une variété de *Plumularia setacea*, à laquelle il donne le nom de var. *gaimardi*.

Plumularia similis Hincks.

? <i>Plumularia setacea</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 150, pl. 9, fig. 26.
<i>Plumularia similis</i>	HINCKS	1859 (b)	p. 128.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 155, 257, pl. 7, fig. 3-4.
<i>Halicorneria similis</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 11.
<i>Plumularia similis</i>	HINCKS	1868	p. 303, pl. 65, fig. 3.

Plumularia sulcata Lamarck.

<i>Plumularia sulcata</i>	LAMARCK	1816	vol. 2, p. 128.
»	»	BLAINVILLE	1830 p. 443.
»	»	BLAINVILLE	1834 p. 478.
»	»	EDWARDS, M.	1836 p. 164.

Nous avons considéré cette espèce comme étant indéterminable. Mais BILLIARD (1907) en a retrouvé le type et l'a décrit à nouveau. Il convient donc de la rétablir.

Gen. *Podocoryne* Sars 1846.

Voir : Matériaux II, p. 102.

Podocoryne aculeata (Wagner).

Voir : Matériaux II, p. 103.

<i>Coryne vulgaris</i>	OWEN	1849	p. 11.
<i>Coryne aculeata</i>	SCHULTZE	1850	p. 56.

? <i>Coryne echinata</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 302.
<i>Coryne vulgaris</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 304.
<i>Coryne aculeata</i>	LEUCKART	1853	p. 85.
» »	GEGENBAUR	1854	p. 172, 216.
<i>Coryne vulgaris</i>	GEGENBAUR	1854	p. 185, 216.
<i>Podocoryne aculeata</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 353.
<i>Coryne aculeata</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 387, 411.
<i>Coryna aculeata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 50, 122, 132.
<i>Coryna (Hydractinia) am- bata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 17.
<i>Coryne (Hydractinia) au- leata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 49.
<i>Hydractinia aculeata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 132.
<i>Coryne aculeata</i>	ALLMAN	1871	p. 147.
<i>Podocoryne aculeata</i>	ALLMAN	1871	p. 352.

Podocoryne areolata Alder.

<i>Hydractinia areolata</i>	ALDER	1862	p. 311, pl. 13, fig. 1-4.
» »	ALDER	1863	p. 225, pl. 9, fig. 1-4.
» »	ALDER	1864	p. 191, 192.
<i>Rhizocline areolata</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 355.
<i>Hydractinia areolata</i>	ALDER	1867	p. 48.
<i>Podocoryne areolata</i>	HINCKS	1868	p. 32, pl. 6, fig. 1, p. 135, fig. 13.
<i>Rhizocline areolata</i>	NORMAN	1868	p. 440.
<i>Podocoryne areolata</i>	NORMAN	1869	p. 323.
» »	ALLMAN	1871	p. 353.

Podocoryne carnea Sars.

Voir : Matériaux II, p. 103.

<i>Podocoryne carnea</i>	KROHN	1851	p. 263.
<i>Podocoryna carnea</i>	KROHN	1851	p. 263-268.
<i>Hydractinia carnea</i>	SARS	1851	p. 131, 134.
<i>Hydractinia carnea (Podo- coryna)</i>	SARS	1851	p. 131, 134.
? <i>Dismorphosa conchicola</i>	CHIAIE, D.	1853	p. 322 (Excl. syn.!).
<i>Podocoryne carnea</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 302, 304.

<i>Hydractinia carnea</i>	SARS	1853	p. 386.
<i>Podocoryna carnea</i> .	GEGENBAUR	1854	p. 172, 173, 183, 184, 198-200, 216.
<i>Hydractinia echinata</i>	LOVÉN	1857	p. 305, pl. 4.
<i>Podocoryna tubulariae</i>	SARS	1857 (a)	p. 145 (note).
<i>Podocoryna tubularia</i>	SARS	1857 (b)	p. 193.
<i>Podocoryna carnea</i>	SARS	1857 (a)	p. 144, 147, 149.
»	SARS	1857 (b)	p. 193, 194.
<i>Podocoryne carnea</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 50.
<i>Podocoryne albida</i>	ALLMAN	1859 (b)	p. 50.
<i>Podocoryna carnea</i>	SARS	1860	p. 348. (Trad. allem.).
<i>Podocoryna tubulariae</i>	SARS	1860	p. 348. (Trad. allem.).
<i>Podocoryne carnea</i>	CLAPARÈDE	1860	p. 104.
<i>Podocoryne carnea</i>	ALDER	1862	p. 312.
»	ALDER	1863	p. 226.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 353.
»	HINCKS	1865 (a)	p. 99.
»	HINCKS	1865 (b)	p. 415, pl. 1, fig. 3 et pl. 2, fig. 11-14.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 163.
<i>Podocoryna carnea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 50, 52, 132, 134.
<i>Podocoryna (Hydractinia)</i> <i>carnea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 48.
<i>Podocoryna tubulariae</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 132.
<i>Hydractinia carnea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 132, 135.
<i>Hydractinia cornea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18.
? <i>Podocoryna ramea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 45.
<i>Podocoryne carnea</i>	HINCKS	1868	p. 29, pl. 5.
»	ALLMAN	1871	p. 63, 127, 349, pl. 16, fig. 1-9.
»	HINCKS	1871 (b)	p. 74.

Dans les Matériaux II, p. 103, il faut faire la correction suivante :

Ligne 25, après l'indication « *Podocoryna carnea* SARS, 1846, p. 4, pl. 1, fig. 7-18 » il faut supprimer la suite, soit « pl. 2, fig. 5-11 » car cette figure, d'après ALLMAN (1871, p. 103), se rapporte non pas à la *Podocoryne carnea*, mais à une autre espèce rentrant dans un genre nouveau, la *Stylactis sarsi*.

Podocoryne proboscidea Hincks.

<i>Podocoryne proboscidea</i>	HINCKS	1868	p. 317, pl. 23, fig. 4.
»	ALLMAN	1871	p. 351.

Gen. *Protohydra* Greeff 1869.*Protohydra leuckarti* Greeff.

<i>Protohydra leuckarti</i>	GREEFF	1869 (b)	p. 37, ss., pl. 4-5.
-----------------------------	--------	----------	----------------------

Gen. *Reticularia* Thompson 1853.

Le nom de *Reticularia* proposé par THOMPSON (1853 (b), p. 443), ayant été déjà employé, HINCKS (1868) l'a remplacé par celui de *Filellum*.

Gen. *Rhizocline* Allman 1864.

ALLMAN (1864 (c), p. 355) avait établi ce genre pour y placer l'*Hydractinia areolata* d'ALDER. Mais il a reconnu plus tard (1871, p. 353) que *Rhizocline* devait tomber en synonymie de *Podocoryne*.

Gen. *Rhizogeton* L. Agassiz 1862.*Rhizogeton fusiformis* L. Agassiz.

<i>Rhizogeton fusiformis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 224 et 347, pl. 20, fig. 17-23.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 364.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 170, 225.
»	CLARK	1865 (a)	p. 342.
»	CLARK	1865 (b)	p. 73, fig. 38-39.
»	HINCKS	1865 (b)	p. 445, pl. 2, fig. 10.
»	ALLMAN	1871	p. 40... 250.

Gen. *Schizocladium* Allman 1871.

ALLMAN (1871 (a), p. 18) avait créé ce genre pour une Campanularide se reproduisant par scissiparité. Mais ce mode de reproduction a été observé chez d'autres Hydroïdes par plusieurs auteurs et, entre autres, par HARTLAUB qui considère (1901, p. 37) le *Schizocladium ramosum* d'ALLMAN comme synonyme d'*Obelia geniculata*. Le genre *Schizocladium* tombe donc en synonymie.

Gen. *Sertularella* Gray 1848.

Voir : Matériaux II, p. 104.

Sertularella arbuscula (Lamouroux).

Syn. : *Sertularia arbuscula* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 465 et II, p. 110.

? *Sertularia arbuscula* BUSK 1851 p. 118.

Sertularella crassicaulis (Heller).

Sertularia crassicaulis HELLER 1868 p. 34, 81, pl. 1, fig. 3-4.

Sertularella distans (Lamouroux).

Syn. : *Sertularia distans* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 469 et II, p. 111.

Sertularella divaricata (Busk).

Sertularia divaricata BUSK 1852 p. 386, 387, 388.

Sertularella divaricata ALLMAN 1871 p. 157.

BILLARD (1910) croit que cette espèce est synonyme de *Sertularella johnstoni*.

Sertularella fusiformis Hincks.

<i>Sertularia fusiformis</i>	HINCKS	1861 (c) p. 253, pl. 6, fig. 7-8.
»	PARFITT	1866 (a) p. 7.
»	NORMAN	1867 p. 196, 200.
<i>Sertularella fusiformis</i>	HINCKS	1868 p. 243, pl. 47, fig. 4, et p. 234, fig. 28.

Sertularella gaudichaudi (Lamouroux).

Voir : Matériaux II, p. 105.

Syn. : *Sertularella picta* (Meyen).

Voir : Matériaux II, p. 105.

<i>Sertularia gaudichaudi</i>	BUSK	1851 p. 118.
<i>Amphitrocha picta</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 356.

Sertularella gayi (Lamouroux).

Voir : Matériaux I, p. 472, II, p. 105.

<i>Sertularia gayi</i>	BUSK	1852 p. 389.
<i>Sertularia polyzonias</i> var. β	ALDER	1858 p. 111.
<i>Sertularia gayi</i>	HINCKS	1861 (c) p. 155, 252.
»	NORMAN	1862 p. 152.
»	ALDER	1863 p. 236.
»	PARFITT	1866 (a) p. 7.
»	ALDER	1867 p. 49.
<i>Sertularella gayi</i>	HINCKS	1868 p. 237, pl. 46, fig. 2 et p. 238, fig. 29.
»	NORMAN	1869 p. 321.
»	ALLMAN	1871 p. 157... 169.

Sertularella greenei (Murray).

<i>Sertularia tricuspidata</i>	GREENE	1860 p. 431.
»	MURRAY	1860 (a) p. 250, pl. 11, fig. 1.
<i>Sertularia greenei</i>	MURRAY	1860 (b) p. 504.
<i>Sertularia tricuspidata</i>	KIRCHENPAUER	1864 p. 9, 14.
<i>Cotulina greenei</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 147, 222, 223.

Sertularella johnstoni (Gray).

Voir : Matériaux II, p. 105.

<i>Sertularia Johnstoni</i>	ALDER	1856 (a)	p. 356.
»	»	ALDER	1858 p. 112.

Sertularella milneana (d'Orbigny).

Voir : Matériaux II, p. 105.

Sertularella picta (Meyen).

Voir : Matériaux II, p. 105.

BILLARD (1909) a montré que cette espèce était synonyme de *Sertularella gaudichaudi* (Lamouroux). KIRCHENPAUER (1884) et HARTLAUB (1901) avaient déjà supposé que ces deux espèces devaient être identiques. Le nom de *S. gaudichaudi* a donc le droit de priorité.

Sertularella polyzonias (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 473 et II, p. 106.

<i>Sertularia polyzonias</i>	TURTON et KINGSTON	1830	(pas de pagination).
»	BELLAMY	1839	p. 270.
»	BUSK	1851	p. 118.
»	COUCH	1851 (a)	p. 28, pl. B, fig. 10-11.
»	FORBES	1851	p. 245.
»	MAITLAND	1851	p. 47.
»	SARS	1851	p. 131, 137.
»	SARS	1851	p. 379.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 96, 123, pl. 4, fig. 10.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	STIMPSON	1854	p. 9.
»	GOSSE	1855	p. 22.
»	TEMPLER	1855	p. 4575.
»	ALDER	1856 (a)	p. 356, 357.
»	GOSSE	1856	p. 87.
»	THOMPSON	1856	p. 453.
»	MÖRCH	1857	p. 25.

<i>Sertularia polyzonias</i>	SARS	1857 (a) p. 163.
» »	ALDER	1858 p. 99, 111, 112, 113.
» »	JOHNSON	1858 p. 129.
<i>Sertularia ellisii</i>	JOHNSON	1858 p. 129.
<i>Sertularia polyzonias</i>	ALLMAN	1859 (c) p. 307, 316.
<i>Cotulina polyzonias</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 356.
<i>Sertularia ellisii</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 356.
<i>Sertularia polyzonias</i>	GREENE	1861 p. 95.
» »	HINCKS	1861 (c) p. 252.
» »	ALDER	1863 p. 237.
<i>Sertularia polyzonius</i>	ALDER	1863 (a) p. 289.
» »	FULLER	1863 p. 129.
» »	PACKARD	1863 p. 422.
» »	ALDER	1864 p. 192.
» »	ALLMAN	1864 (a) p. 372, 383, 385.
» »	GRUBE	1864 p. 106.
» »	KIRCHENPAUER	1864 p. 10.
<i>Cotulina polyzonias</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 146, 225, 226.
<i>Sertularia polyzonias</i>	PARFITT	1866 (a) p. 7.
» »	ALDER	1867 p. 49.
» »	NORMAN	1867 p. 200.
» »	HELLER	1868 p. 33, 34.
<i>Sertularia ellisii</i>	HELLER	1868 p. 33, 81.
<i>Sertularella polyzonias</i>	HINCKS	1868 p. 235, pl. 41, fig. 1.
» »	NORMAN	1869 p. 321.
<i>Sertularia polyzonias</i>	HERKLOTS	1870 p. 404, pl. 39, fig. 9.
» »	ALLMAN	1871 p. 48 ... 160.
<i>Sertularella polyzonias</i>	ALLMAN	1871 p. 157 ... 173.

Sertularella rugosa (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 475 et II, p. 107.

<i>Sertularia rugosa</i>	MAITLAND	1851 p. 47.
» »	SARS	1851 p. 130, 137.
» »	LANDSBOROUGH	1852 p. 124, pl. 4, fig. 11.
» »	SARS	1853 p. 379.
» »	IRVINE	1854 p. 245.
» »	STIMPSON	1854 p. 9.

<i>Sertularia rugosa</i>	GOSSE	1855	p. 22.
»	»	TEMPLER	1855 p. 4575.
»	»	ALDER	1856 (a) p. 357.
»	»	THOMPSON	1856 p. 453.
»	»	MÖRCH	1857 p. 25.
»	»	ALDER	1858 p. 98, 113.
<i>Amphitrocha cincta</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 356.
<i>Amphitrocha rugosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 356.
<i>Sertularia rugosa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 253.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 289.
»	»	ALDER	1864 p. 193.
»	»	KIRCHENPAUER	1864 p. 10.
<i>Amphitrocha rugosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 146, 225, 226.
<i>Sertularia rugosa</i>	MC INTOSH	1866	p. 602.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 8.
»	»	ALDER	1867 p. 49.
»	»	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 183, pl. 17, fig. 1-8.
<i>Sertularella rugosa</i>	HINCKS	1868	p. 241, pl. 47, fig. 2.
<i>Sertularia rugosa</i>	DÖNITZ	1869	p. 10.
<i>Sertularella rugosa</i>	NORMAN	1869	p. 321.
<i>Sertularia rugosa</i>	HERKLÖTS	1870	p. 405, pl. 39, fig. 8.
<i>Sertularella rugosa</i>	ALLMAN	1871	p. 168.

Sertularella tenella (Alder).

Voir : Matériaux II, p. 108.

<i>Sertularia tenella</i>	ALDER	1856 (a)	p. 357, pl. 13, fig. 3-6.
»	»	ALDER	1858 p. 111, 113, pl. 4, fig. 3-6.
»	»	GREENE	1861 p. 90.
»	»	HINCKS	1861 (c) p. 253.
»	»	NORMAN	1862 p. 152.
»	»	ALDER	1863 (a) p. 289.
»	»	ALDER	1864 p. 192.
»	»	KIRCHENPAUER	1864 p. 10.
»	»	PARFITT	1866 (a) p. 7.
»	»	ALDER	1867 p. 49.
»	»	NORMAN	1867 p. 200.

<i>Sertularella tenella</i>	HINCKS	1868	p. 242, pl. 47, fig. 3 et p. 234, fig. 28.
»	NORMAN	1869	p. 321.

Sertularella tricuspidata (Alder).

Voir : Matériaux I, p. 477 et II, p. 108.

<i>Sertularia polyzonias</i>	[BUSK]	1855	p. 256, pl. 2, fig. 5-6.
<i>Sertularia tricuspidata</i>	ALDER	1856 (a)	p. 356, pl. 13, fig. 1-2.
»	ALDER	1858	p. 96, 99, 111, pl. 4, fig. 1-2.
»	JOHNSON	1858	p. 129, 130.
»	GREENE	1861	p. 91, fig. 18 (a, b).
»	ALDER	1863 (a)	p. 289.
»	PACKARD	1863	p. 404.
»	KIRCHENPAUER	1864	p. 14.
<i>Cotulina tricuspidata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 146, 223, 226.
<i>Sertularia tricuspidata</i>	ALDER	1867	p. 49.
<i>Sertularella triscupidata</i>	HINCKS	1868	p. 239, pl. 47, fig. 1 et p. 240, fig. 30.
»	ALLMAN	1871	p. 169.

Sertularella tridentata (Lamouroux).

Syn. : *Sertularia tridentata* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 477 et II, p. 117.

<i>Sertularia tridentata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 14.
------------------------------	--------------	------	--------

Sertularella turgida (Trask).

<i>Sertularia turgida</i>	TRASK	1857	p. 113, pl. 4, fig. 1.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 145, 223.

Sertularella unilateralis (Lamouroux).

Voir : Matériaux II, p. 108.

? <i>Sertularia unilateralis</i>	BUSK	1851	p. 118.
----------------------------------	------	------	---------

Gen. *Sertularia* Linné 1748.

Voir : Matériaux I, p. 463 et II, p. 109.

Sertularia abietina Linné.

Voir : Matériaux I, p. 463 et II, p. 109.

<i>Sertularia abietina</i>	TURTON a. KINGSTON	1830	sans pagination.
<i>Dynamena abietina</i>	BELLAMY	1839	p. 270.
<i>Sertularia abietina</i>	COUCH	1843	p. 206, fig. g.
» »	BUSK	1851	p. 118.
» »	FORBES	1851	p. 245.
<i>Sertularia obietina</i>	MAITLAND	1851	p. 49.
» »	SARS	1851	p. 131, 136.
» »	HASSAL a. COPPIN	1852	p. 161, 163.
» »	LANDSBOROUGH	1852	p. 130, pl. 5, fig. 14.
» »	GOSSE	1853 (a)	p. 434.
» »	SARS	1853	p. 387.
» »	THOMSON, W.	1853 (b)	p. 443.
» »	GEGENBAUR	1854	p. 217.
» »	IRVINE	1854	p. 245.
» »	GOSSE	1855	p. 22, fig. 31.
» »	TEMPLER	1855	p. 4576.
» »	HINCKS	1856	p. 469, 471.
» »	THOMPSON	1856	p. 454, 455, 458.
» »	SARS	1857 (b)	p. 196.
» »	ALDER	1858	p. 99, 115, 130, 131.
» »	ALDER	1859	p. 354.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 356.
» »	GREENE	1861	p. 129.
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 254, 255, 291, 294.
» »	ALDER	1863 (a)	p. 289.
» »	ALDER	1864	p. 193.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 143, 222, 225, 226.
» »	PARFITT	1866 (a)	p. 8.
» »	ALDER	1867	p. 49.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 183.

<i>Sertularia obietina</i>	NORMAN	1867	p. 200.
»	HELLER	1868	p. 34, 81.
»	HINCKS	1868	p. 266, pl. 55.
»	ALLMAN	1869 (b)	p. 87.
»	NORMAN	1869	p. 321, 323.
»	HERKLOTS	1870	p. 406, pl. 38, fig. 1.
»	ALLMAN	1871	p. 55... 169.

Sertularia actoni Philippi.

<i>Sertularia actoni</i>	PHILIPPI	1866	p. 120.
--------------------------	----------	------	---------

Sertularia anguina Trask.

<i>Sertularia anguina</i>	TRASK	1857	p. 112, pl. 5, fig. 1.
<i>Sertularia labrata</i>	MURRAY	1860 (a)	p. 250, pl. 11, fig. 2.
<i>Sertularia anguina</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 144, 223.

Sertularia arbuscula Lamouroux.

Matériaux I, p. 465 et II, p. 110.

Cette espèce, d'après BILLARD (1909) doit prendre place dans le genre *Sertularella*.

Voir : *Sertularella arbuscula*.

Sertularia australis (Kirchenpauer).

<i>Dynamena australis</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 8, 11, 12, pl. 1, fig. 5
---------------------------	--------------	------	-----------------------------

Sertularia bicuspidata Lamarck.

Voir : Matériaux I, p. 467 et II, p. 110.

<i>Sertularia bicuspidata</i>	LAMARCK	1816	vol. 2, p. 121.
<i>Dynamena divergens</i>	LAMOUREUX	1816	p. 180, pl. 5, fig. 2, a, B.
»	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 290.
»	BLAINVILLE	1830	p. 449.
<i>Sertularia divergens</i>	BLAINVILLE	1830	p. 446.

<i>Sertularia divergens</i>	BLAINVILLE	1834	p. 481.
<i>Dynamena divergens</i>	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia bicuspidata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 150.
<i>Sertularia divergens</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 153.
<i>Sertularia divergens</i>	BUSK	1852	p. 387, 392, 395.
<i>Dynamena bicuspidata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 8.
<i>Dynamena divergens</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 9.
? <i>Dynamena bicuspidata</i>	HELLER	1868	p. 37, 81, pl. 1, fig. 10-11.
<i>Dynamena divergens</i>	HELLER	1868	p. 36.

Sertularia bispinosa (Gray).

Voir : Matériaux II, p. 110.

<i>Sertularia bispinosa</i>	BUSK	1851	p. 118.
»	BUSK	1852	p. 392.
<i>Sertularella bispinosa</i>	ALLMAN	1871	p. 157.

BUSK (1851, p. 118) considère la *S. bispinosa* de GRAY comme une simple variété de *S. operculata*.

Sertularia cedrina Linné.

[*Selaginopsis cedrina* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 467 et II, p. 111.

<i>Sertularia cedrina</i>	THOMPSON	1831	p. 100.
---------------------------	----------	------	---------

Sertularia conferta (Kirchenpauer).

<i>Dynamena conferta</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 6, 8, 10, pl. 1, fig. 4.
--------------------------	--------------	------	-----------------------------

Sertularia confervaeformis Esper.

Voir : Matériaux I, p. 468 et II, p. 111.

Sertularia cornicina (Mac Crady).

<i>Dynamena cornicina</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 204.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 142, 224.

Sertularia dentata Lamouroux.

Matériaux I, p. 469 et II, p. 111.

Cette espèce, d'après BILLARD (1909) est synonyme de *Thuiaria cupressina* (Linné).

Voir : *Thuiaria cupressina*.

Sertularia digitalis Busk.

<i>Sertularia digitalis</i>	BUSK	1852 p. 387, 392, 393.
-----------------------------	------	------------------------

Sertularia distans Lamouroux.

Matériaux I, p. 469 et II, p. 111.

Cette espèce, d'après BILLARD (1909) doit passer dans le genre *Sertularella*.

Voir : *Sertularella distans*.

Sertularia disticha Bosc.Syn. : *Dynamena disticha* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 440 et II, p. 67.

<i>Sertularia disticha</i>	BUSK	1852 p. 395.
» »	JOHNSON	1858 p. 129 (Excl. syn. p.p.).
<i>Dynamena disticha</i>	KIRCHENPAUER	1864 p. 9.
? » »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 223.

Sertularia divaricata Lamarck.

Voir : Matériaux I, p. 469 et II, p. 112.

Cette espèce de LAMARCK était très douteuse et comme le type n'a pu être retrouvé par BILLARD (1907) et n'existe plus, il est préférable de la supprimer. Nous avons indiqué comme synonymes de cette espèce : 1°) *Sertularia rigida* Lamouroux; or, l'examen du type de la collection LAMOUROUX a montré que ce spécimen n'appartenait pas aux Hydroïdes; 2°) *Sertularia divergens* de BLAINVILLE (*Dynamena divergens* Lamouroux). Cette espèce,

d'après BILLARD (1909) doit rentrer dans les synonymes de *Sertularia bicuspidata* Lamarck.

En 1852 BUSK a décrit une nouvelle espèce provenant du Détroit de Magellan sous le nom de *Sertularia divaricata* et sans se douter que ce nom avait déjà été employé par LAMARCK. L'espèce de BUSK doit, du reste, rentrer dans le genre *Sertularella* et l'on peut, par conséquent, lui conserver son nom spécifique.

Sertularia elongata Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 469 et II, p. 112.

<i>Sertularia elongata</i>	BUSK	1852	p. 386, 387, 388.
»	KIRCHENPAUER	1864	p. 14.
<i>Sertularia millefolium</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 14.
<i>Sertularia elongata</i>	ALLMAN	1871	p. 157.

Sertularia evansi Ellis et Solander.

Syn. : *Dynamena evansii* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 440 et II, p. 68.

<i>Sertularia evansi</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 126.
»	GOSSE	1855	p. 22.
<i>Dynamena evansii</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 9.
<i>Dynamena tubulosa</i>	HELLER	1868	p. 35, 81, pl. 1, fig. 5-6.
»	MENEGHINI	1868	p. 35.
<i>Dynamena opposita</i>	MENEGHINI	1868	p. 35.

Sertularia fallax Johnston.

Matériaux II, p. 113.

Voir : *Diphasia fallax*.

Sertularia filicula Ellis et Solander.

Voir : Matériaux I, p. 471 et II, p. 113.

<i>Sertularia filicula</i>	DESOR	1851 (a)	p. 65.
»	MAITLAND	1851	p. 49.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 132, pl. 5, fig. 17.

<i>Sertularia filicula</i>	SARS	1853	p. 387.
? » »	IRVINE	1854	p. 245.
» »	STIMPSON	1854	p. 8.
» »	GOSSE	1855	p. 22.
» »	THOMPSON	1856	p. 454, 455.
» »	ALDER	1858	p. 96, 99, 115.
» »	MURRAY	1860 (a)	p. 250.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 356.
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 155.
» »	HINCKS	1862 (b)	p. 361.
» »	ALDER	1863 (a)	p. 290.
» »	ALDER	1864	p. 193.
<i>Dynamena filicula</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 7.
<i>Sertularia filicula</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 145, 225.
» »	ALDER	1867	p. 49.
» »	NORMAN	1867	p. 200.
» »	HINCKS	1868	p. 264, pl. 53, fig. 3.
» »	NORMAN	1869	p. 321.
» »	HERKLOTS	1870	p. 406, pl. 38, fig. 5.
» »	ALLMAN	1871	p. 169.

Sertularia fusca Johnston.

Voir : Matériaux II, p. 114.

<i>Dynamena nigra</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
<i>Sertularia fusca</i>	MAITLAND	1851	p. 50.
» »	LANDSBOROUGH	1852	p. 127.
» »	GOSSE	1855	p. 22.
» »	ALDER	1858	p. 96, 99, 116.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 155.
» »	ALDER	1863 (a)	p. 288, 290.
» »	ALDER	1864	p. 193.
<i>Dynamena nigra</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 9.
<i>Sertularia fusca</i>	ALDER	1867	p. 45, 49.
» »	HINCKS	1868	p. 272, pl. 50, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871	p. 158.

Sertularia gracilis Hassal.

Matériaux II, p. 114.

Voir : *Sertularia lamourouxi*.*Sertularia grosse-dentata* (Kirchenpauer).*Dynamena grosse-dentata* KIRCHENPAUER 1864 p. 9, 13, pl. 1, fig. 9.*Sertularia imbricata* Busk.*Sertularia imbricata* [BUSK] 1855 p. 256, pl. 2, fig. 7-8.Dans le texte, BUSK met par erreur *P. imbricata*, au lieu de *S. imbricata*.*Sertularia lamourouxi* M. Edwards.Syn. : *Dynamena distans* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 440 et II, p. 67.

Syn. : *Sertularia gracilis* Hassal.

Voir : Matériaux II, p. 114.

<i>Sertularia distans</i>	BUSK	1852	p. 395.
<i>Dynamena distans</i>	BUSK	1852	p. 394.
<i>Sertularia gracilis</i>	HASSAL et COPPIN	1852	p. 162, pl. 21, fig. 3.
»	GOSSE	1855	p. 22.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 253.
»	NORMAN	1862	p. 152.
<i>Dynamena distans</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 6, 8.
<i>Sertularia gracilis</i>	PARFITT	1866 (a)	p. 8.
<i>Dynamena distans</i>	HELLER	1868	p. 36.
<i>Dynamena secunda</i>	HELLER	1868	p. 36, 81, pl. 1, fig. 7-8.
? <i>Dynamena reptans</i>	HELLER	1868	p. 36.
<i>Sertularia gracilis</i>	HINCKS	1868	p. 262, pl. 53, fig. 2.
»	NORMAN	1869	p. 321.

L'étude que BILLARD a faite des Hydroïdes de LAMARCK et de LAMOUROUX nous permet aujourd'hui de rétablir avec plus d'exactitude la synonymie

fort embrouillée de plusieurs espèces, et, entre autres, de *Dynamena distans* Lmx, *Dynamena divergens* Lmx et *Sertularia distans* Lmx, qui ont été souvent confondues.

Cette dernière, *S. distans*, dont BILLARD a pu étudier le type (1909) est une bonne espèce, rentrant dans le genre *Sertularella* et très voisine (sinon synonyme) de la *Sertularella producta* (Allman).

L'échantillon type de *Dynamena distans* Lmx a été également étudié par BILLARD qui a pu reconnaître l'identité de cette espèce, d'abord avec celle qu'AUDOUIN (1809) a figurée sous le nom de *Dynamena distans* (et que nous avons indiquée par erreur comme synonyme de *Dynamena divergens* Lmx dans nos Matériaux I, p. 440), puis avec la *Sertularia gracilis* de HASSAL.

La *Dynamena distans* devrait donc porter le nom de *Sertularia distans* : mais cela pourrait amener des confusions par le fait que LAMOUREUX a donné ce nom de *Sertularia distans* à une autre espèce qui est devenue aujourd'hui *Sertularella distans*. Il nous semble donc préférable de suivre l'exemple donné par MILNE-EDWARDS dans la 2^e édition de l'*Histoire naturelle des animaux sans vertèbres* de LAMARCK (1836, p. 153) et d'attribuer à la *Dynamena distans* de LAMOUREUX le nom de *Sertularia lamourouxi*. Si ce procédé n'est pas absolument conforme aux règles de la nomenclature zoologique nous ferons remarquer 1^o que ce nom a été introduit par M. EDWARDS avant l'établissement de ces lois, 2^o que cette exception à la règle a l'avantage d'éviter de nouvelles confusions, 3^o que l'on a agi de la même façon dans des cas semblables (Ex. *Clytia johnstoni*).

Quant à la *Dynamena divergens* Lmx, elle est, d'après BILLARD, synonyme de *Sertularia bicuspidata* Lmk.

Sertularia mutulata Busk.

<i>Sertularia mutulata</i>	BUSK	1852 p. 387, 391.
»	HINCKS	1855 p. 128.

Sertularia obsoleta Lepechin.

[*Selaginopsis obsoleta* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 472 et II, p. 114.

<i>Sertularia obsoleta</i>	THOMPSON	1831 p. 100.
----------------------------	----------	--------------

Sertularia operculata Linné.Syn. : *Dynamena operculata* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 441 et II, p. 68.

Syn. : *Sertularia serra* Lamareck.

Voir : Matériaux I, p. 475 et II, p. 116.

<i>Dynamena brevicella</i>	LAMOUROUX	1824 (b)	p. 613.
»	LAMOUROUX	1824 (c)	p. 288.
<i>Sertularia operculata</i>	TURTON et KINGSTON	1830	(sans pagination).
<i>Sertularia brevicella</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 154.
<i>Dynamena operculata</i>	BELLAMY	1839	p. 270.
<i>Sertularia operculata</i>	BUSK	1851	p. 118.
»	MAITLAND	1851	p. 48.
»	BUSK	1852	p. 386, 387, 392.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 133, pl. 5, fig. 16.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 22.
»	THOMPSON	1856	p. 455.
»	ALDER	1858	p. 98, 116.
»	MURRAY	1860 (a)	p. 250.
<i>Amphisbetia operculata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
<i>Sertularia operculata</i>	GREENE	1861	p. 127.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 254.
<i>Dynamena fasciculata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 8, 12, pl. 1, fig. 7.
<i>Dynamena operculata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 6, 8, 11, 12, 14.
<i>Dynamena serra</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 8.
<i>Sertularia operculata</i>	MC INTOSH	1866	p. 602.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 9.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 183.
»	NORMAN	1867	p. 200.
<i>Dynamena operculata</i>	HELLER	1868	p. 37, 81.
<i>Sertularia operculata</i>	HINCKS	1868	p. 263, pl. 54.
»	NORMAN	1869	p. 321.
»	HERKLOTS	1870	p. 406, pl. 38, fig. 3.
»	ALLMAN	1871	p. 47... 168.
»	METZGER	1871 (a)	p. 35.

On doit comprendre parmi les synonymes de cette espèce, ainsi que BULLARD (1907 et 1909) l'a montré, la *Dynamena brevicella* de LAMOUREUX (que nous avons indiquée comme étant indéterminable) et la *Sertularia serra* de LAMARCK (mais non pas la *Dynamena serra* de HELLER).

Sertularia orthogonia Busk.

Sertularia orthogonia BUSK 1852 p. 387, 390.

Sertularia patula Busk.

Sertularia patula BUSK 1852 p. 387, 390.

Sertularia penna (Kirchenpauer).

Dynamena penna KIRCHENPAUER 1864 p. 8, 11, pl. 1, fig. 6.

Sertularia pinnata Pallas.

Matériaux I, p. 472 et II, p. 115.

Voir : *Diphasia pinnata*.

Sertularia pinus Gmelin.

[*Selaginopsis pinus* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 473 et II, p. 115.

Sertularia pinus THOMPSON 1831 p. 100.

Sertularia pulchella (d'Orbigny).

Syn. : *Dynamena pulchella* d'Orbigny.

Voir : Matériaux II, p. 70.

Sertularia furcata TRASK 1857 p. 112, pl. 5, fig. 2.

Dynamena pulchella KIRCHENPAUER 1864 p. 8, 12.

Sertularia furcata AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 145, 223.

HINCKS (1868) et HARTLAUB (1905) regardent cette espèce comme étant synonyme de *Sertularia operculata*, mais NUTTING (1904) en fait une espèce distincte.

Sertularia pumila Linné.Syn. : *Dynamena pumila* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 442 et II, p. 70.

<i>Sertularia pumila</i>	TURTON a. KINGSTON	1830	(sans pagination).
<i>Dynamena pumila</i>	BELLAMY	1839	p. 270.
<i>Sertularia pumila</i>	COUCH	1843	p. 206.
»	HASSAL	1843 (a)	p. 119.
»	COUCH	1851 (a)	p. 27.
»	MAITLAND	1851	p. 48.
»	SARS	1851	p. 130, 137.
»	HASSAL a. COPPIN	1852	p. 162, 163.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 125, pl. 4, fig. 13.
»	GOSSE	1853 (a)	p. 134.
»	SARS	1853	p. 378, 379.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	GOSSE	1855	p. 22.
»	LINDSTRÖM	1855 (b)	p. 365, ss., pl. 13, A.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	GOSSE	1856	p. 61.
»	THOMPSON	1856	p. 454.
»	MÖRCH	1857	p. 25.
»	SARS	1857 (a)	p. 163.
»	ALDER	1858	p. 98, 114.
»	WRIGHT	1858 (a)	p. 453, 455.
»	ALLMAN	1859 (a)	p. 120.
»	ALLMAN	1859 (c)	p. 309.
»	WRIGHT	1859 (b)	p. 174, note.
<i>Dynamena fabricii</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 3, p. 46, fig. 18.
<i>Dynamena pumila</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 326 et 355, pl. 32.
<i>Sertularia pumila</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 253.
»	WRIGHT	1861 (b)	p. 120, 123, 128, pl. 3.
<i>Dynamena pumila</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 24, 43.
»	MEYER u. MÖBIUS	1862	p. 231.
»	PACKARD	1863	p. 402, 404.
<i>Sertularia pumila</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 277, 281, 351, pl. 12, fig. 12.

<i>Sertularia pumila</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 371, 372, 375, 385, 386, fig. 9.
<i>Dynamena fabricii</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 382.
<i>Dynamena (Sertularia) pumila</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 382.
<i>Dynamena pumila</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 5, 6, 8, pl. 1, fig. 1.
» »	KÖLLIKER	1864	p. 233.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 141, 147, 224-226, fig. 225-226.
» »	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 66, fig. 84-85.
<i>Dynamena fabricii</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 141.
<i>Sertularia pumila</i>	HINCKS	1865 (b)	p. 408.
» »	Mc INTOSH	1866	p. 601, 602.
» »	PARFITT	1866 (a)	p. 8.
<i>Dynamena pumila</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 186, pl. 17, fig. 9-10.
<i>Sertularia pumila</i>	WRIGHT	1867	p. 43, note.
» »	HINCKS	1868	p. 260, pl. 53, fig. 1 et p. 259, fig. 32.
» »	BIANCONI	1869	p. 213.
» »	HINCKS	1869	p. 232.
» »	NORMAN	1869	p. 321.
» »	HERKLOTS	1870	p. 405, pl. 39, fig. 10.
» »	ALLMAN	1871	p. 47... 168, fig. 21.
<i>Dynamena pumila</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.
» »	METZGER	1871 (b)	p. 22.

Sertularia purpurea Linné.

[*Selaginopsis purpureus* Kirchenpauer].

Voir : Matériaux I, p. 474 et II, p. 116.

Sertularia serra Lamarck.

Matériaux I, p. 475 et II, p. 116.

Voir : *Sertularia operculata*.

Sertularia sertularioides (Lamouroux).Syn. : *Dynamena sertularioides* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 443 et II, p. 72.

Syn. : *Dynamena tubiformis* Lamouroux.Syn. : *Sertularia tubiformis* M. Edwards.

Voir : Matériaux I, p. 443 et II, p. 73.

Dynamena sertularioides KIRCHENPAUER 1864 p. 8, 10.*Dynamena tubiformis* KIRCHENPAUER 1864 p. 7.

BILLARD (1909) a pu constater l'identité des deux espèces décrites par LAMOUROUX sous le nom de *Dynamena sertularioides* et *D. tubiformis*.

Sertularia splendens Lamouroux.

Matériaux I, p. 476 et II, p. 116.

BILLARD (1909) a reconnu que cette espèce était synonyme de *Thuiaria cupressina* (Linné).

Voir : *Thuiaria cupressina*.*Sertularia subcarinata* Busk.*Sertularia subcarinata* BUSK 1852 p. 387, 390.*Sertularia tamarisca* Linné.

Matériaux I, p. 476 et II, p. 116.

Voir : *Diphasia tamarisca*.*Sertularia tridentata* Lamouroux.

Matériaux I, p. 477 et II, p. 117.

Cette espèce, d'après BILLARD (1909) doit passer dans le genre *Sertularella*.

Voir : *Sertularella tridentata*.

Sertularia tridentata Busk.

Sertularia tridentata BUSK 1852 p. 387, 394.

Sertularia trigonostoma Busk.

Sertularia trigonostoma BUSK 1852 p. 387, 392.

Sertularia turbinata (Lamouroux).

Syn. : *Dynamena turbinata* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 445 et II, p. 73.

Dynamena (*Sertularia*) *pe-*

<i>lasgica</i>	LAMOUREUX	1812	p. 184.
<i>Dynamena turbinata</i>	LAMOUREUX	1816	p. 180.
<i>Dynamena pelagica</i>	LAMOUREUX	1816	p. 181.
<i>Dynamena pelagica</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 291.
<i>Dynamena turbinata</i>	LAMOUREUX	1824 (c)	p. 290.
»	BLAINVILLE	1830	p. 449.
»	BLAINVILLE	1834	p. 484.
<i>Sertularia pelagica</i> p. p.	EDWARDS, M.	1836	p. 153.
<i>Sertularia turbinata</i>	EDWARDS, M.	1836	p. 154.
<i>Sertularia loculosa</i>	BUSK	1852	p. 387, 393.
<i>Dynamena turbinata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 8.
<i>Dynamena marginata</i>	KIRCHENPAUER	1864	p. 9, 11, 13, pl. 1, fig. 8.

Dans sa revision des Hydroides de la collection LAMOUREUX, BILLARD (1909) dit qu'il a trouvé une espèce étiquetée *Dynamena pelagica* Bosc, qui « n'est autre que le *Sertularia Verstuyysi* Nutting, lequel doit être considéré comme une variété ramifiée du *Sertularia turbinata* (Lamouroux) ». On peut donc faire rentrer la *Dynamena pelagica* de LAMOUREUX (que nous avons indiquée comme espèce indéterminable) dans la synonymie de *Sertularia turbinata*. Mais il est probable que LAMOUREUX a fait erreur en considérant sa *Dynamena pelagica* comme étant synonyme de la *Sertularia pelagica* de Bosc. On s'en convaincra facilement en comparant les descriptions de ces auteurs et en examinant la figure donnée par Bosc. Nous conserverons donc la *Sertularia pelagica* de Bosc parmi les espèces indéterminables.

D'après BILLARD (1909) la *Sertularia loculosa* de BUSK et la *Dynamena marginata* de KIRCHENPAUER sont synonymes de *Sertularia turbinata* Lmx.

Sertularia unguiculata Busk.

Sertularia unguiculata BUSK 1852 p. 387. 394.

Gen. *Silicularia* Meyen 1834.

Voir : Matériaux II, p. 117.

Silicularia rosea Meyen.

Voir : Matériaux II, p. 118.

Gen. *Solanderia* Duchassaing et Michelin 1846.

En 1846, DUCHASSAING et MICHELIN décrivirent un Polypier de la Guadeloupe « formant passage entre le genre *Corallium* et celui *Melitaea* » et lui donnèrent le nom de *Solanderia gracilis*. En 1862, MÖBIUS (Nene Gorgoniden des Naturhistorischen Museums Hamburg. In : Verhandl. d. k. Leopold. Carol. Akad. Bd. 29, 12 p., 3 pl., Jena 1862) donna la description d'une nouvelle *Solanderia*, *S. verrucosa* et KÖLLIKER (1865, Icones) en fit connaître une troisième espèce, *S. frauenfeldi*. MÖBIUS et KÖLLIKER plaçaient le genre *Solanderia* dans les Briareacées. Quelques années plus tard, KÖLLIKER (Beiträge zur Kenntniss d. Polypen. In : Verhandl. d. phys. medicin. Gesellsch. Würzburg, Neue Folge, Bd. 11, pp. 11-30, pl. 3-4, Würzburg, 1872, 8°) fit une étude spéciale du genre *Solanderia*. Il arriva à la conclusion que *S. verrucosa* et *S. frauenfeldi* appartenaient bien aux Briareacées, mais que *S. gracilis* était une Eponge rentrant probablement dans le même genre que la *Ceratella fusca* décrite par GRAY (1868). Enfin, CARTER (1873) et BALE (1888) ont montré que les *Ceratella* étaient des Hydroïdes et non pas des Eponges.

Nous conservons provisoirement les deux genres *Solanderia*

et *Ceratella*, mais il est probable que l'on devra, plus tard les réunir en un seul. Voir la remarque au genre *Ceratella*.

Solanderia gracilis Duchassaing et Michelin.

<i>Solanderia gracilis</i>	DUCHASSAING et	
	MICHELIN	1846 p. 219.
»	»	DUCHASSAING 1850 p. 21.
»	»	EDWARDS, M. 1857 p. 189.
»	»	DUCHASSAING et
	MICHELOTTI	1861 p. 310.

Gen. *Spadix* Gosse 1853.

Ce genre est synonyme de *Myriothela* Sars.

Gen. *Stauridium* Dujardin 1843.

Voir : Matériaux II, p. 119.

WRIGHT (1858 (a), p. 340) écrivait *Stauridia* au lieu de *Stauridium*.

Stauridium productum Wright.

<i>Stauridia producta</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 340, pl. 19, fig. 6-9.
<i>Stauridia producta</i>	HINCKS	1861 (c) p. 296 (Excl. syn.).
»	»	HINCKS 1862 (c) p. 459, pl. 9, fig. 2.
»	»	ALLMAN 1864 (a) p. 426.
<i>Stauridium productum</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 359, 360.
»	»	HINCKS 1865 (b) p. 446, note.
<i>Stauridia producta</i>	PARFITT	1866 (a) p. 6.
<i>Stauridium productum</i>	HINCKS	1868 p. 68, pl. 12, fig. 1 (Excl. syn. p. p.).
»	»	ALLMAN 1871 p. 374, pl. 17, fig. 11-12.
»	»	SPAGNOLINI 1871 p. 205.

Gen. *Stylactis* Allman 1864.*Stylactis fucicola* (Sars).

<i>Podocoryna fucicola</i>	SARS	1857 (a) p. 145, 154, pl. 2. fig. 6-13.
<i>Podocoryne fucicola</i>	SARS	1857 (b) p. 192, 193.
<i>Podocoryna fucicola</i>	SARS	1860 p. 348 (Trad. allem.).
» »	WRIGHT	1861 (b) p. 124.
<i>Podocoryne fucicola</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 131.
<i>Podocoryna fucicola</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 91, 277.
<i>Podocoryne fucicola</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 285.
<i>Stylactis fucicola</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 353.
<i>Podocoryna fucicola</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 132.
<i>Hydractinia fucicola</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 17, 50, 132, 134, 135.
<i>Stylactis fucicola</i>	ALLMAN	1871 p. 304.

Stylactis inermis Allman.

<i>Stylactis inermis</i>	ALLMAN	1871 p. 305, fig. 79.
--------------------------	--------	-----------------------

Stylactis sarsi (Sars).

<i>Podocoryne carnea</i> p. p.	SARS	1846 p. 7, pl. 2, fig. 5-11.
» »	LEUCKART	1853 p. 86, 88.
<i>Podocoryna sarsii</i>	SARS	1857 (b) p. 194.
» »	SARS	1860 p. 348 (Trad. allem.).
<i>Podocoryne carnea</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 381, 413.
<i>Stylactis sarsi</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 353.
» »	ALLMAN	1871 p. 303.

Gen. *Syncoryne* Ehrenberg 1834 — Emend. Allman 1864.

Voir : Matériaux II, p. 419.

Syncoryne decipiens Dujardin.

Voir : Matériaux II, p. 419.

<i>Syncoryne decipiens</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 302.
----------------------------	----------	------------------

<i>Syncoryne decipiens</i>	LEUCKART	1853	p. 85.
<i>Syncoryna decipiens</i>	GEGENBAUR	1854	p. 216.
» »	ALDER	1858	p. 102.
<i>Syncoryne decipiens</i>	ALLMAN	1859	(b) p. 142.
<i>Coryne decipiens</i>	WRIGHT	1859	(b) p. 175.
» »	WRIGHT	1861	(b) p. 126.
? <i>Coryne sarsii</i>	HINCKS	1862	(c) p. 459, 460.
? » »	ALDER	1863	p. 227.
<i>Coryne decipiens</i>	WRIGHT	1863	(a) p. 39, 40.
» »	WRIGHT	1863	(b) p. 280.
<i>Syncoryne decipiens</i>	ALLMAN	1865	p. 466, 468.
<i>Syncoryna decipiens</i>	BENEDEN (van)	1867	(a) p. 119.
<i>Syncoryna stenyo</i>	BENEDEN (van)	1867	(a) p. 18, 50.
<i>Coryne decipiens</i>	WRIGHT	1867	p. 46.
<i>Syncoryne decipiens</i>	HINCKS	1868	p. 56, pl. 10, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871	p. 132, 203, 280.

Syncoryne eximia Allman.

? <i>Coryne listeri</i>	THOMPSON	1856	p. 451.
» »	GREENE	1857	p. 248.
» »	ALDER	1858	p. 98, 102.
<i>Coryne eximia</i>	ALLMAN	1859	(b) p. 141.
» »	HINCKS	1862	(c) p. 459, pl. 9, fig. 1.
» »	HODGE	1862	p. 35, pl. 4, fig. 6-10.
» »	ALDER	1863	p. 226.
» »	WRIGHT	1863	(b) p. 441.
» »	ALLMAN	1864	(a) p. 413, 426.
<i>Syncoryne eximia</i>	ALLMAN	1864	(a) p. 367, 370, fig. 6 D.
» »	ALLMAN	1864	(c) p. 357.
<i>Coryne (Syncoryne) eximia</i>	ALLMAN	1864	(c) p. 359.
<i>Syncoryne eximia</i>	ALLMAN	1865	p. 466.
<i>Coryne eximia</i>	HINCKS	1865	(a) p. 99.
» »	HINCKS	1865	(b) p. 416, note, pl. 1, fig. 2.
<i>Syncoryne eximia</i>	HINCKS	1868	p. 50, pl. 9, fig. 2.
» »	NORMAN	1869	p. 323.
» »	ALLMAN	1871	p. 44 ... 204, fig. 15, 56 et 75, p. 282, pl. 5.

Syncoryne eximia HINCKS 1871 (b) p. 73, 75.

Syncoryne ferox (Wright).

Coryne ferox WRIGHT 1867 p. 46.
Syncoryne ferox HINCKS 1868 p. 319.
 » » ALLMAN 1871 p. 283.

Syncoryne frutescens Allman.

Syncoryne frutescens ALLMAN 1871 p. 281, p. 6, fig. 4-6.

Syncoryne glandulosa Dujardin.

Voir : Matériaux II, p. 119.

Syncoryne glandulosa KÖLLIKER 1853 (a) p. 302.
Syncoryna glandulosa GEGENBAUR 1854 p. 163, 216.
 » » HINCKS 1861 (c) p. 295.

Syncoryne gravata (Wright).

Tubularia stellifera COUTHOUY 1839 p. 56.
 » » GOULD 1844 p. 350.
Coryne gravata WRIGHT 1858 (a) p. 338, pl. 19, fig. 5.
 » » WRIGHT 1861 (b) p. 126.
 » » WRIGHT 1863 (b) p. 279, 280.
 » » ALLMAN 1864 (a) p. 412.
Syncoryne gravata ALLMAN 1864 (c) p. 357.
Tubularia stellifera AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 175.
Coryne gravata HINCKS 1865 (b) p. 417.
Coryna gravata BENEDEN (væn) 1867 (a) p. 18, 49, 50, 121,
 122, 123.
Syncoryne gravata HINCKS 1868 p. 53, pl. 10, fig. 1.
 » » NORMAN 1869 p. 327.
 » » ALLMAN 1871 p. 277.
 ? *Sarsia gravata* SPAGNOLINI 1871 p. 205.

Nous avons considéré la *Tubularia stellifera* de COUTHOUY comme étant une espèce indéterminable, mais on peut, suivant l'exemple de HINCKS (1868) la placer parmi les synonymes de *Syncoryne gravata*.

Syncoryne listeri van Beneden.

Matériaux II, p. 119.

Cette espèce est très douteuse. ALDER (1863, p. 226) a eu l'occasion d'en étudier des exemplaires qui lui avaient été envoyés par van BENEDEN et cet examen lui a prouvé que cette espèce était synonyme « with the *Coryne ramosa* of English Authors ». Mais la *Coryna ramosa* d'ALDER n'est pas la même espèce que *C. ramosa* de GOSSE, WRIGHT, etc. Cette dernière est synonyme de *Coryne muscoides* (*Coryne vaginata* de HINCKS). HINCKS dit à ce sujet (1868, p. 40) : « The *C. ramosa* of ALDER's Catalogue I know, from correspondence with the author, to be identical with *C. pusilla* ». On peut donc considérer la *Syncoryne listeri* Bened. comme synonyme de *Coryne pusilla*. « If this decision be correct » dit HINCKS, « the figure in the *Mém. sur les Tubulaires* is very inadequate. In his later work » — et Hincks veut sans doute parler des *Recherches sur la Faune littorale de Belgique* — « van BENEDEN has assigned the name to a different form, which seems to be the *Syncoryne Sarsii* ».

Nous adopterons la manière de voir de HINCKS et ferons rentrer les premières descriptions de *Syncoryne listeri* parmi les synonymes de *Coryne pusilla* et la dernière dans les synonymes de *Syncoryne Sarsi*. Le nom de *Syncoryne listeri* doit donc disparaître.

Syncoryne loveni Sars.

Voir : Matériaux II, p. 120.

<i>Syncoryne ramosa</i>	OWEN	1849	p. 12.
<i>Syncoryna loveni</i>	SARS	1851	p. 135.
<i>Syncoryne ramosa</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 304.
<i>Syncoryna ramosa</i>	GEGENBAUR	1854	p. 216.
<i>Syncoryne ramosa</i>	WRIGHT	1858 (a)	p. 339.
<i>Syncoryna ramosa</i>	SARS	1860	p. 350 (Trad. allem.).
<i>Syncoryne loveni</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 190, note.
<i>Syncoryne ramosa</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 411.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 357.
<i>Syncoryna ramosa</i>	HINCKS	1865 (b)	p. 412, 417.
<i>Syncoryne loveni</i>	ALLMAN	1871	p. 276 et 285.

Syncoryne mirabilis (L. Agassiz).

Voir : Matériaux II, p. 120.

Syn. : *Sarsia mirabilis* L. Agassiz.

Voir : Matériaux II, p. 146.

<i>Sarsia mirabilis</i>	BUSCH	1851	p. 14, 17.
<i>Syncoryne</i> (de Desor)	KÖLLIKER	1853	p. 302.
<i>Sarsia mirabilis</i>	STIMPSON	1854	p. 11.
» »	WRIGHT	1856	p. 89.
? <i>Sarsia glacialis</i>	MÖRCH	1857	p. 23.
<i>Sarsia mirabilis</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 109, 137-139, 215.
<i>Coryne mirabilis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 3, p. 46, fig. 19-21, p. 109, fig. 68-70, pl. 17-19, vol. 4, p. 185, fig. 7-31, p. 340, pl. 20, fig. 1-9, pl. 23 (a), fig. 12.
» »	ALLMAN	1864 (a)	p. 357, 399, 412.
<i>Syncoryne mirabilis</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 357.
<i>Coryne mirabilis</i>	CLARK	1864	p. 62, 65.
» »	CLARK	1864 (a)	p. 396, 397.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 152, 175, 177, fig. 283-288, p. 225-226.
<i>Sarsia mirabilis</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 177.
<i>Coryne mirabilis</i>	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 68, fig. 88-90.
» »	CLARK	1865 (a)	p. 77, fig. 40-42.
» »	KÖLLIKER	1865	p. 103, 105, pl. 11, fig. 3.
» »	MÖBIUS	1866	p. 17.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 44, 49, 50, 121-123.
<i>Sarsia mirabilis</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 50.
<i>Coryne mirabilis</i>	REICHERT	1867	p. 266.
» »	ALLMAN	1871	p. 30.
<i>Syncoryne mirabilis</i>	ALLMAN	1871	p. 78, 119, 278.

Syncoryne pulchella Allman.Syn. : *Codonium pulchellum* (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 132.

<i>Ectopleura pulchella</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 343.
<i>Sarsia pulchella</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 368.
<i>Syncoryne pulchella</i>	ALLMAN	1865	p. 465.
<i>Sarsia pulchella</i>	MARCUSEN	1867	p. 358.
<i>Syncoryne pulchella</i>	HINCKS	1868	p. 57, 319, pl. 15, fig. 3.
<i>Ectopleura pulchella</i>	NORMAN	1869	p. 257, 327.
<i>Syncoryne pulchella</i>	ALLMAN	1871	p. 113 ... 202, fig. 49, 76 et p. 279, pl. 6, fig. 1-3.
» »	HINCKS	1871 (b)	p. 75.
<i>Sarsia pulchella</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 202, 205.

Syncoryne reticulata (A. Agassiz).

? <i>Sarsia turricula</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 128, 138, 215, 216, pl. 8, fig. 6-8.
<i>Syndictyon reticulatum</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 340.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a)	p. 340.
? <i>Ectopleura turricula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 343.
<i>Syndictyon reticulatum</i>	AGASSIZ, A.	1862 (a)	p. 340.
? <i>Sarsia turricula</i>	HINCKS	1862 (c)	p. 461.
? » »	ALLMAN	1864 (c)	p. 357, 368.
? <i>Syncoryne turricula</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 357.
<i>Syndictyon reticulatum</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 177, 225, fig. 290- 300.
? <i>Sarsia turricula</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 190, 191.
? <i>Ectopleura turricula</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 191, 224.
<i>Syncoryne reticulata</i>	ALLMAN	1871	p. 283.

Syncoryne sarsi Lovén.

Voir : Matériaux II, p. 120.

<i>Syncoryne</i> sp.	DESOR	1851 (b)	p. 134.
<i>Syncoryne sarsi</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 302.

<i>Syncoryna sarsii</i>	SARS	1853	p. 378.
<i>Syncoryne sarsi</i>	GEGENBAUR	1854	p. 169, 216.
» »	GREENE	1857	p. 248.
<i>Syncoryna sarsii</i>	ALDER	1858	p. 102.
<i>Syncoryne sarsi</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 190, note.
» »	GREENE	1861	p. 86, fig. 17 (d).
» »	MEYER u. MÖBIUS	1862	p. 231.
» »	ALLMAN	1864 (c)	p. 357 (Excl. syn.).
» »	ALLMAN	1865	p. 466.
<i>Syncoryna sarsii</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 50, 119.
<i>Syncoryna listerii</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 120, pl. 5, fig. 5.
<i>Syncoryne sarsi</i>	HINCKS	1868	p. 52, pl. 7, fig. 3.
» »	ALLMAN	1871	p. 275.
<i>Syncoryne listerii</i> p. p.	ALLMAN	1871	p. 284.

Gen. *Syndictyon* A. Agassiz 1862.

Le genre *Syndictyon*, créé par A. Agassiz (1862 (a), p. 340) est synonyme de *Syncoryne* ainsi qu'ALLMAN (1871, p. 284) l'a montré. Il doit donc disparaître. Mais nous le conserverons provisoirement pour les Méduses dont la forme Polype n'est pas connue.

Gen. *Syntheticium* Allman 1871.

Syntheticium elegans Allman.

<i>Syntheticium elegans</i>	ALLMAN	1871	p. 229, fig.
-----------------------------	--------	------	--------------

Gen. *Thalia* sec. L. Agassiz 1862.

Voir : *Halia*.

Gen. *Thamnocnidia* L. Agassiz 1862.

Ce genre, proposé par L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 342) n'a pas été adopté. (Voir : Gen. *Parypha*).

Gen. *Theuaria* sec. Irvine 1854.

Voir : *Thuiaria*.

Gen. *Thuiaria* Fleming 1828.

Voir : Matériaux I, p. 478 et II, p. 121.

IRVINE (1854) écrivait : *Theuaria* au lieu de *Thuiaria*.

Thuiaria argentea (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 465 et II, p. 121.

<i>Sertularia argentea</i>	TURTON et KINGSTON	1830	(sans pagination).
<i>Dynamena argentea</i>	BELLAMY	1839	p. 270.
<i>Sertularia argentea</i>	COUCH	1843	p. 208.
»	BUSK	1851	p. 118.
»	DESOR	1851 (a)	p. 66.
»	FORBES	1851	p. 245.
»	MAITLAND	1851	p. 50.
»	SARS	1851	p. 126, 131, 137.
»	HINCKS	1852	p. 82, 84, pl. 3, fig. 4.
»	LANDSBOROUGH	1852	p. 135, pl. 5, fig. 15.
»	ALLMAN	1853 (d)	p. 71.
»	GOSSE	1853 (a)	p. 434.
»	IRVINE	1854	p. 245.
»	STIMPSON	1854	p. 8.
»	GOSSE	1855	p. 22.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	GOSSE	1856	p. 194.
»	THOMPSON	1856	p. 454, 455, 456.
»	MÖRCH	1857	p. 25.
»	ALDER	1858	p. 116.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 356.
»	GREENE	1861	p. 91, fig. 18 (e).
»	HINCKS	1861 (c)	p. 154, 159, 254, 255, 291.

<i>Sertularia argentea</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 6, 7, 24, 40, 48.
»	ALDER	1863 (a)	p. 290.
»	FULLER	1863	p. 129.
»	PACKARD	1863	p. 422.
»	ALDER	1864	p. 193.
»	KIRCHENPAUER	1864	p. 3, 4, pl. 1, fig. 2 (b).
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 144, 225, 226.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 9.
»	ALDER	1867	p. 49.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 184.
»	NORMAN	1867	p. 200.
»	HINCKS	1868	p. 268, pl. 56.
»	NORMAN	1869	p. 321.
»	HERKLOTS	1870	p. 407, pl. 38, fig. 6.
»	ALLMAN	1871	p. 169, 171.

Dans les Matériaux II, p. 421 supprimer : « *Sertularia fastigiata*, FABRICIUS 1780, p. 445 » qui figure à tort en tête de la synonymie de *Thuiaria argentea*.

En outre, p. 422, ligne 25, il faut supprimer la citation : « *Sertularia argentea* DALYELL 1847-48, vol. 1, p. 189, pl. 37, 38 » qui, d'après HINCKS, doit figurer dans les synonymes de *Sertularia cupressina* (= *Thuiaria cupressina*).

Thuiaria articulata (Pallas).

Voir : Matériaux I, p. 467 et II, p. 422.

<i>Sertularia lichenastrum</i>	OLIVI	1792	p. 290.
<i>Thuiaria articulata</i>	COUCH	1843	p. 208.
»	BUSK	1851	p. 119.
<i>Thuiaria Ellisii</i>	BUSK	1851	p. 119.
<i>Thuiaria articulata</i>	FORBES	1851	p. 245.
<i>Sertularia lonchitis</i>	MAITLAND	1851	p. 52.
<i>Thuiaria articulata</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 139, pl. 6, fig. 19.
<i>Thuiaria articulata</i>	IRVINE	1854	p. 245.
<i>Thuiaria articulata</i>	GOSSE	1855	p. 24.
»	TEMPLER	1855	p. 4576.
»	THOMPSON	1856	p. 456, 459.
»	ALDER	1858	p. 117.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 357.

<i>Thuiaria articulata</i>	HINCKS	1861 (c) p. 255.
»	PARFITT	1866 (a) p. 10.
»	HELLER	1868 p. 38.
<i>Thujaria lichenastrum</i>	HELLER	1868 p. 38, 81.
<i>Thuiaria articulata</i>	HINCKS	1868 p. 277, pl. 60.
»	NORMAN	1869 p. 321.
»	HERKLOTS	1870 p. 404, pl. 37, fig. 9.
»	ALLMAN	1871 p. 165 ... 170.

Thuiaria crisioides (Lamouroux).

Voir : Matériaux II, p. 123.

<i>Sertularia crisioides</i>	BUSK	1852 p. 387, 389.
<i>Dynamena crisioides</i>	KIRCHENPAUER	1864 p. 9.

Thuiaria cupressina (Linné).

Voir : Matériaux II, p. 123.

Syn. : *Sertularia cupressina* Linné.

Voir : Matériaux I, p. 468.

Syn. : *Sertularia dentata* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 469 et II, p. 111.

Syn. : *Sertularia splendens* Lamouroux.

Voir : Matériaux I, p. 476 et II, p. 116.

<i>Sertularia cupressina</i>	TURTON a. KINGSTON	1830 (sans pagination).
<i>Sertularia argentea</i>	DALYELL	1847-48 vol. 1, p. 189, pl. 37, 38.
<i>Sertularia cupressina</i>	FORBES	1851 p. 245.
? »	FREY	1851 p. 17, pl. 1, fig. 4.
»	LEUCKART	1851 p. 24.
»	MAITLAND	1851 p. 51.
»	LANDSBOROUGH	1852 p. 136.
<i>Sertularia cypressina</i>	LEUCKART	1853 p. 86.
<i>Sertularia cupressina</i>	IRVINE	1854 p. 245.
»	GOSSE	1855 p. 22.
»	LEIDY	1855 p. 138.
»	GOSSE	1856 p. 33, 194.

<i>Sertularia cupressina</i>	THOMPSON	1856	p. 456.
»	WRIGHT	1856	p. 88.
»	ALDER	1858	p. 116.
»	ALLMAN	1859 (a)	p. 120.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 356.
»	GREENE	1861	p. 90.
»	HINCKS	1861 (c)	p. 255.
»	KIRCHENPAUER	1862	p. 24, 40.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 372.
»	KIRCHENPAUER	1864	p. 3.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 94, 143, 224, 225.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 9.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 178, pl. 16.
<i>Sertularia cupressoides</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 206. Explicat. des planches.
<i>Sertularia cupressina</i>	HINCKS	1868	p. 270, pl. 57.
»	NORMAN	1869	p. 321.
»	HERKLOTS	1870	p. 407, pl. 38, fig. 4.
»	ALLMAN	1871	p. 48.
»	METZGER	1871 (a)	p. 35.
»	METZGER	1871 (b)	p. 21.

Thuiaria cupressoides (Lepechin).

Syn. : *Sertularia cupressoides* Lepechin.

Voir : Matériaux I, p. 469 et II, p. 124.

Thuiaria fabricii Levinsen.

Voir : Matériaux II, p. 124.

Thuiaria fenestrata Bale.

Voir : Matériaux I, p. 478 et II, p. 124.

Nous avons placé la *Salacia tetracythara* Lmx parmi les synonymes de *Thuiaria fenestrata* Bale. Mais BILLARD (1909) ayant retrouvé le type de LAMOUROUX (qui correspond bien à l'espèce de BALE) on doit donner à cette espèce le nom de *Thuiaria tetracythara* (Lmx).

Voir : *Thuiaria tetracythara*.

Thuiaria flexilis Allman.

Thuiaria flexilis ALLMAN 1871 p. 170.

Thuiaria latiuscula (Stimpson).

Sertularia latiuscula STIMPSON 1854 p. 8.
 » » AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 145, 225, 226.

Espèce douteuse !

Thuiaria laxa Allman.

Thuiaria laxa ALLMAN 1871 p. 170.

Thuiaria lichenastrum (Pallas).

Syn. : *Sertularia lichenastrum* Pallas.

Voir : Matériaux I, p. 472 et II, p. 125.

Sertularia lichenastrum BENNET EN OLIVIER 1826 p. 196.

HELLER (1868, p. 38) mentionne cette espèce dans la faune de l'Adriatique, mais d'après la citation d'OLIVI, et il ajoute qu'elle est probablement synonyme de *T. articulata* Fleming.

Ces deux espèces, *T. lichenastrum* et *T. articulata* paraissent cependant être bien distinctes l'une de l'autre. Mais on peut admettre avec HINCKS (1872) que l'espèce décrite très sommairement par OLIVI était non pas *T. lichenastrum* comme il le croyait, mais bien *T. articulata*. On doit donc enlever la citation d'OLIVI qui se trouve dans nos Matériaux (I, p. 472) et la placer dans les synonymes de *T. articulata* où se trouvera également celle de HELLER.

Thuiaria salicornia Allman.

Thuiaria salicornia ALLMAN 1871 p. 170.

Thuiaria tetracythara (Lamouroux).

Syn. : *Thuiaria fenestrata* Bale.

Voir : Matériaux I, p. 478 et II, p. 124.

? *Serialaria tetracythera* SCHWEIGGER 1819 Tab. 8.

Voir la note à : *Thuiaria fenestrata*.

Thuiaria thuja (Linné).

Voir : Matériaux I, p. 476 et II, p. 125.

<i>Sertularia thuja</i>	TURTON et KINGSTON	1830	(sans pagination).
<i>Thuiaria thuja</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
» »	COUCH	1843	p. 208.
<i>Sertularia thuja</i>	MAITLAND	1851	p. 51.
<i>Thuiaria thuja</i>	SARS	1851	p. 125, 126, 131, 137.
» »	LANDSBOROUGH	1852	p. 139, pl. 6, fig. 18.
» »	SARS	1853	p. 387.
» »	GOSSE	1855	p. 24, fig. 32.
» »	THOMPSON	1856	p. 456.
» »	ALDER	1858	p. 96, 97, 99, 117.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 357.
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 255.
» »	ALDER	1863 (a)	p. 290.
» »	PACKARD	1863	p. 422.
» »	ALDER	1864	p. 193.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 148, 222, 226.
» »	PARFITT	1866 (a)	p. 10.
» »	ALDER	1867	p. 49.
» »	HINCKS	1868	p. 275, pl. 59.
» »	NORMAN	1869	p. 321.
» »	HERKLOTS	1870	p. 403, pl. 37, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871	p. 169.

Thuiaria zelandica Gray.

Voir : Matériaux II, p. 126.

[Gen. *Thyroscyphus* Allman 1877].*Thyroscyphus simplex* (Lamouroux).

<i>Laomedea simplex</i>	LAMOUREUX	1816	p. 206.
» »	DESLONGCHAMPS	1824	p. 482.
» »	BLAINVILLE	1830	p. 439.
» »	BLAINVILLE	1834	p. 474.

BILLARD (1909) a pu étudier le type de la *Laomedea simplex* de LAMOUROUX (que nous avons placée à tort parmi les espèces indéterminables) et a reconnu qu'elle devait se placer dans le genre *Thyroscyphus*.

D'autre part, DANA (1846-49, p. 21, fig. 6 et p. 290, pl. 61, fig. 8) a représenté et décrit sous le nom de *Laomedea simplex* une espèce qui n'est pas la même que celle de LAMOUROUX et qu'il n'est pas possible de déterminer exactement.

Gen. *Trichydra* Wright 1857.

Trichydra pudica Wright.

<i>Trichydra pudica</i>	WRIGHT	1857 (c) p. 168.
» »	WRIGHT	1858 (a) p. 237, pl. 15, fig. 1.
<i>Campanularia trichoides</i>	WRIGHT	1858 (a) p. 258.
<i>Trichydra pudica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 351.
» »	WRIGHT	1863 (b) p. 440, pl. 12, fig. 9 et pl. 22, fig. 1-6.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 375.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 132.
? <i>Eudendrium pudicum</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 116, pl. 8, fig. 1-2.
<i>Trichydra pudica</i>	HINCKS	1868 p. 216, fig. 26.

Gen. *Trochopyxis* L. Agassiz 1860.

Ce genre que L. AGASSIZ (1860-62, vol. 3, p. 46, fig. 15 et vol. 4, p. 304 et 354) avait créé pour y placer sa *Clytia biciphora* (= *Clytia johnstoni*) n'a pas été adopté. Il est synonyme de *Clytia*.

Gen. *Tubiclava* Allman 1863.

Tubiclava fruticosa Allman.

<i>Tubiclava fruticosa</i>	ALLMAN	1871 p. 257, pl. 2, fig. 5 et 6.
----------------------------	--------	----------------------------------

Tubiclava lucerna Allman.

<i>Tubiclava lucerna</i>	ALLMAN	1863 (b) p. 9.
--------------------------	--------	----------------

<i>Tubiclava lucerna</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 351.
»	NORMAN	1865 p. 262.
»	HINCKS	1868 p. 11.
»	ALLMAN	1871 p. 256, pl. 2, fig. 7 et 8.
»	HINCKS	1871 (b) p. 74.

Gen. *Tubularia* Linné 1758.

Voir : Matériaux I, p. 478 et II, p. 126.

Tubularia attenuata Allman.

<i>Tubularia attenuata</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 367.
»	ALLMAN	1864 (d) p. 60.
»	HINCKS	1868 p. 122.
»	NORMAN	1869 p. 250, 256, 257, 324.
»	ALLMAN	1871 p. 169, 440, pl. 22, fig. 1 et 2.

Tubularia bellis Allman.

<i>Tubularia bellis</i>	ALLMAN	1863 (b) p. 12.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 367.
»	ALLMAN	1864 (d) p. 60.
»	HINCKS	1868 p. 122, pl. 21, fig. 3.
»	NORMAN	1869 p. 256, 257, 324.
»	ALLMAN	1871 p. 158, 168, 409, pl. 22, fig. 5 et 6.

Tubularia coronata Abildgaard.

Matériaux I, p. 479 et II, p. 126.

Voir : *Tubularia larynx*.

Tubularia couthouyi L. Agassiz.

<i>Tubularia couthouyi</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 3, p. 52, fig. 30, vol. 4, p. 266 et 342, pl. 23 a, fig. 8-9, pl. 24, pl. 26, fig. 1-6.
----------------------------	-------------	---

<i>Tubularia couthouyi</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 397.
<i>Tubularia couthouyi</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 367.
<i>Tubularia couthouyi</i>	CLARK	1864 p. 61.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 195, 225, 226.
»	AGASSIZ, E. et A.	1865 p. 72, fig. 98, 99.
»	KÖLLIKER	1865 p. 103, pl. 11, fig. 4-5.
»	WRIGHT	1867 p. 159.
»	ALLMAN	1871 p. 76, 403.

Tubularia cristata Mac Crady.

<i>Tubularia cristata</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 156, 215, 216.
<i>Parypha cristata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 342.
<i>Tubularia cristata</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 367.
<i>Parypha cristata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 194, 195, 223, 224.
<i>Tubularia cristata</i>	ALLMAN	1871 p. 417.

Tubularia crocea (L. Agassiz).

<i>Parypha crocea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 249 et 342, pl. 23, pl. 23 a, fig. 1-7.
»	ALLMAN	1864 (a) p. 396.
<i>Tubularia crocea</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 367.
? <i>Parypha calamaris</i>	CLARK	1864 p. 61.
<i>Parypha crocea</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 195, 225.
»	KÖLLIKER	1865 p. 103, 105, pl. 11, fig. 2.
»	REICHERT	1867 p. 266.
<i>Tubularia crocea</i>	ALLMAN	1871 p. 416.
<i>Tubularia (Parypha) crocea</i>	ALLMAN	1871 p. 76.

Tubularia dumortieri van Beneden.

Matériaux II, p. 126.

Voir : *Ectopleura dumortieri*.

Tubularia humilis Allman.

<i>Tubularia humilis</i>	ALLMAN	1864 (d) p. 57, 60.
--------------------------	--------	---------------------

<i>Tubularia humilis</i>	HINCKS	1868	p. 123.
»	»	ALLMAN	1871 p. 411, pl. 22, fig. 3 et 4.
»	»	HINCKS	1871 (b) p. 78.

Tubularia indivisa Linné.

Voir : Matériaux I, p. 479 et II, p. 127.

<i>Tubularia indivisa</i>	SARS	1828	p. 321, pl. 2, fig. 3-5.
»	»	TURTON a. KINGSTON	1830 (sans pagination).
»	»	BELLAMY	1839 p. 271.
»	»	OWEN	1849 p. 55.
»	»	FORBES	1851 p. 219 et 245.
»	»	MAITLAND	1851 p. 41.
»	»	SARS	1851 p. 131, 136.
»	»	LANDSBOROUGH	1852 p. 114, pl. 1, fig. 2.
»	»	CHIAJE, D.	1853 p. 322.
»	»	MUMMERY	1853 p. 28, pl. 4.
»	»	SARS	1853 p. 387.
»	»	WILLIAMS	1853 p. 245, note.
? <i>Tubularia calamaris</i>	GEGENBAUR	1854	p. 169, 217.
<i>Tubularia indivisa</i>	GEGENBAUR	1854	p. 186, 217.
»	»	IRVINE	1854 p. 245.
? »	»	STIMPSON	1854 p. 9.
»	»	GOSSE	1855 p. 20, fig. 28.
»	»	TEMPLER	1855 p. 4575.
»	»	THOMPSON	1856 p. 451, 452, 459.
»	»	WRIGHT	1856 p. 88.
»	»	MÖRCH	1857 p. 24.
»	»	SARS	1857 (a) p. 145.
»	»	SARS	1857 (b) p. 193.
»	»	ALDER	1858 p. 98, 99, 106.
»	»	WRIGHT	1858 (a) p. 263, pl. 15, fig. 2-3.
»	»	WRIGHT	1858 (c) p. 432.
»	»	ALDER	1859 p. 354.
»	»	ALLMAN	1859 (b) p. 48, 140.
? <i>Tubularia ornata</i>	DANA	1859	p. 148.
? <i>Tubularia catamaris</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 155.

<i>Tubularia indivisa</i>	MAC CRADY	1859 (b)	p. 155.
»	BOECK	1860	p. 115, 116.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 267, note et p. 270, note, et p. 342.
? <i>Thamnocnidia calamaris</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 242 et 342.
<i>Tubularia indivisa</i>	GREENE	1861	p. 44, 55, 83, 84, fig. 9 et 16 (c).
? <i>Tubularia calamaris</i>	GREENE	1861	p. 88.
<i>Tubularia indivisa</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 160.
»	WRIGHT	1861 (b)	p. 125, 127, 128.
<i>Tubularia calamaris</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 13, 40, 48, 52, 53.
<i>Tubularia indivisa</i>	ALDER	1863	p. 233.
»	ALDER	1863 (a)	p. 289.
? »	CLAPARÈDE	1863 (b)	p. 3, pl. 2, fig. 1-5.
»	WRIGHT	1863 (a)	p. 39, 40.
»	WRIGHT	1863 (b)	p. 278, 280, 281.
»	ALDER	1864	p. 192.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 366, 367, 370, 377, 387, 391, 392, 396, 397, 409, fig. 6 c.
»	ALLMAN	1864 (c)	p. 367.
? <i>Tubularia calamaris</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 367.
<i>Tubularia indivisa</i>	CLARK	1864	p. 61, 65.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 226.
»	CLARK	1865 (a)	p. 238, fig. 136-138.
»	HINCKS	1865 (b)	p. 412, 417, pl. 1, fig. 4.
»	KÖLLIKER	1865	p. 105.
»	MC INTOSH	1866	p. 602.
»	PARFITT	1866 (a)	p. 6.
»	ALDER	1867	p. 49.
? <i>Tubularia calamaris</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 111.
<i>Tubularia indivisa</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 17, 33, 50, 55, 105, 107, 111, 126, 132.
»	NORMAN	1867	p. 199.
»	WRIGHT	1867	p. 159.
»	HELLER	1868	p. 32, 81.
»	HINCKS	1868	p. 115, pl. 20 et p. 322.

<i>Tubularia indivisa</i>	NORMAN	1869	p. 321, 322, 324.
»	ANDREWS	1870	p. 479.
? <i>Tubularia calamaris</i>	HERKLOTS	1870	p. 397, pl. 39, fig. 2.
<i>Tubularia indivisa</i>	ALLMAN	1871	p. 44... 168, fig. 15. 32 et 44, p. 203 et 400, pl. 20 et 23.
? <i>Tubularia calamaris</i>	ALLMAN	1871	p. 412.
<i>Tubularia indivisa</i>	METZGER	1871 (b)	p. 34.

La *Tubularia calamaris* de PALLAS est synonyme de *T. indivisa*. Mais van BENEDEN a décrit sous le nom de *T. calamaris* une espèce qu'il dit être abondante sur les côtes de Belgique et qui diffère cependant de *T. indivisa* et des autres espèces de cette région. Il est probable, ainsi que l'admet ALLMAN (1871, p. 413) que van BENEDEN a confondu plusieurs espèces en faisant sa description de *T. calamaris*.

Nous avons fait figurer la *T. calamaris* de BENEDEN dans la synonymie de *T. indivisa*, mais avec un ? qu'il convient d'ajouter en tête des lignes 32 et 33, p. 127 des Matériaux II.

Tubularia insignis Allman.

<i>Tubularia insignis</i>	ALLMAN	1871	p. 405.
---------------------------	--------	------	---------

Tubularia larynx Ellis et Solander.

Voir : Matériaux I, p. 480 et II, p. 128.

Syn. : *Tubularia coronata* Abildgaard.

Voir : Matériaux I, p. 479 et II, p. 126.

<i>Tubularia muscoides</i>	BELLAMY	1839	p. 271.
<i>Tubularia larynx</i>	FORBES	1851	p. 245.
<i>Tubularia muscoides</i>	FORBES	1851	p. 197.
<i>Tubularia coronata</i>	MAITLAND	1851	p. 41.
<i>Tubularia larynx</i>	MAITLAND	1851	p. 42.
<i>Tubularia gracilis</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 118.
<i>Tubularia larynx</i>	LANDSBOROUGH	1852	p. 117, pl. 2, fig. 4.
<i>Tubularia coronata</i>	KÖLLIKER	1853 (a)	p. 300.
<i>Tubularia larynx</i>	SARS	1853	p. 379, 387.
<i>Tubularia coronata</i>	GEGENBAUR	1854	p. 180, 185, 201, 217.
<i>Tubularia gracilis</i>	IRVINE	1854	p. 245.

<i>Tubularia larynx</i>	IRVINE	1854	p. 245.
» »	STIMPSON	1854	p. 9.
» »	GOSSE	1855	p. 20.
<i>Tubularia gracilis</i>	GOSSE	1855	p. 20.
<i>Tubularia larynx</i>	THOMPSON	1856	p. 451, 452.
» »	SARS	1857 (a)	p. 132, 154.
» »	SARS	1857 (b)	p. 192, 193, 200.
<i>Tubularia coronata</i>	SARS	1857 (a)	p. 153.
<i>Tubularia larynx</i>	WRIGHT	1857 (a)	p. 303.
» »	ALDER	1858	p. 98, 106, 107.
<i>Tubularia gracilis</i>	ALDER	1858	p. 99, 107.
<i>Tubularia larynx</i>	WRIGHT	1858 (c)	p. 432.
<i>Tubularia coronata</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 122, 155.
<i>Tubularia larynx</i>	SARS	1860	p. 348. (Trad. allem.).
<i>Thamnocnidia coronata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 242 et 342.
<i>Tubularia larynx</i>	GRUBE	1861	p. 131.
» »	HINCKS	1861 (c)	p. 160.
<i>Tubularia gracilis</i>	HINCKS	1861 (c)	p. 160.
<i>Tubularia larynx</i>	WRIGHT	1861 (b)	p. 129.
<i>Tubularia coronata</i>	ALLMAN	1862	p. 55.
» »	KIRCHENPAUER	1862	p. 11, 12, 14, 40, 52, 57.
<i>Tubularia larynx</i>	KIRCHENPAUER	1862	p. 6, 12-14, 40, 44, 45, 47, 48, 52, 55, 57.
<i>Tubularia gracilis</i>	NORMAN	1862	p. 152.
» »	ALDER	1863	p. 233.
» »	ALDER	1863 (a)	p. 289.
<i>Tubularia coronata</i>	CLAPARÈDE	1863 (b)	p. 2.
<i>Tubularia muscoides</i>	HALLIER	1863	p. 279.
<i>Tubularia larynx</i>	WRIGHT	1863 (b)	p. 283, 378.
» »	ALDER	1864	p. 192.
<i>Tubularia gracilis</i>	ALDER	1864	p. 192.
<i>Tubularia larynx</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 367.
<i>Tubularia coronata</i>	ALLMAN	1864 (a)	p. 363.
» »	ALLMAN	1864 (c)	p. 367.
? <i>Syncoryne bryoides</i>	ALLMAN	1864 (c)	p. 357. Excl. syn.
<i>Tubularia coronata</i>	ALLMAN	1864 (d)	p. 60.
<i>Thamnocnidia coronata</i>	CLARK	1864	p. 61.

<i>Tubularia larynx</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 196, 225, 226.
<i>Thamnocnidia coronata</i>	KÖLLIKER	1865 p. 105.
<i>Tubularia gracilis</i>	MC INTOSH	1866 p. 602.
<i>Tubularia larynx</i>	PARFITT	1866 (a) p. 6.
<i>Tubularia gracilis</i>	PARFITT	1866 (a) p. 7.
» »	ALDER	1867 p. 49.
<i>Tubularia larynx</i>	ALDER	1867 p. 49.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 104, 107, 115.
<i>Tubularia coronata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 102, 106, pl. 4.
<i>Tubularia larynx</i>	HELLER	1868 p. 32, 81.
» »	HINCKS	1868 p. 118, pl. 21, fig. 1.
<i>Tubularia coronata</i>	HINCKS	1868 p. 119, pl. 21, fig. 2.
» »	NORMAN	1869 p. 324.
<i>Tubularia larynx</i>	NORMAN	1869 p. 324.
» »	ANDREWS	1870 p. 479.
» »	HERKLOTS	1870 p. 397, pl. 39, fig. 4.
» »	ALLMAN	1871 p. 40... 168, fig. 45 et p. 406, pl. 21.
<i>Tubularia coronata</i>	METZGER	1871 (a) p. 25, 35.

Nous avons suivi l'exemple de HINCKS en séparant la *T. larynx* de la *T. coronata* bien que leur identité ait été déjà admise par SARS (1857 et 60), ALDER (1858) et ALLMAN (1871). Mais FENCHEL (1905) a démontré, à la suite de longues et consciencieuses observations, que ces deux espèces étaient synonymes ; il convient donc de les réunir.

Dans les Matériaux II, p. 128, 3 lignes avant la fin, supprimer : « *Tubularia muscoides* THOMPSON 1840, p. 250 » qui doit prendre place dans les synonymies de *Coryne muscoides*.

Tubularia mesembryanthemum Allman.

<i>Tubularia mesembryanthemum</i>	ALLMAN	1871 p. 418, p. 83 et 84.
-----------------------------------	--------	---------------------------

Tubularia microcephala (A. Agassiz).

<i>Parypha microcephala</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 195, 223.
-----------------------------	-------------	-----------------------

Tubularia pacifica Allman.

<i>Thamnocnidia tubularoides</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 196, 223.
<i>Tubularia pacifica</i>	ALLMAN	1871 p. 416.

Tubularia polycarpa Allman.

<i>Tubularia polycarpa</i>	ALLMAN	1871 p. 413.
----------------------------	--------	--------------

Tubularia regalis Boeck.

<i>Tubularia regalis</i>	BOECK	1860 p. 114, pl. 3.
»	ALLMAN	1871 p. 404.

Tubularia simplex Alder.

<i>Tubularia Dumortierii</i>	JOHNSTON	1847 p. 50, pl. 7, fig. 1-2.
»	LANDSBOROUGH	1852 p. 117.
»	ALDER	1858 p. 96, 99, 106.
<i>Tubularia simplex</i>	ALDER	1863 p. 232, pl. 8, fig. 3-4.
»	ALDER	1863 (a) p. 289.
»	ALLMAN	1864 (c) p. 367.
»	ALLMAN	1864 (d) p. 60.
<i>Tubularia Dumortierii</i>	PARFITT	1866 (a) p. 6.
<i>Tubularia simplex</i>	ALDER	1867 p. 49.
»	HINCKS	1868 p. 121, pl. 22, fig. 1.
»	ALLMAN	1871 p. 169, 411.

L'espèce décrite sous le nom de *Tubularia dumortieri* par JOHNSTON (1847, p. 50, pl. 7, fig. 1-2) figure à tort dans nos Matériaux (II, p. 126) parmi les synonymes de *Tubularia dumortieri* van Beneden. Il s'agit, ainsi que ALDER (1863, p. 232), HINCKS (1868, p. 121) et ALLMAN (1871, p. 411) l'ont reconnu, d'une autre espèce, la *Tubularia simplex* d'ALDER.

Tubularia spectabilis (L. Agassiz).

<i>Thamnocnidia spectabilis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 271 et 342, pl. 22, fig. 1-20.
<i>Tubularia spectabilis</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 367.

<i>Thamnocnidia spectabilis</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 396.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 195, 225.
<i>Tubularia spectabilis</i>	ALLMAN	1871 p. 414.
<i>Tubularia (Thamnocnidia)</i>		
<i>spectabilis</i>	ALLMAN	1871 p. 76.

Tubularia tenella (L. Agassiz).

<i>Thamnocnidia tenella</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 275 et 342, pl. 22, fig. 24-30.
<i>Tubularia tenella</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 367.
<i>Thamnocnidia tenella</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 195, 225.
<i>Tubularia tenella</i>	ALLMAN	1871 p. 415.

Gen. *Turris* Lesson 1843.

LESSON a donné, en 1843, le nom de *Turris* à un genre de Méduse. Mais ce n'est qu'en 1859 que WRIGHT a décrit le Polype qui donne naissance à la Méduse *Turris neglecta*. (Voir : gen. *Clavula*.)

Turris neglecta Lesson.

Voir : Matériaux I, p. 488 et II, p. 152.

<i>Medusa sanguinolenta</i>	MODEER	1791 (a) p. 242.
<i>Turris neglecta</i>	BUSK	1852 (a) p. 15, pl. 5 et pl. 6, fig. 8-12.
»	GOSSE	1853 (a) p. 348, 410, pl. 13, fig. 6-10.
»	MC CRADY	1859 (a) p. 61, 63, 65, 85.
»	PATTERSON	1859 p. 279.
»	WRIGHT	1859 (a) p. 105.
<i>Clavula gossii</i>	WRIGHT	1859 (a) p. 106, pl. 8, fig. 1.
<i>Turris neglecta</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 346.
? <i>Pandea globulosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
<i>Turris neglecta</i>	GREENE	1861 p. 63, fig. 13.
»	WRIGHT	1861 (b) p. 126.
<i>Clavula gossii</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 126.

<i>Turris neglecta</i>	WRIGHT	1862 (c) p. 221.
» »	WRIGHT	1863 (b) p. 280.
<i>Clavula gossii</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 280.
<i>Turris neglecta</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 415.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 352.
? <i>Pandea globulosa</i>	KÖLLIKER	1864 p. 233.
? » »	KÖLLIKER	1865 p. 98, 101, pl. 10, fig. 1.
<i>Turris neglecta</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 55.
? <i>Oceania sanguinolenta</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 94.
<i>Turris neglecta</i>	HINCKS	1868 p. 13, pl. 3, fig. 1.
? <i>Pandea globulosa</i>	NORMAN	1869 p. 257, 326.
<i>Turris neglecta</i>	ALLMAN	1871 p. 97, 259.

Gen. *Vorticlava* Alder 1856.

Vorticlava humilis Alder.

<i>Vorticlava humilis</i>	ALDER	1856 (a) p. 353, pl. 12, fig. 1-4.
» »	ALDER	1858 p. 100, pl. 3, fig. 1-4.
» »	GREENE	1861 p. 85, fig. 17 (a, b).
» »	HINCKS	1861 (c) p. 157 (Ex. syn.?).
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 358.
» »	PARFITT	1866 (a) p. 5.
» »	HINCKS	1868 p. 132, pl. 23, fig. 1.
» »	ALLMAN	1871 p. 372.

Vorticlava proteus Wright.

<i>Vorticlava proteus</i>	WRIGHT	1863 (b) p. 439, pl. 17, fig. 1-6.
» »	ALLMAN	1864 (c) p. 358.
» »	HINCKS	1868 p. 133, pl. 23, fig. 2.
» »	ALLMAN	1871 p. 373.

Gen. *Wrightia* L. Agassiz 1862.

Le genre *Wrightia*, établi par L. AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 354) a été abandonné. Il renfermait des espèces qui rentrent

dans les genres *Campanulina* et *Calycella*. Mais le nom de *Wrightia* a été repris par ALLMAN (1871, p. 299) qui l'attribue à un tout autre genre d'Hydroïdes. (Voir : gen. *Wrightia* Allman).

Gen. *Wrightia* Allman 1871.

Le nom de *Wrightia* a été introduit par ALLMAN (1871, p. 299) pour remplacer celui d'*Atractylis* Wright, déjà employé en botanique.

Wrightia arenosa (Alder).

<i>Atractylis arenosa</i>	ALDER	1862	p. 313, pl. 13, fig. 5-7.
»	»	ALDER	1863 p. 231, pl. 9, fig. 5-7.
»	»	HINCKS	1863 p. 46.
»	»	WRIGHY	1863 (b) p. 349, pl. 15, fig. 7-10.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 363.
»	»	HINCKS	1868 p. 88, pl. 16, fig. 1.
<i>Wrightia arenosa</i>	ALLMAN	1871	p. 300.
<i>Wrightia (Atractylis) arenosa</i>	ALLMAN	1871	p. 49.

Gen. *Zanclea* Gegenbaur 1856.

Le genre *Zanclea* a été établi par GEGENBAUR (1856 (b), p. 229) pour une nouvelle espèce de Méduse, *Z. costata*.

MAC CRADY, quelques années plus tard (1859 (b), p. 151) décrivit une autre espèce de Méduse qu'il fit rentrer, après quelques hésitations, dans le genre *Zanclea* (*Z. gemmosa*). Il ajoutait que si un examen plus approfondi de cette espèce montrait qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le genre *Zanclea*, on pourrait créer pour elle le genre *Gemmaria*. Aujourd'hui la plupart des auteurs, et entre autres ALLMAN, placent l'espèce de MAC CRADY dans le genre *Gemmaria*, où ils font rentrer également, sous le nom de *G. implexa*, la *Tubularia implexa* d'ALDER.

HINCKS (1868, p. 59) au contraire considère *Gemmaria* comme synonyme de *Zanclea* et décrit l'espèce d'ALDER sous le nom de *Zanclea implexa*. Nous n'avons pas adopté sa manière de voir et suivrons l'exemple d'ALLMAN.

La forme Polype de la *Zanclea costata* de GEGENBAUR n'étant pas connue, nous n'avons pas, pour le moment, d'espèce d'Hydroïde à faire figurer dans ce genre.

Gen. *Zygodactyla* Brandt 1834.

Le nom de *Zygodactyla* a été employé pour la première fois par BRANDT (1834) pour désigner un sous-genre de Méduses rentrant dans le genre *Mesonema* de la famille des *Aequoridae*. Il y plaçait la *Mesonema (Zygodactyla) coeruleascens*.

GOSSE (1853 (a)) a décrit et figuré sous le nom d'*Aequorea vitrina* une Méduse qui est très probablement l'*Aequorea allantophora* de PERON et LESUEUR et à laquelle AGASSIZ (1860-62, vol. 4, p. 361) et ALLMAN (1864 (c) p. 377) donnent le nom de *Zygodactyla vitrina*, tandis que HAECKEL la nomme *Polycanna vitrina*.

La forme Polype de cette espèce ayant été découverte par WRIGHT (1862 (a)), il semble naturel de suivre l'exemple donné par HINCKS (1868) et de désigner cet Hydroïde sous le nom de *Zygodactyla*.

Zygodactyla vitrina (Gosse).

Syn. : *Polycanna vitrina* Haeckel.

Voir : Matériaux I, p. 486 et II. p. 443.

<i>Aequorea vitrina</i>	GOSSE	1853 (a) p. 340, 345, pl. 23, fig. 1-7.
<i>Aequorea allantophora</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 359.
<i>Zygodactyla vitrina</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 361.
<i>Aequoria vitrina</i>	WRIGHT	1862 (a) p. 316, pl. 45.

<i>Aequorea vitrina</i>	WRIGHT	1862 (c) p. 224.
»	ALLMAN	1864 (a) p. 446.
<i>Zygodactyla vitrina</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 377.
<i>Aequorea vitrina</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 105, 110.
<i>Zygodactyla vitrina</i>	HINCKS	1868 p. 192, pl. 38, fig. 2.
<i>Zygodactyla (Aequorea) vitrina</i>	ALLMAN	1871 p. 97.

MÉDUSES

(Anthoméduses — Leptoméduses).

Aequorea albida A. Agassiz.

<i>Aequorea albida</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 359.
»	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 359.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 110, 224, fig. 160-162.

Aequorea ciliata Eschscholtz.

Voir : Matériaux II, p. 130.

<i>Aequorea ciliata</i>	FORBES	1851 (a) p. 275.
»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 359.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 109, 222.

Aequorea eurodina Péron et Lesueur.

Voir : Matériaux I, p. 481 et II, p. 130.

<i>Aequorea eurodina</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 359.
--------------------------	-------------	-------------------------

Aequorea forskalea Péron et Lesueur.

Voir : Matériaux I, p. 482 et II, p. 130.

<i>Medusa patina</i>	MODEER	1791 (a) p. 93.
----------------------	--------	-----------------

<i>Aequorea forskalea</i>	FORBES	1851 (a) p. 275, pl. 4.
<i>Medusa orologio</i>	CAVOLINI	1853 p. 257.
<i>Aequorea forskahlaea</i>	CHIAIE D.	1853 p. 333.
<i>Aequorea forskalea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 359.
» »	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
<i>Medusa aequorea</i>	GRAY	1869 p. 295.
<i>Aequorea forskalea</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 179.

Aequorea violacea M. Edwards.

Voir : Matériaux II, p. 131.

<i>Aequorea violacea</i>	FORBES	1851 (a) p. 275.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 359.

Amphicodon globosus (Sars).

<i>Steenstrupia globosa</i>	SARS	1860 p. 346 (Trad. allem.).
-----------------------------	------	-----------------------------

Amphinema apicatum (Mac Crady).

<i>Saphenia apicata</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 129, 217, pl. 8, fig. 2-3.
<i>Stomatoca apicata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 168, 224.

Amphinema titania (Gosse).

Voir : Matériaux I, p. 482 et II, p. 131.

<i>Saphenia dinema</i>	PEACH	1850 p. 48.
<i>Saphenia titania</i>	GOSSE	1853 (a) p. 387, pl. 27, fig. 7-9.
» »	MC CRADY	1859 (b) p. 217.
<i>Stomatoca dinema</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
<i>Saphenia dinema</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 168.
» »	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 128.
<i>Stomatoca dinema</i>	NORMAN	1869 p. 326.

Berenice rosea (Lamarck).

Voir : Matériaux I, p. 482 et II, p. 131.

<i>Cuvieria carisochroma</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 345.
------------------------------	-------------	-------------------------

Catablema campanula (Fabricius).

Voir : Matériaux I, p. 482 et II, p. 132.

<i>Medusa campanula</i>	MODEER	1791 (a)	p. 162.
<i>Campanella campanula</i>	MÖRCH	1857	p. 23.
<i>Medusa campanula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 3, p. 48, fig. 22- 23 et vol. 4, p. 349 (Excl. syn.).
<i>Campanella fabricii</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 349 (Excl. syn.).

Catablema vesicaria (A. Agassiz).

<i>Turris vesicaria</i>	AGASSIZ, A.	1865 (a)	p. 97, note.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 164, 225, fig. 261- 268.
»	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 69, fig. 91.

Cladocanna thalassima (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 482 et II, p. 132.

<i>Berenix euchroma</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 345.
<i>Berenix thalassina</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 345.

Cladonema radiatum Dujardin.

Matériaux II, p. 132.

Voir aux Hydroïdes.

Codonium gemmiferum (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 132.

<i>Sarsia gemmifera</i>	GEGENBAUER	1854	p. 208.
»	CLAPARÈDE	1860	p. 403.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 343.
»	GREENE	1861	p. 63, fig. 14 (b).
»	KEFERSTEIN	1862	p. 27.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 190.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 51, 52, 54.
»	NORMAN	1869	p. 327.

Codonium pulchellum (Forbes).

Matériaux II, p. 132.

Voir aux Hydroides : *Syncoryne pulchella*.*Conis mitrata* Brandt.

Voir : Matériaux II, p. 133.

<i>Conis mitrata</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 222, 223.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 346.

Cubogaster gemmascens Haeckel.

<i>Cubogaster gemmascens</i>	HAECKEL	1864 p. 327, 341.
» »	SPAGNOLINI	1871 p. 215.

Cytaeis macrogaster Haeckel.

<i>Cytaeis tetrastyla</i>	EYDOUX et SOULEYET	1852 p. 641, pl. 2, fig. 4-15.
? » »	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 18, 51, 54.
» »	SPAGNOLINI	1871 p. 214.

Cytaeis polystyla Will.

<i>Cytaeis polystyla</i>	WILL	1844 p. 68, pl. 2, fig. 5.
» »	GEGENBAUR	1856 (b) p. 228.
<i>Hypsonema polystyla</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 366.
<i>Cytaeis polystyla</i>	HELLER	1868 p. 83.
<i>Cytaeis polystyla</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 214.

Cytaeis pusilla Gegenbaur.

<i>Cytaeis pusilla</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 228, 268, pl. 8, fig. 8.
? <i>Turritopsis pusilla</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 217.
<i>Cytaeis pusilla</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 371.
» »	KEFERSTEIN u. EHLERS	1861 p. 79, 84, pl. 1, fig. 24-25 et pl. 13, fig. 8-9.

<i>Cytaeis pusilla</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 51, 52, 54.
»	»	SPAGNOLINI	1868 p. 555.
»	»	SPAGNOLINI	1871 p. 213.

Cytaeis tetrastyla Eschscholtz.

Voir : Matériaux II, p. 133.

<i>Bougainvillia mediterranea</i>	BUSCH	1854	p. 2, 21, 22, pl. 2, fig. 10-11.
»	»	GEGENBAUR	1854 p. 208.
<i>Cytaeis tetrastyla</i>	GEGENBAUR	1856 (b)	p. 228.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 341.
»	»	KEFERSTEIN u.	
	EHLERS	1861	p. 85.
<i>Bougainvillia mediterranea</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 18, 51-54.
<i>Cytaeis tetrastyla</i>	HELLER	1868	p. 83.

Dinema ocellata (Busch).

<i>Sarsia ocellata</i>	BUSCH	1851	p. 16, 20, pl. 2, fig. 4-3.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 340.

Dinema slabberi van Beneden.

Voir : Matériaux I, p. 483 et II, p. 133.

<i>Dinema slabberi</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 130, pl. 9-10.
------------------------	---------------	----------	-------------------

Dipleurosoma typica Boeck.

<i>Dipleurosoma stuvitzii</i>	BOECK	1861	p. 152.
»	»	BOECK	1868 p. 141, fig.
<i>Dipleurosoma typica</i>	BOECK	1868	p. 141, fig.

Dipurena catenata (Forbes).

<i>Slabberia catenata</i>	FORBES	1853	p. 314, pl. 10, fig. 3.
---------------------------	--------	------	-------------------------

Dipurena cervicata Mac Crady.

<i>Dipurena cervicata</i>	MC CRADY	1859 (b)	p. 136.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 341.

<i>Dipurena conica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 341.
<i>Slabberia conica</i>	GREENE	1861 p. 107, fig. 24 (d).
<i>Dipurena conica</i>	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 341.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 181, 224, fig. 301-305.
<i>Dipurena cervicata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 181, 224.

Dipurena dolichogaster Haeckel.

<i>Dipurena dolichogaster</i>	HAECKEL	1864 p. 327, 337.
<i>Sarsia dolichogaster</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 205.

Dipurena halterata (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 133.

<i>Slabberia halterata</i>	FORBES	1853 p. 312.
» »	MC CRADY	1859 (b) p. 136.
» »	CLAPARÈDE	1860 p. 403.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 341.

Dipurena ophiogaster Haeckel.

<i>Sarsia strangulata</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 369, fig. 8.
» »	ALLMAN	1871 p. 46, 127, fig. 17.

Dipurena strangulata Mac Crady.

<i>Dipurena strangulata</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 135, 136, pl. 9, fig. 1-2.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 341.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 181, 182, 224.

Dyscannota dysdipleura Haeckel.

<i>Willia ornata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 346.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 96, fig. 20-21.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 171, 224, fig. 274 (a)-279.

Dysmorphosa fulgurans A. Agassiz.

<i>Dysmorphosa fulgurans</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 163, 224, 225, fig. 259-260.
------------------------------	-------------	--

Dysmorphosa fulgurans AGASSIZ, A. et E. 1865 p. 75, fig. 105-106.

Ectopleura ochracea A. Agassiz.

<i>Ectopleura ochracea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 343.
»	»	AGASSIZ, A. 1862 (a) p. 343.
»	»	AGASSIZ, A. 1863 (c) p. 191, 224, fig. 320-323.

Eleutheria claparedei Hartlaub 1889.

Eleutheria dichotoma p. p. CLAPARÈDE 1863 (b) p. 4, pl. 1, fig. 4-10.

Eleutheria dichotoma de Quatrefages.

Voir : Matériaux II, p. 133.

<i>Eleutheria</i>	GEGENBAUR	1856 (a) p. 237.
<i>Eleutheria dichotoma</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 341.
»	»	HINCKS 1861 (a) p. 77.
»	»	KEFERSTEIN u.
	EHLERS	1861 p. 86.
»	»	KROHN 1861 p. 158.
»	»	p. p. CLAPARÈDE 1863 (b) p. 4.
»	»	FILIPPI 1866 p. 375, pl. 1.
»	»	BENEDEN (van) 1867 (a) p. 48, 49, 54.

Epenthesis cymbaloidea (Slabber).

Voir : Matériaux I, p. 483 et II, p. 134.

<i>Medusa cymbaloidea</i>	MODEER	1791 (a) p. 239.
? <i>Thaumantias Thompsoni</i>	GOSSE	1856 p. 132.
?	»	» THOMPSON 1856 p. 448.
?	»	» GREENE 1857 p. 175, 176, 243.
?	»	» AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 353.
?	»	» METTENHEIMER 1861 p. 303.
<i>Eucope gemmigera</i>	KEFERSTEIN	1862 p. 28, pl. 2, fig. 9-10.

Epenthesis folleata Mac Crady.

Epenthesis folleata MC CRADY 1859 (b) p. 191.

<i>Oceania folleata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 70, 223.
<i>Epenthesis folleata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 70.

Epenthesis maculata (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 134.

<i>Thaumantias maculata</i>	BUSK	1852 (b) p. 28.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354.
» »	NORMAN	1869 p. 257, 325.

Eucheilota ventricularis Mac Crady.

<i>Eucheilota ventricularis</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 187, pl. 11, fig. 1-2 et pl. 12, fig. 1-2.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 94, fig. 16-17.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 74, 76, 223, 224, fig. 104-105.

Eucope affinis Gegenbaur.

<i>Eucope affinis</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 244, 268, pl. 9, fig. 12-13.
» »	MC CRADY	1859 (b) p. 187.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354.
» »	CLAUS	1864 p. 391.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 78.
» »	HINCKS	1868 p. 143.

D'après HINCKS (1868, p. 143) cette espèce est la Méduse de la *Clytia johnstoni*.

Eucope articulata A. Agassiz.

<i>Eucope articulata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 82, 86, 89, fig. 130-131 et p. 224.
--------------------------	-------------	---

Espèce douteuse !

Eucope campanulata Gegenbaur.

<i>Eucope campanulata</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 243, 268, pl. 9, fig. 9-10.
---------------------------	-----------	---

<i>Eucope campanulata</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 194.
»	»	AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 354.
»	»	KEFERSTEIN u.
	EHLERS	1861 p. 88.
»	»	CLAUS 1864 p. 391.
»	»	AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 78.
»	»	HINCKS 1868 p. 143.

D'après HINCKS (1868, p. 143) cette espèce est la Méduse de la *Clytia johnstoni*.

Eucope minuta Metschnikoff.

<i>Eucope minuta</i>	METSCHNIKOFF	1870 p. 282.
----------------------	--------------	--------------

Eucope octona (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 134.

<i>Thaumantias octona</i>	PEACH	1850 p. 48.
»	»	PEACH 1851 p. 20.
»	»	BUSK 1852 (b) p. 28.
»	»	AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 354.
»	»	METTENHEIMER 1861 p. 303.

Eucope parasitica A. Agassiz.

<i>Eucope parasitica</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 87, 224.
--------------------------	-------------	----------------------

Espèce douteuse !

Eucope polygena A. Agassiz.

<i>Eucope polygena</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 82, 86, 87, fig. 126, 224.
------------------------	-------------	---

Espèce douteuse !

Eucope pontica Metschnikoff.

<i>Eucope pontica</i>	METSCHNIKOFF	1870 p. 282.
-----------------------	--------------	--------------

Eucope thaumantoides Gegenbaur.

<i>Eucope thaumantoides</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 243, 268, pl. 8, fig. 18.
-----------------------------	-----------	--

<i>Eucope thaumantoides</i>	CARUS	1857	pl. 2, fig. 13.
»	»	MC CRADY	1859 (b) p. 187, 188, 191.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354.
»	»	CLAUS	1864 p. 391.
»	»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 78.
»	»	HINCKS	1868 p. 143.

HINCKS (1868, p. 143) rapporte cette Méduse à la *Clytia johnstoni*, tandis que HAECKEL la considère comme synonyme de *Phialidium variabile*.

Eucopium pictum Keferstein et Ehlers.

<i>Eucope picta</i>	KEFERSTEIN U. EHLERS	1861	p. 88, pl. 13, fig. 11-12.
»	»	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
»	»	SPAGNOLINI	1871 p. 185.

Eucopium quadratum (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 134.

<i>Thaumantias quadrata</i>	BUSK	1852 (b)	p. 28.
»	»	MC CRADY	1859 (b) p. 194.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354.

Euphysa aurata Forbes.

Voir : Matériaux II, p. 134.

<i>Euphysa aurata</i>	LEUCKART	1856 (a)	p. 28.
»	»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 343.
»	»	KÖLLIKER	1864 p. 233.
»	»	KÖLLIKER	1865 p. 98.
»	»	NORMAN	1869 p. 327.
»	»	SPAGNOLINI	1871 p. 211.

Euphysa mediterranea Haeckel.

<i>Euphysa mediterranea</i>	HAECKEL	1864	p. 327, 338.
»	»	SPAGNOLINI	1871 p. 212.

Euphysa virgulata A. Agassiz.

<i>Euphysa virgulata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 189, 225, fig. 316-319.
--------------------------	-------------	-------------------------------------

Eutima insignis (Keferstein).

<i>Siphonorrhynchus insignis</i>	KEFERSTEIN	1862 p. 29, pl. 2, fig. 3-8.
----------------------------------	------------	------------------------------

Eutima limpida A. Agassiz.

<i>Eutima limpida</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 363.
»	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 363.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 116, 118, 224, fig. 173-178.

Eutima mira Mac Crady.

<i>Eutima mira</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 190, 208, 209, pl. 11, fig. 8-9.
»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 363.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 116, 118, 223.

Eutima pyramidalis L. Agassiz.

<i>Eutima pyramidalis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 363.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 118, 223.

Gemmaria cladophora A. Agassiz.

<i>Gemmaria cladophora</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 184, 225, fig. 307-310.
----------------------------	-------------	-------------------------------------

Gemmaria gemmosa Mac Crady.

<i>Zanctea gemmosa</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 151, pl. 8, fig. 4-5.
»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 344.
<i>Gemmaria gemmosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 184, 224, fig. 306.

Globiceps globator (Leuckart).

<i>Euphysa globator</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 28, pl. 2, fig. 4-5.
-------------------------	----------	----------------------------------

<i>Euphysa globator</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 344.
»	HAECKEL	1864	p. 326.
<i>Euphysa globator</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 210.

Gonionemus vertens A. Agassiz.

<i>Gonionemus vertens</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 350.
»	AGASSIZ, A.	1862 (a)	p. 350.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 128, 222, fig. 197-201.

Halopsis ocellata A. Agassiz.

<i>Halopsis ocellata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (b)	p. 220.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 99, 102, 103, 225, fig. 143-150.

Hippocrene macloviana (Lesson).

Voir : Matériaux II, p. 135.

<i>Bougainvillia macloviana</i>	LEUCKART	1856 (a)	p. 25.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 344.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 152.

Hippocrene mertensi A. Agassiz.

Voir : Matériaux II, p. 135.

<i>Bougainvillia mertensii</i>	AGASSIZ, A.	1860-62	vol. 4, p. 344.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 152, 222, 223.
<i>Hippocrene mertensi</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 156.
<i>Bougainvillia mertensii</i>	ALLMAN	1871	p. 318.

Hippocrene pyramidata Forbes.

<i>Hippocrene pyramidata</i>	FORBES	1853	p. 312, pl. 10, fig. 4.
------------------------------	--------	------	-------------------------

Hippocrene superciliaris L. Agassiz.

Matériaux II, p. 135.

Voir aux Hydroïdes : *Bougainvillia superciliaris*.

Irene coerulea L. Agassiz.

<i>Eirene coerulea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 362.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 112, 223, fig. 163.

Irene gibbosa Mac Crady.

<i>Phortis gibbosa</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 193.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 362.
<i>Eirene gibbosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 112, 223.

Irene pellucida (Busk).

Voir : Matériaux I, p. 483 et II, p. 135.

<i>Geryonia pellucida</i>	BUSK	1852 (b) p. 26.
» »	GEGENBAUR	1856 (b) p. 252.
<i>Geryonia (Geryonopsis)</i> <i>pellucida</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 9, note.
? <i>Timagibbosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 362.
<i>Tima cari</i>	HAECKEL	1864 p. 327, 332.
<i>Geryonia pellucida</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 87.
» »	HELLER	1868 p. 83.
<i>Tima cari</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 177.

Irene viridula (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 483 et II, p. 136.

<i>Geryonopsis delicatula</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 252.
» »	GREENE	1857 p. 175, 176, 243.
<i>Irene viridula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 362.
<i>Eirene viridula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 362.
<i>Geryonopsis delicatula</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 87.
<i>Geryonopsis forbesii</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 87, pl. 3.

Laodicea calcarata A. Agassiz.

<i>Laodicea calcarata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 350.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 350.

<i>Laodicea calcarata</i>	HAECKEL	1864 p. 335.
»	»	AGASSIZ, A. 1865 (a) p. 91.
»	»	AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 122.
»	»	SPAGNOLINI 1871 p. 194.

Laodicea cruciata (Forskål).

Voir : Matériaux I, p. 483 et II, p. 136.

<i>Medusa marginata</i>	MODEER	1791 (a) p. 169.
<i>Medusa cacuminata</i>	MODEER	1791 (a) p. 239.
<i>Medusa cruciata</i>	TURTON a. KINGSTON	1830 (sans pagination).
<i>Thaumantias undulata</i>	FORBES	1853 p. 313, pl. 10, fig. 7.
<i>Thaumantias (Cosmetira)</i> <i>pilosella</i>	GOSSE	1853 (a) p. 334, 344, 359.
<i>Thaumantias mediterranea</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 237, 268, pl. 8, fig. 1-3.
<i>Thaumantias pilosella</i>	GEGENBAUR	1856 (a) p. 237, 238.
<i>Oceania cruciata</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 205.
<i>Thaumantias corollata</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 16 ss., pl. 1, fig. 11.
<i>Thaumantias pilosella</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 17.
<i>Thaumantias mediterranea</i>	CARUS	1857 pl. 2, fig. 11.
»	»	SARS 1859 p. 2.
<i>Laodicea cruciata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 350.
<i>Laodicea stauroglypha</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 350. (Ex. syn. p. p.).
<i>Thaumantias mediterranea</i>	KEFERSTEIN u.	
	EHLERS	1861 p. 87.
<i>Thaumantias pilosella</i>	METTENHEIMER	1861 p. 303.
<i>Thaumantias mediterranea</i>	AGASSIZ, A.	1862 p. 225.
<i>Cosmetira mediterranea</i>	HAECKEL	1864 p. 327.
<i>Cosmetira pilosella</i>	HAECKEL	1864 p. 335.
<i>Cosmetira punctata</i>	HAECKEL	1864 p. 327, 334.
<i>Thaumantias corollata</i>	HAECKEL	1864 p. 326, 335.
<i>Thaumantias mediterranea</i>	HAECKEL	1864 p. 335.
»	»	AGASSIZ, A. 1865 (a) p. 91.
<i>Thaumantias pilosella</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 68, 103.
<i>Oceania crucigera</i> Esch. sec.	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
<i>Thaumantias mediterranea</i>	SPAGNOLINI	1868 p. 556.

<i>Laodice stauroglypha</i>	NORMAN	1869	p. 326.
<i>Callirhoë basteriana</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.
<i>Thaumantias mediterranea</i>	PANCERI	1871	p. 141, 142.
<i>Cosmetica pilosella</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 194.
<i>Thaumantias corollata</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 192, 194.
<i>Thaumantias mediterranea</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 191, 194.

Laodicea ulothryx Haeckel.

<i>? Thaumantias confluens</i>	FORBES	1853	p. 315, pl. 10, fig. 8.
--------------------------------	--------	------	-------------------------

Limnorea proboscidea Haeckel.

Voir : Matériaux I, p. 484 et II, p. 137.

Lizzella hyalina (van Beneden).

<i>Circe hyalina</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 95, pl. 3, fig. 14.
----------------------	---------------	----------	------------------------

Lizzia blondina Forbes.

Voir : Matériaux II, p. 137.

<i>Lyzzia blondina</i>	PEACH	1850	p. 48.
»	BUSCH	1851	p. 20, 23.
»	GEGENBAUR	1854	p. 208.
»	GEGENBAUR	1856 (b)	p. 225.
»	CLAPARÈDE	1860	p. 402.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 345.
»	KÖLLIKER	1864	p. 234.
»	KÖLLIKER	1865	p. 98, pl. 10, fig. 2.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 52.
<i>Cytheis blondina</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 52.
<i>Cytheis blondina</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 54.
<i>Lizzia blondina</i>	NORMAN	1869	p. 257, 327.

Lizzia claparedei Haeckel.

<i>Lizzia</i> sp. ?	CLAPARÈDE	1860	p. 401, pl. 32, fig. 1-3.
<i>Lizzia</i> n. sp. de Claparède	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 55.

Margelis carolinensis L. Agassiz.

Voir aux Hydroïdes : *Bougainvillia carolinensis*.

Margelis maniculata Haeckel.

Bougainvillia maniculata HAECKEL 1864 p. 327, 340.

Lizzia maniculata SPAGNOLINI 1871 p. 249.

Margelis principis Steenstrup.

Voir : Matériaux II, p. 137.

Margelis principis AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 344.

Margelis ramosa L. Agassiz.

Matériaux II, p. 138.

Voir aux Hydroïdes : *Bougainvillia ramosa*.

Margelis zygonema Haeckel.

Bougainvillia dinema GREENE 1857 p. 243, 246, pl. 15,
fig. 6.

Bougainvillea dinema GREENE 1861 p. 117, fig. 24 (f. g.).

Margellium gratum (A. Agassiz).

Lizzia grata AGASSIZ, A. 1865 (a) p. 99, fig. 28-29.

» » AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 161, 225, fig. 251-
258.

Margellium octopunctatum Haeckel.

Matériaux II, p. 138.

Voir : *Rathkia octopunctata*.

Melicertidium octocostatum (Sars).

Voir : Matériaux II, p. 138.

Melicertum campanulatum THOMPSON 1856 p. 447.

<i>Stomobrachium octocostatum</i>	GREENE	1857	p. 243, 244.
<i>Melicertum pusillum</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 349.
<i>Stomobrachium octocostatum</i>	WRIGHT	1861	(b) p. 127.
»	»	WRIGHT	1863 (b) p. 280.
<i>Melicertum pusillum</i>	KÖLLIKER	1864	p. 233.
»	KÖLLIKER	1865	p. 98.
<i>Stomobrachium octocostatum</i>	AGASSIZ, A.	1865	(c) p. 131.
»	WRIGHT	1867	p. 42, pl. 1, fig. 1.

Melicertum campanula L. Agassiz.

<i>Melicertum campanula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 349 et 360, note.
»	AGASSIZ, A.	1865	(a) p. 96, fig. 18-19.
»	AGASSIZ, A.	1865	(c) p. 130, 141, 225, 226, fig. 202-214. (Excl. syn.).
»	AGASSIZ, E. et A.	1865	p. 63, fig. 79-82.
»	ALLMAN	1871	p. 97.

Melicertum georgicum A. Agassiz.

<i>Melicertum georgicum</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 349.
»	AGASSIZ, A.	1862	(a) p. 349.
»	AGASSIZ, A.	1865	(a) p. 135, 222, fig. 215- 216.

Mesonema abbreviata Eschscholtz.

Voir : Matériaux II, p. 138.

<i>Mesonema abbreviata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 360.
----------------------------	-------------	---------	-----------------

Mesonema coerulescens Brandt.

Voir : Matériaux II, p. 139.

<i>Zygodactyla coerulescens</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 360.
»	AGASSIZ, A.	1865	(c) p. 108, 222.
<i>Mesonema (Zygodactyla)</i> <i>coerulescens</i>	AGASSIZ, A.	1865	(c) p. 119.

Mesonema cyaneum (L. Agassiz).

<i>Zygodactyla cyanea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 361.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 107, 223, fig. 159.

Mesonema dubium Brandt.

Voir : Matériaux II, p. 139.

<i>Zygodactyla dubia</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 360.
--------------------------	-------------	-------------------------

Mesonema macrodactylum Brandt.

Voir : Matériaux II, p. 139.

<i>Mesonema macrodactylum</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 360.
-------------------------------	-------------	-------------------------

Mesonema pensile Haeckel.

Voir : Matériaux I, p. 484 et II, p. 139.

<i>Medusa coelum-pensile</i>	MODEER	1791 (a) p. 95.
<i>Mesonema coerulescens</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 325, 326.
<i>Stomobrachium mirabile</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 324, 325.
»	GEGENBAUR	1854 p. 214.
<i>Mesonema coerulescens</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 240.
»	MC CRADY	1859 (a) p. 81.
<i>Stomobrachium mirabile</i>	MC CRADY	1859 (a) p. 81.
<i>Mesonema coelum pensile</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 360.
<i>Stomobrachium mirabile</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 361.
»	ALLMAN	1864 (a) p. 403.
<i>Mesonema coerulescens</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 403.
<i>Mesonema coelum pensile</i>	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
<i>Stomobrachium mirabile</i>	ALLMAN	1871 p. 151.
<i>Mesonema coerulescens</i>	ALLMAN	1871 p. 151.
<i>Mesonema coelum pensile</i>	PANCERI	1871 p. 141.
»	SPAGNOLINI	1871 p. 181.
<i>Mesonema coerulescens</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 181. Excl. syn. p. p.
<i>Stomobrachium mirabile</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 221.

Mitrocoma annae Haeckel.

<i>Mitrocoma annae</i>	HAECKEL	1864 p. 327, 332.
------------------------	---------	-------------------

Mitrocoma annae SPAGNOLINI 1871 p. 182.

Modeeria formosa Forbes.

Voir : Matériaux II, p. 140.

Modeeria formosa BUSK 1852 (b) p. 28.
 » » AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 347.

Nemopsis bachei L. Agassiz.

Matériaux II, p. 140.

Voir aux Hydroïdes.

Nemopsis crucifera (Forbes).

Hippocrene cruciata FORBES 1853 p. 315, pl. 10, fig. 5.
Hippocrene crucifera FORBES 1853 p. 313.
Hippocrene (Bougainvillea)
cruciata WRIGHT 1858 (a) p. 450.

Nemopsis faronia Haeckel.

Voir : Matériaux I, p. 485 et II, p. 140.

Faronia octonema AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 159.

Obelia diaphana (L. Agassiz).

Matériaux II, p. 140.

Voir aux Hydroïdes : *Obelia geniculata*.

Obelia leucostyla (Will).

Voir : Matériaux II, p. 140.

Thaumantias leucostyla BUSK 1852 (b) p. 27, 28.
Obelia leucostyla AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 351.
Thaumantias leucostyla HELLER 1868 p. 83.

Obelia lucifera (Forbes).

Matériaux II, p. 140.

Voir aux Hydroïdes : *Obelia geniculata*.

Obelia plana (Sars).

Matériaux II, p. 140.

Voir aux Hydroïdes : *Obelia flabellata*.*Obelia polystyla* (Gegenbaur).

<i>Eucope polystyla</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 242, 268, pl. 8, fig. 18.
»	ALLMAN	1859 (c) p. 315, note.
»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 351.
	KEFERSTEIN u.	
»	EHLERS	1861 p. 88, pl. 13, fig. 4.
»	CLAUS	1864 p. 392.
»	HAECKEL	1864 p. 327.
»	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
»	ALLMAN	1871 p. 144.
»	METZGER	1871 (a) p. 35.
»	SPAGNOLINI	1871 p. 184, 186.

Obelia sphaerulina Péron et Lesueur.

Voir : Matériaux I, p. 485 et II, p. 141.

<i>Medusa conifera</i>	MODEER	1791 (a) p. 99.
<i>Obelia sphaerulina</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 315, 351 et 353 (Excl. syn.).
<i>Medusa marina</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 152.

Octorchandra variabilis (Mac Crady).

<i>Eutima variabilis</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 190.
»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 363.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 116, 223.

Octorchis gegenbauri Haeckel.

<i>Octorchis gegenbaurii</i>	HAECKEL	1864 p. 326, 334.
»	SPAGNOLINI	1871 p. 175.

Orchistoma pileus (Lesson).

Voir : Matériaux II, p. 144.

Pandea conica (Quoy et Gaimard).

Voir : Matériaux II, p. 144.

<i>Oceania sedecimcostata</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 324.
» »	GEGENBAUR	1856 (b) p. 224.
<i>Oceania conica</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 221, 267, pl. 7, fig. 1-3.
» »	CARUS	1857 pl. 2, fig. 5.
» »	SARS	1859 p. 2.
<i>Tiara conica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
<i>Oceania pileata</i>	KEFERSTEIN u.	
	EHLERS	1861 p. 81, 83.
<i>Dianaea conica</i>	KEFERSTEIN u.	
	EHLERS	1861 p. 82.
<i>Oceania conica</i>	SPAGNOLINI	1868 p. 556.

Pandea saltatoria (Sars).

Voir : Matériaux I, p. 485 et II, p. 144.

<i>Medusa bimorpha</i>	MODEER	1791 (a) p. 97.
<i>Oceania bimorpha</i>	MÖRCH	1857 p. 23.
<i>Medusa bimorpha</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 226.

Phialidium gregarium (A. Agassiz).

<i>Oceania gregaria</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 353.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 74, fig. 103, 222.

Phialidium languidum (A. Agassiz).

<i>Oceania languida</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 353.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 95 (note).
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 70, 224, 225, fig. 94-102.
» »	AGASSIZ, E. a. A.	1865 p. 53, fig. 65-69.

Phialidium variable (Claus).

Voir : Matériaux I, p. 485 et II, p. 142.

<i>Geryonia planata</i>	BUSK	1852 (b) p. 27.
<i>Thaumantias globosa</i>	BUSK	1852 (b) p. 28.
<i>Thaumantias buskiana</i>	GOSSE	1853 (a) p. 385, pl. 22, fig. 5-11.
<i>Thaumantias dubia</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 324.
<i>Geryonia planata</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 324.
<i>Phialidium viridiscens</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 48, pl. 4, fig. 12.
<i>Thaumantias dubia</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 49.
<i>Thaumantias planata</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 49.
? <i>Thaumantias achroa</i>	COBBOLD	1858 p. 4 ss., pl. 1.
<i>Phialidium viridiscens</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
<i>Thaumantias convexa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
? <i>Thaumantias gibbosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
<i>Geryonia planata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 354.
<i>Thaumantias sarnica</i>	METTENHEIMER	1861 p. 303.
<i>Eucope variabilis</i>	CLAUS	1864 p. 389, pl. 38, fig. 9, 10, 12 et 13.
<i>Phialidium ferrugineum</i>	HAECKEL	1864 p. 327, 333.
<i>Phialidium viridicans</i>	HAECKEL	1864 p. 327, 334.
? <i>Thaumantias gibbosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 103.
<i>Thaumantias globosa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 103.
<i>Thaumantias cymbaloïdes</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 88.
<i>Geryonia planata</i>	HELLER	1868 p. 83.
<i>Phialidium viridicans</i>	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
<i>Thaumantias convexa</i>	NORMAN	1869 p. 325.
<i>Thaumantias globosa</i>	NORMAN	1869 p. 257, 325.
<i>Eucope variabilis</i>	METZGER	1871 (a) p. 35.
<i>Phialidium ferrugineum</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 188.
<i>Phialidium viridicans</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 187, 189.

Phialis cruciata (A. Agassiz).

<i>Halopsis cruciata</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 102, 225, fig. 151-152.
--------------------------	-------------	-------------------------------------

Phialium dodecasema Haeckel.

<i>Eucheilota duodecimalis</i> p.p.	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
-------------------------------------	-------------	-------------------------

<i>Eucheilota duodecimalis</i>	p. p. AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 353.
»	» p. p. AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 75, 224, fig. 106-107.

Phialium duodecimale Haeckel.

<i>Eucheilota duodecimalis</i>	p. p. AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 353.
»	» p. p. AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 353.
»	» p. p. AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 75, 224, fig. 106-107.

Polycanna crassa (A. Agassiz).

<i>Zygodactyla crassa</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 106, 225, fig. 157-158.
---------------------------	-------------	-------------------------------------

Polycanna flava (A. Agassiz).

<i>Crematostoma flava</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 360.
»	» AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 360.
»	» AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 108, 222, fig. 159 (a).

Polycanna groenlandica (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 485 et II, p. 143.

? <i>Medusa aequorea</i>	MODEER	1791 (a) p. 90.
<i>Medusa globularis</i>	MODEER	1791 (a) p. 91.
<i>Rhacostoma atlanticum</i>	AGASSIZ, L.	1851 (b) p. 342.
<i>Aequorea groenlandica</i>	FORBES	1851 (a) p. 275.
<i>Aequorea globularis</i>	MÖRCH	1857 p. 24.
<i>Zygodactyla groenlandica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 360.
»	» AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 103, 106, 107, 131, 224-226, fig. 153-156.
»	» AGASSIZ, E. et A.	1865 p. 57, fig. 74, 75.

Polycanna italica Haeckel.

Voir : Matériaux I, p. 486 et II, p. 143.

Polycanna vitrina Haeckel.

Matériaux I, p. 486 et II, p. 143.

Voir aux Hydroïdes : *Zygodactyla vitrina*.

Polyorchis campanulatus (Chamisso et Eysenhardt).

Voir : Matériaux II, p. 143.

Melicertum campanulatum AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 349.*Polyorchis penicillata* (Eschscholtz).

Voir : Matériaux II, p. 144.

Polyorchis penicillata AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 348, note et 349.

» » AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 119, 222, 223, fig. 179-183.

Proboscidactyla flavicirrata Brandt.

Voir : Matériaux II, p. 144.

Proboscidactyla flavicirrata AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 346.

» » AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 173, 222, fig. 280-282.

Protiara tetranema (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 486 et II, p. 144.

Pteronema ambiguum (Lesson).

Voir : Matériaux II, p. 144.

Zaulea ambigua AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 344.*Ptychogena lactea* A. Agassiz.*Ptychogena lactea* AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 137, fig. 220-224.

» » AGASSIZ, E. et A. 1865 p. 86, 225, fig. 122, 123.

Rathkia blumenbachii (Rathke).

Voir : Matériaux II, p. 144.

Oceania Blumenbachii MC CRADY 1859 (b) p. 159.*Rathkia Blumenbachii* AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 345.

Rathkia fasciculata (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 486 et II, p. 145.

<i>Lizzia köllikeri</i>	GEGENBAUR	1854	p. 176, 180, 181, 195. pl. 2, fig. 1-9.
»	»	GEGENBAUR	1856 (b) p. 225, 268, pl. 7, fig. 5-9.
<i>Bougainvillea köllikeri</i>	LEUCKART	1856 (a)	p. 24, pl. 2, fig. 2-3.
<i>Lizzia köllikeri</i>	SARS	1859	p. 2.
»	»	CLAPARÈDE	1860 p. 404.
<i>Köllikeria fasciculata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 345.
<i>Lizzia köllikeri</i>	KEFERSTEIN U. EHLERS	1861	p. 78, 84, pl. 13, fig. 10.
»	»	ALLMAN	1864 (a) p. 415.
<i>Köllikeria fasciculata</i>	HAECKEL	1864	p. 327.
<i>Lizzia köllikeri</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 55.
»	»	SPAGNOLINI	1868 p. 555.
»	»	ALLMAN	1871 p. 97.
»	»	PANCERI	1871 p. 141.
»	»	SPAGNOLINI	1871 p. 198, 217.

Rathkia octopunctata (Sars).

Voir : Matériaux II, p. 145.

Syn. : *Margellium octopunctatum* Haeckel.

Voir : Matériaux II, p. 138.

<i>Lizzia octopunctata</i>	PEACH	1850	p. 44, 46, 48.
<i>Lizzia (Cytaeis) octopunctata</i>	BUSCH	1851	p. 5, 23.
<i>Cytaeis octopunctata</i>	KROHN	1851	p. 267, 268.
»	»	GEGENBAUR	1854 p. 208.
<i>Lizzia octopunctata</i>	GEGENBAUR	1856 (b)	p. 225.
»	»	PEACH	1856 p. 100.
<i>Lizzia (Cytaeis) octopunctata</i>	CLAPARÈDE	1860	p. 402.
<i>Lizzia octopunctata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 345.
»	»	GREENE	1861 p. 63.

<i>Cytaeis octopunctata</i>	KEFERSTEIN U. EHLEERS	1861	p. 85.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 52.
<i>Lizzia octopunctata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 94, pl. 3, fig. 7-13.
»	NORMAN	1869	p. 326.
<i>Cytaeis octopunctata</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 214.

HARTLAUB (1894) a montré que la *Cytaeis octopunctata* (= *Rathkia octopunctata*) de SARS était bien la même espèce que la *Lizzia octopunctata* de FORBES et que, par conséquent, on n'avait aucune raison de donner à cette dernière espèce le nom de *Margellium octopunctatum* qui doit tomber en synonymie.

Rhegmatodes floridanus L. Agassiz.

<i>Rhegmatodes floridanus</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 361.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 97, 110, 223, fig. 139.

Rhegmatodes globosa (Eschscholtz).

Voir : Matériaux II, p. 145.

<i>Rhegmatodes globosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 361.
----------------------------	-------------	---------	-----------------

Rhegmatodes tenuis A. Agassiz.

<i>Rhegmatodes tenuis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 361.
»	AGASSIZ, A.	1862 (a)	p. 361.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 95, 110, 224, fig. 136-138.

Rhegmatothodes thalassina (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 486 et II, p. 145.

<i>Aequorea cyanea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 359.
------------------------	-------------	---------	-----------------

Saphenia bitentaculata (Quoy et Gaimard).

Voir : Matériaux II, p. 146.

<i>Saphenia balearica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 363.
---------------------------	-------------	---------	-----------------

Saphenia dinema (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 486 et II, p. 146.

<i>Saphenia dinema</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 363 (Excl. syn. p. p.).
------------------------	-------------	---------	------------------------------------

Saphenia mirabilis (Wright).

? <i>Plancia gracilis</i>	FORBES	1853	p. 311, pl. 10, fig. 1.
<i>Goodsirea mirabilis</i>	WRIGHT	1859 (a)	p. 110, pl. 9, fig. 1-3.
»	PEACH	1867	p. 357, pl. 1, fig. 5-10.
»	WRIGHT	1867	p. 44.
»	PEACH	1868	p. 97.

Sarsia clavata Keferstein.

Voir : Matériaux II, p. 146.

<i>Sarsia clavata</i>	KEFERSTEIN	1862	p. 27, pl. 2, fig. 1-2.
? <i>Sarsia decipiens</i>	sec. SPAGNOLINI	1871	p. 205.

Sarsia macrorhyncha Busch.

<i>Sarsia macrorhynchos</i>	BUSCH	1851	p. 10, pl. 3, fig. 7-10, pl. 4, fig. 1-2.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 340.

Sarsia mirabilis L. Agassiz.

Matériaux II, p. 146.

Voir aux Hydroïdes : *Syncoryne mirabilis*.*Sarsia prolifera* Forbes.

Voir : Matériaux II, p. 147.

<i>Sarsia prolifera</i>	PEACH	1850	p. 44, 46, 48.
»	BUSCH	1851	p. 1-10, 14, 17, 18, 21, pl. 1, fig. 1-6, pl. 2, fig. 4-5.
»	GEGENBAUR	1854	p. 208.
»	GREENE	1857	p. 247.

<i>Sarsia prolifera</i>	MC CRADY	1859 (a) p. 74.
»	MC CRADY	1859 (b) p. 215.
»	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 343.
»	GREENE	1861 p. 63, fig. 14 (c).
»	KROHN	1861 p. 168.
»	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 18, 19, 47, 51-54.
»	ALLMAN	1871 p. 151.

Sarsia tubulosa (Sars).

Voir : Matériaux II, p. 147.

<i>Sarsia (Oceania) tubulosa</i>	BUSCH	1851 p. 10, 11.
<i>Oceania tubulosa</i>	DESOR	1851 (b) p. 134.
<i>Sarsia tubulosa</i>	THOMPSON	1856 p. 448.
»	GREENE	1857 p. 175, 176, 243.
»	MEYER U. MÖBIUS	1862 p. 231.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 177.
»	MÖBIUS	1866 p. 9, 11.
»	MARCUSEN	1867 p. 358.
»	NORMAN	1869 p. 323, 327.
<i>Sarsia sarsii</i>	SPAGNOLINI	1871 p. 205.

Staurobrachium stauroglyphum (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 486 et II, p. 147.

<i>Aequorea stauroglypha</i>	FORBES	1851 (a) p. 275.
<i>Aequorea forbesiana</i>	GOSSE	1853 (a) p. 345, 348, pl. 24.
<i>Rhegmatodes forbesianus</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 361.
<i>Aequorea forbesiana</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 95, 110.

Staurophora keithi Peach.

<i>Staurophora keithii</i>	PEACH	1867 p. 359, pl. 2, fig. 1-7.
»	PEACH	1868 p. 97.

Staurophora mertensi Brandt.

Voir : Matériaux II, p. 147.

<i>Staurophora mertensi</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 351.
»	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 137, 222.

Staurophora mertensi PEACH 1867 p. 358.

Staurophora vitrea Sars.

Oceania (Thaumantias)

multicirrata SARS 1851 p. 158.

» » SARS 1863 (a) p. 339.

Staurophora vitrea SARS 1863 (a) p. 339.

Staurostoma laciniata (L. Agassiz).

Voir : Matériaux II, p. 148.

Staurophora laciniata STIMPSON 1854 p. 11.

» » AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 351.

» » SARS 1863 (a) p. 339, 340.

» » AGASSIZ, A. 1865 (a) p. 89, fig. 1-3.

» » AGASSIZ, A. 1865 (c) p. 132, 136, 225, fig.
215 (a)-219.

» » BENEDEN (van) 1867 (a) p. 18, 51, 52, 54.

» » PEACH 1867 p. 358, pl. 2, fig. 8.

Steenstrupia cranoides Haeckel.

Steenstrupia cranoides HAECKEL 1864 p. 327, 339.

» » SPAGNOLINI 1871 p. 209.

Steenstrupia galanthus Haeckel.

Voir : Matériaux II, p. 148.

Steenstrupia rubra PEACH 1850 p. 44, 48.

» » STEENSTRUP 1854 p. 48.

Steenstrupia flaveola GREENE 1857 p. 248.

» » SARS 1860 p. 346 (Trad. allem.).

Steenstrupia rubra SARS 1860 p. 346 (Trad. allem.).

» » AGASSIZ, L. 1860-62 vol. 4, p. 343.

» » KÖLLIKER 1864 p. 234.

» » KÖLLIKER 1865 p. 98.

» » NORMAN 1869 p. 257, 327.

Steenstrupia lineata Leuckart.

<i>Steenstrupia lineata</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 29, pl. 2, fig. 6.
» »	SARS	1860 p. 346 (Trad. allem.).
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 343.
» »	HAECKEL	1864 p. 327.
» »	SPAGNOLINI	1871 p. 208, 210.

Stomobrachium lenticulare Brandt.

Voir : Matériaux II, p. 148.

<i>Stomobrachium lenticulare</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 361.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 99.

Stomobrachium tentaculatum L. Agassiz.

<i>Stomobrachium tentaculatum</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 361.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 98, 225, fig. 140-142.

Stomotoca atra A. Agassiz.

<i>Stomotoca atra</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 347.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 168, 222, fig. 271-273.

Syndictyon nodosum (Busch).

<i>Sarsia nodosa</i>	BUSCH	1851 p. 10, 17, 20, pl. 2, fig. 6-8.
? <i>Oceania thelostyla</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 224, 268, pl. 8, fig. 9-11.
? » »	MC CRADY	1859 (b) p. 137 à 139, 215, 216.
? <i>Syndictyon thelostylum</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 340.
<i>Ectopleura nodosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 343.
<i>Sarsia nodosa</i>	ALLMAN	1864 (c) p. 368.
? <i>Oceania telostyla</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 190.

Tetranema aeronauticum (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 148.

<i>Thaumantias aeronautica</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 194.
--------------------------------	----------	------------------

Thaumantias aeronautica NORMAN 1869 p. 325.

Thamnitis nigrیتella (Forbes).

Voir : Matériaux II, p. 148.

<i>Bougainvillia nigrیتella</i>	PEACH	1850 p. 48.
» »	BUSCH	1851 p. 19.
<i>Hippocrene nigrیتella</i>	FORBES	1853 p. 313.
<i>Hippocrene simplex</i>	FORBES	1853 p. 313, pl. 10, fig. 6.
<i>Bougainvillia nigrیتella</i>	GREENE	1857 p. 246.
<i>Bougainvillea nigrیتella</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 124.
<i>Margelis nigrیتella</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 345.
» »	NORMAN	1869 p. 257, 327.

Thamnostoma dibalia (Busch).

<i>Lizzia dibalia</i>	BUSCH	1851 p. 23, pl. 1, fig. 7-9.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 345, note.
<i>Lizzia debalia</i>	BENEDEN (van)	1867 (a) p. 55.

Thaumantias cellularia (A. Agassiz).

<i>Laodicea cellularia</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 350.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 350.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 127, 222, fig. 195-196.

Thaumantias hemisphaerica (Gronovius).

Voir : Matériaux I, p. 486 et II, p. 148.

<i>Medusa hemisphaerica</i>	MODEER	1791 (a) p. 236.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	LEUCKART	1847 (a) p. 138.
<i>Thaumantias inconspicua</i>	PEACH	1850 p. 45, 48.
» »	PEACH	1851 p. 20.
? <i>Thaumantias inconspicua</i>		
or <i>T. sarnica</i>	BUSK	1852 (b) p. 22, pl. 6, fig. 1-3 et pl. 7.
<i>Medusa emisferica</i>	CAVOLINI	1853 p. 256.

<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	CHIAIE, D.	1853	p. 333.
»	»	GEGENBAUR	1856 (b) p. 237.
»	»	THOMPSON	1856 p. 448.
<i>Thaumantias pileata</i>	THOMPSON	1856	p. 448.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	GREENE	1857	p. 246.
<i>Thaumantias inconspicua</i>	GREENE	1857	p. 175, 176, 243.
<i>Thaumantias lineata</i>	GREENE	1857	p. 243.
<i>Thaumantias neglecta</i>	GREENE	1857	p. 243, 246, pl. 15, fig. 5.
<i>Thaumantias typica</i>	GREENE	1857	p. 243, 246, pl. 14, fig. 4.
<i>Oceania phosphorica</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 346, note et 352. (Excl. syn. p. p.).
<i>Medusa hemisphaerica</i>	METTENHEIMER	1861	p. 303.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	METTENHEIMER	1861	p. 303.
<i>Thaumantias inconspicua</i>	METTENHEIMER	1861	p. 303.
»	»	WRIGHT	1862 (c) p. 221, 308.
»	»	ALLMAN	1864 (a) p. 415.
»	»	ALLMAN	1864 (c) p. 377, 378.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 68.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 91.
<i>Thaumantias inconspicua</i>	HINCKS	1868	p. 179, fig. 20.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	NORMAN	1869	p. 325.
<i>Thaumantias lineata</i>	NORMAN	1869	p. 257, 325.
<i>Thaumantias inconspicua</i>	ALLMAN	1871	p. 97.
<i>Thaumantias hemisphaerica</i>	METZGER	1871 (a)	p. 35.
»	»	PANCERI	1871 p. 141, 142.
<i>Thaumantias punctata</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 193.

Thaumantias versicolor Mettenheimer.

<i>Thaumantias versicolor</i>	METTENHEIMER	1861	p. 304, pl. 11.
-------------------------------	--------------	------	-----------------

Tiara ducalis (Forbes).

<i>Oceania ducalis</i>	FORBES	1853	p. 311, pl. 10, fig. 2.
------------------------	--------	------	-------------------------

Tiara octona (Forbes).

Voir : Matériaux I, p. 487 et II, p. 149.

<i>Medusa pilearis</i>	MODEER	1791 (a)	p. 98.
------------------------	--------	----------	--------

<i>Oceania turrita</i>	BUSK	1852 (b) p. 28.
<i>Oceania octona</i>	BUSK	1852 (b) p. 28.
<i>Oceania turrita</i>	GEGENBAUR	1856 (a) p. 232, 235.
<i>Tiara octona</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347 (Excl. syn. p. p.).
<i>Oceania turrita</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 363.
<i>Oceania octona</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 363.
<i>Tiara octona</i>	KÖLLIKER	1864 p. 233, 237.
» »	KÖLLIKER	1865 p. 98, 99.
» »	NORMAN	1869 p. 326.
<i>Tiara turrita</i>	NORMAN	1869 p. 257, 326.
<i>Oceania coronata</i>	ALLMAN	1871 p. 33, fig. 8.
<i>Oceania octona</i>	ALLMAN	1871 p. 35, 143.
<i>Oceania turrita</i>	ALLMAN	1871 p. 35, 143.

Tiara papua (Lesson).

Voir : Matériaux II, p. 150.

<i>Turris papua</i>	EYDOUX et SOLEYET	1852 p. 639, pl. 2, fig. 1-3.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 346.

Tiara pileata (Forskål).

Voir : Matériaux I, p. 487 et II, p. 150.

<i>Medusa pileata</i>	MODEER	1791 (a) p. 241.
<i>Oceania episcopalis</i>	BUSK	1852 (b) p. 28.
<i>Dianaea pileata</i>	LEUCKART	1853 p. 79, note.
<i>Oceania ampullacea</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 20.
<i>Oceania coccinea</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 24.
<i>Oceania pileata</i>	LEUCKART	1856 (a) p. 20, 24, pl. 2, fig. 3.
<i>Oceanea pileata</i>	GRAEFFE	1860 p. 37.
<i>Oceania ampullacea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 352.
<i>Oceania episcopalis</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
<i>Tiara pileata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
<i>Oceania ampullacea</i>	GRUBE	1861 p. 32, 131.
<i>Medusa pileata</i>	KEFERSTEIN u. EHLERS	1861 p. 82.
<i>Oceania episcopalis</i>	WRIGHT	1861 (b) p. 126.
» »	WRIGHT	1863 (b) p. 280.

<i>Oceania pileata</i>	CLAUS	1864	p. 392, pl. 38, fig. 14.
<i>Tiara coccinea</i>	HAECKEL	1864	p. 327.
<i>Tiara pileata</i>	HAECKEL	1864	p. 327.
<i>Tiara smaragdina</i>	HAECKEL	1864	p. 327, 336.
<i>Oceania gædlii</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 93.
<i>Oceania pileata</i>	SPAGNOLINI	1868	p. 556.
<i>Tiara episcopalis</i>	NORMAN	1869	p. 326.
<i>Tiara smaragdina</i>	METSCHNIKOFF	1871	p. 98.
<i>Oceania pileata</i>	PANCERI	1871	p. 142.
» »	SPAGNOLINI	1871	p. 195, 198, 199 (Excl. syn. p. p.).
<i>Oceania coccineu</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 199.
<i>Oceania leuseuriana</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 199.
<i>Oceania smaragdina</i>	SPAGNOLINI	1871	p. 199.

D'après HARTLAUB (1895) cette espèce est la forme Méduse de *Perigonimus repens*.

Tiara rotunda (Quoy et Gaimard).

Voir : Matériaux II, p. 151.

Tiaropsis diademata L. Agassiz.

Voir : Matériaux II, p. 151.

<i>Tiaropsis diademata</i>	GEGENBAUR	1856 (a)	p. 236.
» »	MÖRCH	1857	p. 24.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 308 et 355, fig. 45-49, pl. 31, fig. 9-15.
» »	ALLMAN	1864 (a)	p. 362.
» »	CLARK	1864	p. 62.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (a)	p. 92, fig. 10-13.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 69, 101, 224, 226, fig. 91-93.
» »	ALLMAN	1871	p. 35.

Tiaropsis multicirrata (Sars).

Voir : Matériaux II, p. 151.

<i>Thaumantias multicirrhata</i>	BUSCH	1851	p. 1.
----------------------------------	-------	------	-------

<i>Thaumantias multicirrata</i>	GEGENBAUR	1856 (b)	p. 237.
<i>Thaumantias melanops</i>	GREENE	1857	p. 245.
<i>Thaumantias pattersonii</i>	GREENE	1857	p. 243, 245, pl. 14, fig. 3.
<i>Thaumantias melanops</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 354.
<i>Tiaropsis multicirrhata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 355.
<i>Tiaropsis pattersonii</i>	GREENE	1861	p. 117, fig. 24 (e).
<i>Thaumantias pattersonii</i>	AGASSIZ, A.	1865 (c)	p. 69.
<i>Thaumantias cirrhata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 52.
<i>Thaumantias multicirrhata</i>	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 54, 87, 94.
<i>Thaumantias melanops</i>	NORMAN	1869	p. 257, 325.
<i>Thaumantias multicirratu</i> s	ALLMAN	1871	p. 151.
<i>Tyaropsis scotica</i>	ALLMAN	1871	p. 140, 142, fig. 57.

Tima bairdi (Johnston).

Voir : Matériaux II, p. 151.

<i>Tima bairdi</i>	GEGENBAUR	1856 (b)	p. 252, 253.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 362.
»	ALLMAN	1864 (a)	p. 402, fig. 19.
»	PEACH	1867	p. 356.
»	PEACH	1868	p. 97.
»	ALLMAN	1871	p. 37, 140, fig. 11, 12.

Tima flavilabris Eschscholtz.

Voir : Matériaux II, p. 152.

<i>Tima flavilabris</i>	GEGENBAUR	1856 (b)	p. 252, 253.
»	MC CRADY	1859 (b)	p. 190.
»	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 362.
»	BENEDEN (van)	1867 (a)	p. 88.
»	SPAGNOLINI	1868	p. 556.
»	SPAGNOLINI	1871	p. 176.

Tima forbesi Peach.

<i>Tima forbesii</i>	PEACH	1867	p. 356, pl. 1, fig. 3-4.
»	PEACH	1868	p. 97.

Tima formosa A. Agassiz.

<i>Tima formosa</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 362.
» »	AGASSIZ, A.	1862 (a) p. 362.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 95, 113, 225, fig. 164-172.
» »	AGASSIZ, E. et A.	1865 p. 60, fig. 76-78.
» »	ALLMAN	1871 p. 97.

Turris constricta Patterson.

<i>Turris constricta</i>	PATTERSON	1859 p. 279 ss., fig.
--------------------------	-----------	-----------------------

Turris digitalis Forbes.

Voir : Matériaux II, p. 152.

<i>Turris digitalis</i>	PATTERSON	1859 p. 279.
? » »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 346. (Ex. syn.).
» »	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 97, note.
? » »	NORMAN	1869 p. 326.

Turris neglecta Lesson.

Matériaux I, p. 488 et II, p. 152.

Voir aux Hydroïdes.

Turritopsis armata (Kölliker).

<i>Oceania armata</i>	KÖLLIKER	1853 (a) p. 323.
» »	GEGENBAUR	1854 p. 181, 195, pl. 2, fig. 10-16.
<i>Oceania flavidula</i>	GEGENBAUR	1856 (b) p. 223, 267, pl. 7, fig. 4.
? <i>Turritopsis flavidula</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 217.
<i>Oceania flavidula</i>	MC CRADY	1859 (a) p. 63.
» »	MC CRADY	1859 (b) p. 125.
? » »	SARS	1859 p. 2.
<i>Pandea flavidula</i>	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.

<i>Oceania flavidula</i>	KEFERSTEIN U.	
	EHLERS	1861 p. 83.
<i>Oceania armata</i>	ALLMAN	1864 (a) p. 415.
? <i>Oceania flavidula</i>	SPAGNOLINI	1868 p. 556.
<i>Oceania armata</i>	ALLMAN	1871 p. 97.
<i>Oceania flavidula</i>	METSCHNIKOFF	1871 p. 98.
? » »	SPAGNOLINI	1871 p. 197 (Excl. syn. p. p.).

Turritopsis nutricula Mac Crady.

<i>Oceania (Turritopsis) nu-</i>		
<i>tracula</i>	MC CRADY	1859 (a) p. 55, pl. 4-7.
» » »	MC CRADY	1859 (b) p. 104, 105.
<i>Turritopsis nutricula</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 127, 136, 212, 217, pl. 8, fig. 1.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62 vol. 4, p. 347.
» »	GREENE	1861 p. 61.
» »	ALLMAN	1864 (a) p. 449.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (a) p. 97, fig. 22-23.
» »	AGASSIZ, A.	1865 (c) p. 164, 167, 224, fig. 269-270.
» »	ALLMAN	1871 p. 81.

Turritopsis pleurostoma (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 488 et II, p. 152.

Turritopsis polynema Haeckel.

<i>Oceania polycirru</i>	KEFERSTEIN	1862 p. 26, pl. 2, fig. 11-13.
--------------------------	------------	--------------------------------

Willetta ornata (Mac Crady).

<i>Willsia ornata</i>	MC CRADY	1859 (b) p. 149, pl. 9, fig. 9-11.
-----------------------	----------	------------------------------------

Willia cornubica Peach.

<i>Willsia stellata</i>	PEACH	1850 p. 48.
<i>Willsia cornubica</i>	PEACH	1867 p. 355, pl. 1, fig. 1-2.
» »	PEACH	1868 p. 96.
<i>Willsia stellata</i>	PEACH	1868 p. 96.

Willia stellata (Forbes).Syn. : *Willsia stellata* Forbes.

Voir : Matériaux II, p. 152.

<i>Willsia stellata</i>	GOSSE	1853 (a)	p. 359, pl. 20, fig. 1-5.
» »	MC CRADY	1859 (b)	p. 149, 150.
<i>Willia stellata</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 346.
<i>Willsia stellata</i>	GREENE	1861	p. 117, fig. 24 (c).
» »	KÖLLIKER	1864	p. 233.
<i>Willia stellata</i>	KÖLLIKER	1865	p. 173, pl. 11, fig. 1.
<i>Willsia stellata</i>	PEACH	1867	p. 355.

D'après L. AGASSIZ (1862, p. 346), dont l'opinion a été généralement adoptée, on doit écrire *Willia* et non *Willsia*, ce genre ayant été établi en l'honneur de WILL.

Willsia stellata Forbes.

Matériaux II, p. 152.

Voir : *Willia stellata*.*Zanclea costata* Gegenbaur.

<i>Zanclea costata</i>	GEGENBAUR	1856 (b)	p. 229, 268, pl. 8, fig. 4-7.
» »	MC CRADY	1859 (b)	p. 152.
» »	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 344.
» »	KEFERSTEIN U.		
	EHLERS	1861	p. 85.
» »	SPAGNOLINI	1868	p. 555.
» »	SPAGNOLINI	1871	p. 222.

Zygocanna pleuronota (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 488 et II, p. 153.

Zygocannota purpurea (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 488 et II, p. 153.

<i>Aequorea purpurea</i>	AGASSIZ, L.	1860-62	vol. 4, p. 360.
--------------------------	-------------	---------	-----------------

Zygocannula undulosa (Péron et Lesueur).

Voir : Matériaux I, p. 488 et II, p. 153.

INDEX¹

HYDROÏDES

Gen. <i>Acaulis</i>	STIMPSON	1854	
<i>A. primarius</i>	STIMPSON	1854	
Gen. <i>Acharadria</i>	WRIGHT	1863	
<i>A. larynx</i>	WRIGHT	1863	
Gen. <i>Actinogonium</i>	ALLMAN	1871	
<i>A. pusillum</i>	ALLMAN	1871	
Gen. <i>Aequorea</i>	PÉRON et LE-		
	SUEUR	1812	= pp. <i>Zygodactyla</i> .
<i>A. allantophora</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Zygodactyla vitrina</i> .
<i>A. vitrina</i>	GOSSE	1853	= <i>Zygodactyla vitrina</i> .
Gen. <i>Aequoria</i>	WRIGHT	1862	= <i>Aequorea</i> .
<i>A. vitrina</i>	WRIGHT	1862	= <i>Zygodactyla vitrina</i> .
Gen. <i>Aglaophenia</i>	LAMOUREUX	1812	
<i>A. amathioides</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Hydrallmania ful-</i> <i>cata</i> .
<i>A. angulosa</i>	LAMOUREUX	1816	
<i>A. brachiata</i>	(LAMARCK)	1816	
<i>A. brevirostris</i>	(BUSK)	1852	
<i>A. cristata</i>	MC CRADY	1859	= <i>Aglaophenia trifida</i> .
<i>A. delicatula</i>	(BUSK)	1852	
<i>A. divaricata</i>	(BUSK)	1852	
<i>A. elegans</i>	LAMOUREUX	1816	
<i>A. formosa</i>	BUSK	1851	
<i>A. franciscana</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Aglaophenia struth-</i> <i>ionides</i> .
<i>A. gaimardi</i>	LAMOUREUX	1824	= <i>Plumularia setacea</i> var. <i>gaimardi</i> .

¹ Les espèces qui ont été mentionnées dans les deux premières parties de ces *Matériaux* ne figurent pas dans cet Index, à moins qu'on ait dû corriger des erreurs de citation ou de synonymie.

<i>A. glutinosa</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Plumularia glutinosa</i> .
<i>A. gracilis</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
<i>A. kirchenpaueri</i>	(HELLER)	1868	
<i>A. macgillivrayi</i>	ALLMAN	1871	= <i>Aglaophenia cupressina</i> .
<i>A. minuta</i>	FEWKES	1881	
<i>A. myriophyllum</i> sec.	SAVIGNY et AU-		
	DOUIN	1809-17	= ? <i>Aglaophenia tubulifera</i> .
<i>A. octodonta</i>	(HELLER)	1868	
<i>A. patula</i>	KIRCHENPAUER	1872	= <i>Aglaophenia filamentosa</i> .
<i>A. pelagica</i>	LAMOUROUX	1816	Ind. an <i>A. minuta</i> ?
<i>A. pennaria</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>A. pennaria</i>	LAMOUROUX	1812	= <i>Aglaophenia filamentosa</i> .
<i>A. phoenicea</i>	(BUSK)	1852	
<i>A. spicata</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Aglaophenia pennaria</i> .
<i>A. struthionides</i>	(MURRAY)	1860	
<i>A. tetrasticha</i>	MENEGHINI	1845	= <i>Nemertesia tetrasticha</i> .
<i>A. tricuspis</i>	MC CRADY	1859	
<i>A. trifida</i>	L. AGASSIZ	1862	
<i>A. tubulifera</i>	HINCKS	1861	
<i>A. uncinata</i>	(LAMARCK)	1816	= <i>Aglaophenia pluma</i> .
Gen. <i>Amalthea</i>	SCHMIDT, O.	1852	
<i>A. jamuuri</i>	(STEENSTRUP)	1854	
<i>A. sarsi</i>	(STEENSTRUP)	1854	
<i>A. uvifera</i>	SCHMIDT, O.	1852	
Gen. <i>Amalthea</i>	SARS	1857	= <i>Amalthea</i> .
<i>A. uvifera</i>	SARS	1857	= <i>Amalthea uvifera</i> .
Gen. <i>Amphisbetia</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp.
<i>A. operculata</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Sertularia operculata</i> .
Gen. <i>Amphitrocha</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Sertularella</i> .
<i>A. cincta</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Sertularella rugosa</i> .
<i>A. picta</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Sertularella picta</i> .

A. rugosa	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Sertularella rugosa</i> .
Gen. Anisocalyx	DONATI	1750	Supp.
A. bifrons	HELLER	1868	= <i>Plumularia bifrons</i> .
A. diaphanus	HELLER	1868	= <i>Plumularia diaphana</i> .
A. pinnatifrons	HELLER	1868	= <i>Plumularia pinnatifrons</i> .
A. pinnatus	HELLER	1868	= <i>Plumularia pinnata</i> .
A. setaceus	HELLER	1868	= <i>Plumularia helleri</i> .
Gen. Antennularia	LAMARCK	1816	= <i>Nemertesia</i> .
A. cymodocea	BUSK	1851	= <i>Nemertesia cymodocea</i> .
A. janini	BLAINVILLE	1830	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
A. triseriata	POURTALES	1869	= <i>Nemertesia triseriata</i> .
Gen. Atractylis	WRIGHT	1858	= <i>Wrightia</i> .
A. arenosa	ALDER	1862	= <i>Wrightia arenosa</i> .
A. bitentaculatus	WRIGHT	1867	= <i>Perigonimus bitentaculatus</i> .
A. coccinea	WRIGHT	1861	= <i>Perigonimus coccineus</i> .
A. linearis	ALDER	1862	= <i>Perigonimus linearis</i> .
A. margarica	HINCKS	1862	= <i>Hydranthea margarica</i> .
A. miniata	WRIGHT	1863	= <i>Perigonimus miniatus</i> .
A. minutus	ALDER	1864	= <i>Perigonimus minutus</i> .
A. palliata	WRIGHT	1861	= <i>Perigonimus palliatus</i> .
A. quadridentaculata	WRIGHT	1867	= <i>Perigonimus quadridentaculatus</i> .
A. ramosa	WRIGHT	1858	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
A. (Eudendrium) ramosa	WRIGHT	1863	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
A. repens	WRIGHT	1858	= <i>Perigonimus repens</i> .

A. sessilis	WRIGHT	1858	= <i>Perigonimus sessilis</i> .
Gen. <i>Bimeria</i>	WRIGHT	1859	
B. nutans	ALLMAN	1864	= <i>Bimeria vestita</i> .
B. vestita	WRIGHT	1859	
Gen. <i>Bougainvillea</i>	FORBES	1848	= <i>Bougainvillia</i> .
B. dipectanos	BUSCH	1851	= ? <i>Bougainvillia ramosa</i> .
Gen. <i>Bougainvillia</i>	LESSON	1836	
B. britannica	LESSON	1843	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
B. carolinensis	(MC CRADY)	1859	
B. fruticosa	ALLMAN	1864	
B. muscus	ALLMAN	1864	
B. ramosa	BENEDEN (van)	1844	
B. superciliaris	AGASSIZ, L.	1850	
Gen. <i>Calicella</i>	HINCKS	1859	= <i>Calicella</i> .
C. dumosa	HINCKS	1861	= <i>Lafoea dumosa</i> .
C. fastigiata	NORMAN	1867	= <i>Calicella fastigiata</i> .
C. fruticosa	HINCKS	1861	= <i>Lafoea fruticosa</i> .
C. gracillima	NORMAN	1862	= <i>Lafoea fruticosa</i> .
C. humilis	ALDER	1863	= <i>Cuspidella humilis</i> .
C. syringa	ALDER	1860	= <i>Calicella syringa</i> .
Gen. <i>Calicella</i>	HINCKS	1859	
C. fastigiata	(ALDER)	1860	
C. fastigiata	ALLMAN	1864	= <i>Calicella plicatilis</i> .
C. humilis	ALLMAN	1864	= <i>Cuspidella humilis</i> .
C. lacerata	ALLMAN	1864	= <i>Opercularella lacerata</i> .
C. (Laomedea) lacerata	ALLMAN	1864	= <i>Opercularella lacerata</i> .
C. plicatilis	(SARS)	1863	
C. syringa	(LINNÉ)	1767	
Gen. <i>Campaniclava</i>	ALLMAN	1864	
C. cleodoraæ	(GEGENBAUR)	1854	
Gen. <i>Campanularia</i>	LAMARCK	1816	
C. abietina	SARS	1851	= <i>Grammaria abietina</i> .
C. amphora	AGASSIZ, A.	1862	
C. angulata	HINCKS	1859	

<i>C. antipathes</i>	(LAMARCK)	1816	
<i>C. aucta</i>	THOMPSON	1831	Ind.
<i>C. bicophora</i>	ALLMAN	1864	= <i>Clytia johnstoni</i> .
<i>C. breviscyphia</i>	SARS	1857	= <i>Campanularia caliculata</i> .
<i>C. calceolifera</i>	HINCKS	1871	
<i>C. caliculata</i>	HINCKS	1853	
<i>C. clytioides</i>	(LAMOUROUX)	1824	
<i>C. cylindrica</i>	ALLMAN	1864	= <i>Clytia noliformis</i> .
<i>C. decipiens</i>	(WRIGHT)	1863	
<i>C. (Laomedea) dichotoma</i>	MAITLAND	1851	= <i>Obelia dichotoma</i> .
<i>C. (Laomedea) dichotoma</i>	ALLMAN	1864	= ? <i>Obelia longissima</i> .
<i>C. dichotoma</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>C. dichotoma (Loveni)</i>	WRIGHT	1863	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>C. elongata</i>	BENEDEN (van)	1867	= ? <i>Campanularia fragilis</i> .
<i>C. exigua</i>	(SARS)	1857	
<i>C. fastigiata</i>	ALDER	1860	= <i>Calycella fastigiata</i> .
<i>C. flabellata</i>	HINCKS	1866	= <i>Obelia flabellata</i> .
<i>C. flexuosa</i>	(ALDER)	1856	
<i>C. flexuosa</i>	ALLMAN	1859	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>C. fragilis</i>	HINCKS	1862	
<i>C. fruticosa</i>	SARS	1851	= <i>Lafoea fruticosa</i> .
<i>C. gegenbauri</i>	SARS	1857	
<i>C. gelatinosa</i>	FLEMING	1828	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>C. (Laomedea) gelatinosa</i>	MAITLAND	1851	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>C. geniculata</i>	FLEMING	1828	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>C. geniculata</i>	BENEDEN (van)	1844	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>C. (Laomedea) geniculata</i>	MAITLAND	1851	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>C. gigantea</i>	HINCKS	1866	
<i>C. gracilis</i> Sars sec.	BENEDEN (van)	1867	= <i>Gonothyraea gracilis</i> .
<i>C. gracillima</i>	ALDER	1856	= <i>Lafoea fruticosa</i> .
<i>C. hincksi</i>	ALDER	1856	
<i>C. humilis</i>	ALDER	1863	= <i>Cuspidella humilis</i> .

<i>C. johnstoni</i>	ALDER	1856	= <i>Clytia johnstoni</i> .
<i>C. lairii</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>C. longissima</i>	Pallas		
	sec. BENEDEN (van)	1867	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>C. loveni</i>	GREENE	1861	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>C. macrocythara</i>	(LAMOUROUX)	1824	
<i>C. minutissima</i>	THOMPSON	1853	Ind.
<i>C. neglecta</i>	(ALDER)	1856	
<i>C. noliformis</i>	MC CRADY	1859	= <i>Clytia noliformis</i> .
<i>C. olivacea</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Campanularia verticillata</i> .
<i>C. (Clytia) olivacea</i>	MÖRCH	1857	= <i>Campanularia verticillata</i> .
<i>C. parvula</i>	HINCKS	1853	= <i>Lafoea parvula</i> .
<i>C. proboscidea</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Opercularella lacera</i> ta.
<i>C. raridentata</i>	ALDER	1862	
<i>C. reptans</i>	(LAMOUROUX)	1821	
<i>C. syringa</i>	LAMARCK	1816	= <i>Calycella syringa</i> .
<i>C. tenuis</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Campanulina tenuis</i> .
<i>C. tincta</i>	HINCKS	1861	
<i>C. trichoides</i>	WRIGHT	1858	= <i>Trichydra pudica</i> .
<i>C. undulata</i>	EDWARDS, M.	1836	Ind.
<i>C. urnigera</i>	BLAINVILLE	1830	Ind.
<i>C. vermicularis</i>	BENEDEN (van)	1867	
<i>C. volubiliformis</i>	SARS	1857	
<i>C. volubilis</i>	sec. BENEDEN (van)	1844	= <i>Clytia johnstoni</i> .
<i>C. volubilis</i> var.	HINCKS	1853	= <i>Campanularia hincksi</i> .
<i>C. sp. ?</i>	GEGENBAUR	1854	= <i>Campanularia gegenbauri</i> .
<i>C. sp. ?</i>	GEGENBAUR	1854	= <i>Campanularia exigua</i> .
<i>C. sp. ?</i>	GEGENBAUR	1854	= <i>Campanularia volubiliformis</i> .
<i>C. sp. ?</i>	LEWES	1858	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>C. sp. ?</i>	CARUS	1857	= <i>Campanularia gegenbauri</i> .

Gen. <i>Campanulina</i>	BENEDEN (van)	1847	
<i>C. acuminata</i>	ALLMAN	1864	= <i>Campanulina tenuis</i> .
<i>C. (Laomedea) acuminata</i>	ALLMAN	1864	= <i>Campanulina tenuis</i> .
<i>C. repens</i>	ALLMAN	1864	
<i>C. turrita</i>	HINCKS	1868	
Gen. <i>Candelabrum</i>	BLAINVILLE	1830	Supp. = <i>Myriothela</i> .
<i>C. arcticum</i>	AGASSIZ, L.	1862	= p. p. <i>Myriothela cocksi</i> .
<i>C. arcticum</i>	AGASSIZ, L.	1862	= p. p. <i>Myriothela phrygia</i> .
<i>C. phrygia</i>	ALLMAN	1864	= <i>Myriothela phrygia</i> .
<i>C. phrygium</i>	AGASSIZ, L.	1861	= <i>Myriothela phrygia</i> .
Gen. <i>Canpanularia</i>	PARFITT	1866	Supp. = <i>Campanularia</i> .
<i>C. raridenta</i>	PARFITT	1866	= <i>Campanularia raridentata</i> .
Gen. <i>Ceratella</i>	GRAY	1868	
<i>C. fusca</i>	GRAY	1868	
Gen. <i>Cionistes</i>	WRIGHT	1861	
<i>C. reticularis</i>	WRIGHT	1863	= <i>Cionistes reticulata</i> .
<i>C. reticulata</i>	WRIGHT	1861	
Gen. <i>Cladocoryne</i>	ROTCH	1871	
<i>C. floccosa</i>	ROTCH	1871	
Gen. <i>Clava</i>	GMELIN	1788-93	
<i>C. cornea</i>	WRIGHT	1857	= <i>Clava squamata</i> .
<i>C. diffusa</i>	ALLMAN	1863	
<i>C. discreta</i>	ALLMAN	1859	= <i>Clava multicornis</i> .
<i>C. leptostyla</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>C. membranacea</i>	WRIGHT	1857	= <i>Clava squamata</i> .
<i>C. multicornis</i>	(FORSKAL)	1775	
<i>C. nodosa</i>	WRIGHT	1863	
<i>C. repens</i>	WRIGHT	1857	= <i>Clava multicornis</i> .
<i>C. squamata</i>	(MÜLLER)	1776	
Gen. <i>Clavatella</i>	HINCKS	1861	
<i>C. prolifera</i>	HINCKS	1861	
Gen. <i>Clavula</i>	WRIGHT	1859	Supp. = <i>Turris</i> .
<i>C. gossii</i>	WRIGHT	1859	= <i>Turris neglecta</i> .
Gen. <i>Clithia</i>	AGASSIZ, A.	1862	Supp. = <i>Clytia</i> .

C. bicophora	AGASSIZ, A.	1862	= <i>Clytia johnstoni</i> .
Gen. Clytea	WRIGHT	1862	Supp. = <i>Clytia</i> .
C. posterior	WRIGHT	1862	= <i>Campanularia caliculata</i> .
C. vicophora	WRIGHT	1862	= <i>Clytia johnstoni</i> .
Gen. Clythia	BENEDEN (van)	1867	Supp. = <i>Clytia</i> .
C. volubilis	BENEDEN (van)	1867	= <i>Clytia johnstoni</i> .
Gen. <i>Clytia</i>	LAMOUREUX	1812	
C. bicophora	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Clytia johnstoni</i> .
C. (Trochopyxis) bicophora	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Clytia johnstoni</i> .
C. cylindrica	AGASSIZ, L.	1862	= p. p. <i>Clytia noliiformis</i> .
C. cylindrica	AGASSIZ, L.	1862	= p. p. <i>Clytia johnstoni</i> .
C. (Platypyxis) cylindrica	AGASSIZ, L.	1862	= p. p. <i>Clytia noliiformis</i> .
C. (Platypyxis) cylindrica	AGASSIZ, L.	1862	= p. p. <i>Clytia johnstoni</i> .
C. <i>intermedia</i>	AGASSIZ, L.	1862	
C. <i>johnstoni</i>	(ALDER)	1856	
C. macrocythara	LAMOUREUX	1824	= <i>Campanularia macrocythara</i>
C. <i>noliiformis</i>	(MC CRADY)	1859	
C. olivacea	LAMOUREUX	1821	= <i>Campanularia verticillata</i> .
C. poterium	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Campanularia caliculata</i> .
C. (Orthopyxis) poterium	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Campanularia caliculata</i> .
C. undulata	LAMOUREUX	1824	Ind.
C. urnigera	LAMOUREUX	1816	Ind.
C. verticillata	LAMOUREUX	1812	= <i>Campanularia verticillata</i> .
C. (Campanularia)			
volubilis	DU PLESSIS	1871	= <i>Clytia johnstoni</i> .
C. syringa	LAMOUREUX	1812	= <i>Calycella syringa</i> .

Gen. <i>Cordylomorpha</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Cordylophora</i> .
Gen. <i>Cordylophora</i>	ALLMAN	1844	
<i>C. albicola</i>	KIRCHENPAUER	1861	= <i>Cordylophora lucustris</i> .
<i>C. americana</i>	LEIDY	1870	= <i>Cordylophora lucustris</i> .
<i>C. mingrelia</i>	TSCHERNIAWSKY	1870	Ind.
Gen. <i>Corydendrium</i>	BENEDEN (van)	1844	
<i>C. parasiticum</i>	(LINNÉ)	1767	
Gen. <i>Corymbogonium</i>	ALLMAN	1861	Supp.
<i>C. capillare</i>	ALLMAN	1861	= <i>Eudendrium capillare</i> .
Gen. <i>Corymorpha</i>	SARS	1835	
<i>C. annulicornis</i>	SARS	1860	= <i>Heterostephanus annulicornis</i> .
<i>C. glacialis</i>	SARS	1860	= <i>Monocaulus glacialis</i> .
<i>C. januari</i>	STEENSTRUP	1854	= <i>Amalthea januari</i> .
<i>C. nana</i>	ALDER	1858	= <i>Halatractus nanus</i> .
<i>C. nutans</i>	sec. SARS	1851	= <i>Amalthea sarsi</i> .
<i>C. pendula</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Monocaulus pendulus</i> .
<i>C. phrygia</i>	MÜRCH	1857	= <i>Myriothele phrygia</i> .
<i>C. sarsi</i>	STEENSTRUP	1854	= <i>Amalthea sarsi</i> .
<i>C. uvifera</i>	SARS	1860	= <i>Amalthea uvifera</i> .
Gen. <i>Coryna</i>	BOSC	1802	Supp. = <i>Coryne</i> .
<i>C. (Hydractinia) ambata</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Podocoryne aculeata</i> .
<i>C. gravata</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Syncoryne gravata</i> .
<i>C. sessilis</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Coryne pusilla</i> .
Gen. <i>Coryne</i>	GERTNER	1774	
<i>C. (Hydractinia) aculeata</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Podocoryne aculeata</i> .
<i>C. briareus</i>	ALLMAN	1859	= <i>Gemmaria implexa</i> .
<i>C. caespes</i>	ALLMAN	1871	
<i>C. cerberus</i>	GOSSE	1853	
<i>C. decipiens</i>	WRIGHT	1859	= <i>Syncoryne decipiens</i> .
<i>C. eximia</i>	ALLMAN	1859	= <i>Syncoryne eximia</i> .

C. (Syncoryne) exi-			
mia	ALLMAN	1864	= <i>Syncoryne eximia</i> .
C. ferox	WRIGHT	1867	= <i>Syncoryne ferox</i> .
C. fruticosa	HINCKS	1861	
C. fucicola	(FILIPPI)	1866	
C. gravata	WRIGHT	1858	= <i>Syncoryne gravata</i> .
C. impressa	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Gemmaria implexa</i> .
C. implexa	ALLMAN	1859	= <i>Gemmaria implexa</i> .
C. listeri	THOMPSON	1856	= <i>Syncoryne eximia</i> .
C. margarica	WRIGHT	1859	= <i>Gemmaria implexa</i> .
C. mirabilis	AGASSIZ, L.	1860	= <i>Syncoryne mirabilis</i> .
C. muscoides	(LINNÉ)	1761	
C. nutans	HINCKS	1868	
C. pelagica	ALDER	1858	= <i>Gemmaria implexa</i> .
C. pusilla γ	THOMAS	1847	= ? <i>Gemmaria implexa</i> .
C. rosaria	AGASSIZ, A.	1862	
C. sarsii	HINCKS	1862	= ? <i>Syncoryne decipiens</i> .
C. sessilis	GOSSE	1853	= <i>Coryne pusilla</i> juv.
C. stauridia	GOSSE	1853	= <i>Cladonema radia-</i> <i>tum</i> .
C. stipula	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Coryne pusilla</i> .
C. van Benedeni	HINCKS	1868	= <i>Actinogonium pusil-</i> <i>lum</i> .
C. vermicularis	HINCKS	1866	
Gen. <i>Corynitis</i>	MC CRADY	1859	
<i>C. agassizi</i>	MC CRADY	1859	
Gen. <i>Corynopsis</i>	ALLMAN	1864	
<i>C. alderi</i>	(HODGE)	1863	
Gen. <i>Corythamnion</i>	ALLMAN	1871	Supp. = <i>Garveia</i> .
<i>C. bacciferum</i>	ALLMAN	1871	= <i>Garveia nutans</i> .
Gen. <i>Corythamnium</i>	ALLMAN	1859	Supp. <i>Garveia</i> .
Gen. <i>Cotulina</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp.
<i>C. greenei</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Sertularella greeni</i> .
<i>C. polyzonias</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Sertularella polyzo-</i> <i>nias</i> .
C. tamarisca	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Diphasia tamarisca</i> .
C. tricuspidata	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Sertularella tricuspi-</i> <i>data</i> .

Gen. <i>Cryptolaria</i>	BUSK	1857	
<i>C. exserta</i>	JOHNSTON	1858	
<i>C. prima</i>	BUSK	1857	
Gen. <i>Cuspidella</i>	HINCKS	1866	
<i>C. costata</i>	HINCKS	1868	
<i>C. grandis</i>	HINCKS	1868	
<i>C. humilis</i>	(ALDER)	1863	
Gen. <i>Cymodocea</i>	LAMOUREUX	1816	Supp.
<i>C. comata</i>	LAMOUREUX	1821	= ? <i>Nemertesia ramosa</i> .
<i>C. ramosa</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Nemertesia antennina</i> .
<i>C. simplex</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Nemertesia antennina</i> .
Gen. <i>Delitella</i>	GRAY	1868	
<i>D. atrorubens</i>	GRAY	1868	
Gen. <i>Dicoryna</i>	BENEDEN (van)	1867	Supp. = <i>Dicoryne</i> .
<i>D. confertum</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Dicoryne conferta</i> .
Gen. <i>Dicoryne</i>	ALLMAN	1859	
<i>D. capillare</i>	ALDER	1863	= <i>Eudendrium capillare</i> .
<i>D. conferta</i>	(ALDER)	1856	
<i>D. stricta</i>	ALLMAN	1859	= <i>Dicoryne conferta</i> .
Gen. <i>Diphasia</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>D. alata</i>	HINCKS	1868	
<i>D. attenuata</i>	HINCKS	1866	
<i>D. corniculata</i>	(MURRAY)	1860	
<i>D. coronifera</i>	ALLMAN	1871	
<i>D. fallax</i>	(JOHNSTON)	1847	
<i>D. nigra</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Diphasia pinnata</i> .
<i>D. pinaster</i>	(ELLIS et So-		
	LANDER	1786	
<i>D. pinnata</i>	(PALLAS)	1766	
<i>D. rosacea</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>D. tamarisca</i>	(LINNÉ)	1758	
Gen. <i>Diplonema</i>	GREENE	1857	Supp. = <i>Diplura</i> .
<i>D. islandica</i>	GREENE	1857	= <i>Diplura fritillaria</i> .
Gen. <i>Diplura</i>	ALLMAN	1864	
<i>D. fritillaria</i>	(STEENSTRUP)	1842	

Gen. <i>Dismorphosa</i>	D. CHIAIE	1853	Supp. = <i>Dysmorphosa</i> .
<i>D. conchicola</i>	D. CHIAIE	1853	= ? <i>Podocoryne conchicola</i> .
Gen. <i>Dycoryne</i>	AGASSIZ, A.	1865	Supp. = <i>Dicoryne</i> .
<i>D. stricta</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Dicoryne conferta</i> .
Gen. <i>Dynamena</i>	LAMOUROUX	1812	
<i>D. australis</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Sertularia australis</i> .
<i>D. barbata</i>	LAMOUROUX	1816	Non Hydr.
<i>D. bicuspidata</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Sertularia bicuspidata</i> .
<i>D. brevicella</i>	LAMOUROUX	1824	= <i>Sertularia operculata</i> .
<i>D. conferta</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Sertularia conferta</i> .
<i>D. cornicina</i>	MC CRADY	1859	= <i>Sertularia cornicina</i> .
<i>D. distans</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Sertularia lamourouxii</i> .
<i>D. disticha</i>	LAMOUROUX	1812	= <i>Sertularia disticha</i> .
<i>D. divergens</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Sertularia bicuspidata</i> .
<i>D. evansii</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Sertularia evansi</i> .
<i>D. fabricii</i>	AGASSIZ, L.	1860	= <i>Sertularia pumila</i> .
<i>D. fasciculata</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Sertularia operculata</i> .
<i>D. grosse-dentata</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Sertularia grosse-dentata</i> .
<i>D. indivisa</i>	KIRCHENPAUER	1864	Ind.
<i>D. lucernaria</i>	KIRCHENPAUER	1864	
<i>D. margareta</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Diphasia pinaster</i> .
<i>D. marginata</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Sertularia turbinata</i> .
<i>D. obliqua</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Pasythea quadridentata</i> var. <i>balei</i> .
<i>D. operculata</i>	LAMOUROUX	1812	= <i>Sertularia operculata</i> .
<i>D. opposita</i>	MENEGHINI	1868	= <i>Sertularia evansi</i> .
<i>D. pelasgica</i>	LAMOUROUX	1812	= ? <i>Sertularia turbinata</i> .
<i>D. penna</i>	KIRCHENPAUER	1864	= <i>Sertularia penna</i> .
<i>D. pinaster</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Diphasia pinaster</i> .

D. pinaster	sec. HELLER	1868	= <i>Diphasia attenuata</i> .
D. pinnata	FLEMING	1828	= <i>Diphasia fallax</i> .
<i>D. pluridentata</i>	KIRCHENPAUER	1864	
D. pulchella	ORBIGNY (d')	1839-46	= <i>Sertularia pulchella</i> .
D. pumila	LAMOUREUX	1812	= <i>Sertularia pumila</i> .
D. (Sertularia) pumila	ALLMAN	1864	= <i>Sertularia pumila</i> .
D. rosacea	LAMOUREUX	1812	= <i>Diphasia rosacea</i> .
D. reptans	COSTA	1838	= ? <i>Sertularia lamou-</i> <i>rouxi</i> .
D. secunda	HELLER	1868	= <i>Sertularia lamou-</i> <i>rouxi</i> .
D. serra	BLAINVILLE	1830	= <i>Sertularia opercu-</i> <i>lata</i> .
<i>D. serra</i>	sec. HELLER	1868	
D. sertularioides	LAMOUREUX	1816	= <i>Sertularia sertulari-</i> <i>oides</i> .
D. tamarisca	FLEMING	1818	= <i>Diphasia tamarisca</i> .
D. tubiformis	LAMOUREUX	1821	= <i>Sertularia sertulari-</i> <i>oides</i> .
D. tubulosa	HELLER	1868	= <i>Sertularia evansi</i> .
D. turbinata	LAMOUREUX	1816	= <i>Sertularia turbinata</i> .
Gen. Dynamene	PHILIPPI	1866	Supp. = <i>Dynamena</i> .
D. bidentata	PHILIPPI	1866	Ind.
Gen. Dyomea	VOGT	1851	Supp.
Gen. Dyphasia	AGASSIZ E. et A.	1865	Supp. = <i>Diphasia</i> .
D. rosacea	AGASSIZ E. et A.	1865	= <i>Diphasia rosacea</i> .
Gen. <i>Ectopleura</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>E. dumortieri</i>	BENEDEN (van)	1844	
E. turricola	AGASSIZ, L.	1862	= ? <i>Syncoryne reticu-</i> <i>lata</i> .
Gen. Eleutheria	QUATREFAGES	1842	= p. p. <i>Clavatella</i> .
E. sp.?	KROHN	1861	= <i>Clavatella prolifera</i> .
Gen. Eucope	GEGENBAUR	1856	= p. p. <i>Obelia</i> .
E. alternata	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Obelia geniculata</i> .
E. diaphana	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Obelia geniculata</i> .
E. divaricata	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Obelia fusiformis</i> .
E. fusiformis	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Obelia fusiformis</i> .
E. lucifera	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Obelia geniculata</i> .

E. plana	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Obelia flabellata</i> .
E. pyriformis	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Obelia pyriformis</i> .
Gen. Eucoryne	LEIDY	1855	Supp. = <i>Halocordyle</i> .
E. elegans	LEIDY	1855	= <i>Halocordyle tiarella</i> .
Gen. <i>Eudendrium</i>	EHRENBERG	1834	
<i>E. annulatum</i>	NORMAN	1864	
<i>E. arbuscula</i>	WRIGHT	1859	
E. arbusculum	WRIGHT	1861	= <i>Eudendrium arbuscula</i> .
E. baccatum	ALLMAN	1859	= <i>Garveia nutans</i> .
E. bacciferum	ALLMAN	1859	= <i>Garveia nutans</i> .
<i>E. capillare</i>	ALDER	1856	
E. cingulatum	STIMPSON	1854	Ind.
E. confertum	ALDER	1856	= <i>Dicoryne conferta</i> .
<i>E. dispar</i>	AGASSIZ, L.	1862	
E. humile	ALLMAN	1863	= <i>Eudendrium insigne</i> .
E. humile var. corymbifera	ALLMAN	1863	= ? <i>Eudendrium insigne</i> .
<i>E. insigne</i>	HINCKS	1861	
E. pudicum	BENEDEN (van)	1867	= ? <i>Trichydra pudica</i> .
E. pusillum	WRIGHT	1857	= <i>Perigonimus repens</i> .
E. pusillum	SARS	1857	Ind.
<i>E. racemosum</i>	(CAVOLINI)	1785	
<i>E. rameum</i>	(PALLAS)	1766	
<i>E. ramosum</i>	(LINNÉ)	1758	
E. ramosum sec.	ALLMAN	1859	= <i>Bougainvillia fruticosa</i> .
E. repens	WRIGHT	1858	= <i>Perigonimus repens</i> .
E. sessile	WRIGHT	1857	= <i>Perigonimus sessilis</i> .
<i>E. tenue</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>E. vaginatum</i>	ALLMAN	1863	
Gen. <i>Garveia</i>	WRIGHT	1859	
<i>G. nutans</i>	WRIGHT	1859	
Gen. <i>Gemmaria</i>	MC CRADY	1859	
<i>G. implexa</i>	(ALDER)	1856	
Gen. <i>Globiceps</i>	AYRES	1854	= p. p. <i>Halocordyle</i> .
<i>G. tiarella</i>	AYRES	1854	= <i>Halocordyle tiarella</i> .

Gen. <i>Gonocladium</i>	ALLMAN	1871	Supp.
<i>G. plumosum</i>	ALLMAN	1871	Ind. an <i>Cladocarpus formosus</i> ?
Gen. <i>Gonothyraea</i>	ALLMAN	1864	
<i>G. gracilis</i>	(SARS)	1851	
<i>G. gracilis</i> var.	(SARS)	1857	
<i>G. hyalina</i>	HINCKS	1866	
<i>G. (Laomedea) loveni</i>	ALLMAN	1864	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
Gen. <i>Grammaria</i>	STIMPSON	1854	
<i>G. abietina</i>	(SARS)	1851	
<i>G. gracilis</i>	STIMPSON	1854	
<i>G. ramosa</i>	ALDER	1856	= <i>Grammaria abietina</i> .
<i>G. robusta</i>	STIMPSON	1854	= <i>Grammaria abietina</i> .
Gen. <i>Gymnocoryne</i>	HINCKS	1871	
<i>G. coronata</i>	HINCKS	1871	
Gen. <i>Halatractus</i>	ALLMAN	1871	
<i>H. nanus</i>	(ALDER)	1858	
Gen. <i>Halecium</i>	OKEN	1815	
<i>H. capillare</i>	(POURTALES)	1869	
<i>H. filiforme</i>	ALDER	1862	
<i>H. geniculatum</i>	NORMAN	1867	
<i>H. labrosam</i>	ALDER	1859	
<i>H. muricatum</i>	ELLIS et So-		
	LANDER	1786	
<i>H. nanum</i>	ALDER	1859	
<i>H. plumosum</i>	HINCKS	1868	
<i>H. pulchellum</i>	(POURTALES)	1869	
<i>H. sessile</i>	NORMAN	1867	
<i>H. siphonatum</i>	(POURTALES)	1869	
<i>H. tenellum</i>	HINCKS	1861	
Gen. <i>Halialia</i>	HINCKS	1855	Supp. = <i>Filellum</i> .
<i>H. praetenuis</i>	HINCKS	1855	= <i>Filellum serpens</i> .
Gen. <i>Halicornaria</i>	ALLMAN	1883	
<i>H. (Plumularia) catharina</i>	HINCKS	1865	= <i>Plumularia catharina</i> .
Gen. <i>Halicorneria</i>	PARFITT	1866	Supp.

H. echinulata	PARFITT	1866	= <i>Plumularia echinulata</i> .
H. obliqua	PARFITT	1866	= <i>Plumularia obliqua</i> .
H. pinnata	PARFITT	1866	= <i>Plumularia pinnata</i> .
H. setacea	PARFITT	1866	= <i>Plumularia setacea</i> .
H. similis	PARFITT	1866	= <i>Plumularia similis</i> .
Gen. Halocharis	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Corynitis</i> .
H. spiralis	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Corynitis agassizi</i> .
H. (Corynitis) spiralis	ALLMAN	1864	= <i>Corynitis agassizi</i> .
Gen. Halocordyle	ALLMAN	1871	
H. tiarella	(AYRES)	1854	
Gen. Halybothrys	FILIPPI	1866	Supp. = <i>Coryne</i> .
H. fucicola	FILIPPI	1866	= <i>Coryne fucicola</i> .
Gen. Heteractis	ALLMAN	1864	Supp. = <i>Heterostephanus</i> .
H. annulicornis	ALLMAN	1864	= <i>Heterostephanus annulicornis</i> .
Gen. Heterocordyle	ALLMAN	1864	
H. conybeuri	ALLMAN	1864	
Gen. Heteropyxis	HELLER	1868	Supp.
H. disticha	HELLER	1868	= <i>Plumularia disticha</i> .
H. tetrasticha	HELLER	1868	= ? <i>Nemertesia ramosa</i> .
Gen. Heterostephanus	ALLMAN	1864	
H. annulicornis	(SARS)	1864	
Gen. Hincksia	AGASSIZ, L.	1862	Supp.
H. tineta	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Campanularia tineta</i> .
Gen. Hippocrene	MERTENS	1834	= p. p. <i>Bougainvillia</i> .
H. britannica	FORBES	1841	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
H. brittanica	MC CRADY	1859	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
H. carolinensis	MC CRADY	1859	= <i>Bougainvillia carolinensis</i> .
H. superciliaris	AGASSIZ, L.	1850	= <i>Bougainvillia superciliaris</i> .
Gen. Hybocodon	AGASSIZ, L.	1860	
H. prolifer	AGASSIZ, L.	1860	
Gen. Hydra	LINNÉ	1746	

<i>H. aurantiaca</i>	ECKER	1853	= <i>Hydra vulgaris</i> .
<i>H. carnea</i>	AGASSIZ, L.	1851	
<i>H. gracilis</i>	AGASSIZ, L.	1851	
<i>H. oligectis</i>	PARFITT	1866	= <i>Hydra oligactis</i> .
<i>H. rubra</i>	LEWES	1860	
<i>H. tenuis</i>	AYRES	1856	
<i>H. vulgaris</i> (grisea)	KOLLIKER	1865	= <i>Hydra vulgaris</i> .
Gen. <i>Hydractinia</i>	BENEDEN (van)	1841	
<i>H. aculeata</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Podocoryne aculeata</i> .
<i>H. areolata</i>	ALDER	1862	= <i>Podocoryne areolata</i> .
<i>H. carnea</i>	SARS	1851	= <i>Podocoryne carnea</i> .
<i>H. carnea</i> (Podocoryna)	SARS	1851	= <i>Podocoryne carnea</i> .
<i>H. cornea</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Podocoryne carnea</i> .
<i>H. echinata</i>	sec. LOVÉN	1857	= <i>Podocoryne carnea</i> .
<i>H. echinata</i>	sec. LEIDY	1855	= <i>Hydractinia poly-clina</i> .
<i>H. fucicola</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Stylactis fucicola</i> .
<i>H. incerta</i>	BENEDEN (van)	1867	Ind.
<i>H. littoralis</i>	GOSSE	1855	Ind.
<i>H. minuta</i>	BENEDEN (van)	1867	Ind.
<i>H. polycleus</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Hydractinia poly-clina</i> .
<i>H. polyclina</i>	AGASSIZ, L.	1860	
<i>H. sodalis</i>	STIMPSON	1859	
<i>H. solitaria</i>	BENEDEN (van)	1867	Ind.
<i>H. tenuissima</i>	BENEDEN (van)	1867	Ind.
<i>H. sp. ?</i>	WRIGHT	1863	= <i>Hydractinia echinata</i> .
Gen. <i>Hydrallmania</i>	HINCKS	1868	
<i>H. franciscana</i>	TRASK	1857	
Gen. <i>Hydranthea</i>	HINCKS	1868	
<i>H. margarica</i>	HINCKS	1862	
Gen. <i>Hypsorophus</i>	ALLMAN	1864	Supp.
Gen. <i>Kionistes</i>	WRIGHT	1863	Supp. = <i>Cionistes</i> .
<i>K. retiformis</i>	WRIGHT	1863	= <i>Cionistes reticulata</i> .
Gen. <i>Lafoea</i>	LAMOUROUX	1821	
<i>L. calcarata</i>	AGASSIZ, A.	1865	

<i>L. cornuta</i>	LAMOUROUX	1821	= <i>Lafoea dumosa</i> .
<i>L. (Calycella) dumosa</i>	ALDER	1867	= <i>Lafoea dumosa</i> .
<i>L. dumosa</i> var. <i>robusta</i>	SARS	1863	
<i>L. fruticosa</i>	SARS	1851	
<i>L. (Calycella) fruticosa</i>	ALDER	1867	= <i>Lafoea fruticosa</i> .
<i>L. halecioides</i>	ALLMAN	1871	
<i>L. parvula</i>	HINCKS	1853	
<i>L. plicatilis</i>	SARS	1863	= <i>Calycella plicatilis</i> .
<i>L. pocillum</i>	HINCKS	1868	
<i>L. pygmaea</i>	HINCKS	1868	
<i>L. ramosa</i>	PACKARD	1863	= ? <i>Lafoea dumosa</i> .
Gen. <i>Lafoeina</i>	SARS	1869	
<i>L. tenuis</i>	SARS	1869	
Gen. <i>Laomedea</i>	LAMOUROUX	1812	
<i>L. acuminata</i>	ALDER	1856	= <i>Campanulina tenuis</i> .
<i>L. amphora</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Campanularia amphora</i> .
<i>L. angulata</i>	HINCKS	1859	= <i>Campanularia angulata</i> .
<i>L. antipathes</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Campanularia antipathes</i> .
<i>L. articulata</i>	LAMOUROUX	1824	Ind.
<i>L. caliculata</i>	ALLMAN	1864	= <i>Campanularia caliculata</i> .
<i>L. decipiens</i>	WRIGHT	1863	= <i>Campanularia decipiens</i> .
<i>L. diaphana</i>	AGASSIZ, A.	1862	
<i>L. dichotoma</i>	LAMOUROUX	1812	= <i>Obelia dichotoma</i> .
<i>L. dichotoma</i> sec. LEIDY		1855	= <i>Obelia commissuralis</i> .
<i>L. dichotoma</i> Dalyell			
	sec. AGASSIZ, A.	1865	= ? <i>Obelia flabellata</i> .
<i>L. dichotoma</i>	sec. WRIGHT	1858	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>L. dichotoma</i>	sec. ALLMAN	1864	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>L. divaricata</i>	MC CRADY	1859	= <i>Obelia fusiformis</i> .
<i>L. exigua</i>	SARS	1857	= <i>Campanularia exigua</i> .

<i>L. flexuosa</i>	ALDER	1856	= <i>Campanularia flexuosa</i> .
<i>L. flexuosa</i>	sec. ALLMAN	1859	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>L. fragilis</i>	HINCKS	1862	= <i>Campanularia fragilis</i> .
<i>L. gelatinosa</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>L. gelatinosa</i>	sec. HELLER	1868	= <i>Campanularia sternosa</i> .
<i>L. gelatinosa</i>	sec. LEIDY	1855	= <i>Obelia piriformis</i> .
<i>L. gelatinosa</i>	sec. AGASSIZ, A.	1865	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>L. gelatinosa</i> var. <i>cupressina</i>	KIRCHENPAUER	1862	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>L. gelatinosa</i> var. <i>ramosissima</i>	KIRCHENPAUER	1862	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>L. gelatinosa</i> var. <i>ramulosa</i>	KIRCHENPAUER	1862	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>L. geniculata</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>L. geniculata</i>	sec. GREENE	1857	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>L. gigantea</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>L. gracilis</i>	sec. SARS	1851	= <i>Gonothyraea gracilis</i> .
<i>L. (Campanularia) gracilis</i>	SARS	1857	= <i>Gonothyraea gracilis</i> .
<i>L. gracilis</i> var.	SARS	1857	= <i>Gonothyraea gracilis</i> var.
<i>L. integra</i> Johnston			
	sec. AGASSIZ, L.	1862	= <i>Campanularia integra</i> .
<i>L. lacerata</i>	HINCKS	1852	= <i>Opercularella lacerata</i> .
<i>L. lairii</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>L. longissima</i>	ALDER	1858	= <i>Obelia longissima</i> .
<i>L. loveni</i>	ALLMAN	1859	= <i>Gonothyraea loveni</i> .
<i>L. neglecta</i>	ALDER	1856	= <i>Campanularia neglecta</i> .
<i>L. olivacea</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Campanularia verticillata</i> .
<i>L. pacifica</i>	AGASSIZ, A.	1865	

L. poterium	ALLMAN	1864	= <i>Campanularia caliculata</i> .
L. (Clytia) poterium	ALLMAN	1871	= <i>Campanularia caliculata</i> .
L. repens	ALLMAN	1871	=? <i>Campanularia caliculata</i> .
L. reptans	LAMOUREUX	1821	= <i>Campanularia reptans</i> .
<i>L. rigida</i>	AGASSIZ, A.	1865	
L. simplex	LAMOUREUX	1816	= <i>Thyrosocyphus simplex</i> .
L. simplex	SEC. DANA	1846-49	Ind.
L. tenuis	ALLMAN	1859	= <i>Leptoscyphus tenuis</i> .
<i>L. torresi</i>	BUSK	1852	
L. verticillata	BLAINVILLE	1830	= <i>Campanularia verticillata</i> .
L. volubiliformis	ALLMAN	1864	= <i>Campanularia volubiliformis</i> .
L. volubilis	ALLMAN	1871	= <i>Campanularia volubilis</i> .
Gen. Laomedea	HASSAL	1841	= <i>Laomedea</i> .
L. obliqua	COUCH	1864	= <i>Plumularia obliqua</i> .
Gen. Laphoea	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Laphoea</i> .
L. cornuta	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Laphoea dumosa</i> .
L. dumosa	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Laphoea dumosa</i> .
Gen. Lar	GOSSE	1857	
<i>L. sabellarum</i>	GOSSE	1857	
Gen. Leptoscyphus	ALLMAN	1864	
<i>L. tenuis</i>	ALLMAN	1859	
Gen. Lineolaria	HINCKS	1861	
<i>L. spinulosa</i>	HINCKS	1861	
Gen. Lorenella	HINCKS	1868	
<i>L. clausa</i>	HINCKS	1868	
Gen. Lowenia	MENEGHINI	1845	Supp.
L. tetrasticha	MENEGHINI	1845	= <i>Nemertesia tetrasticha</i> .
Gen. Lytoscyphus	PICTET	1893	
L. articulatus	LAMOUREUX	1824	Ind.

Gen. <i>Manicella</i>	ALLMAN	1859	Supp. = <i>Bimeria</i> .
<i>M. fusca</i>	ALLMAN	1859	= <i>Bimeria vestita</i> .
Gen. <i>Margelis</i>	STEENSTRUP	1850	= p. p. <i>Bougainvillia</i> .
<i>M. carolinensis</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Bougainvillia carolinensis</i> .
<i>M. ramosa</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
<i>M. superciliaris</i>	MÖRCH	1857	= <i>Bougainvillia superciliaris</i> .
Gen. <i>Medusa</i>	LINNÉ	1735	Supp.
<i>M. fimbriata</i> Daryell	sec. AGASSIZ, A.	1865	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>M. ocellia</i>	DALYELL	1847-48	= <i>Bougainvillia ramosa</i> .
Gen. <i>Merona</i>	NORMAN	1865	
<i>M. cornucopiae</i>	NORMAN	1865	
Gen. <i>Merone</i>	ALLMAN	1871	= <i>Merona</i> .
<i>M. cornucopiae</i>	ALLMAN	1871	= <i>Merona cornucopiae</i> .
Gen. <i>Monocaulos</i>	ALLMAN	1864	= <i>Monocaulus</i> .
<i>M. glacialis</i>	ALLMAN	1864	= <i>Monocaulus glacialis</i> .
<i>M. pendula</i>	ALLMAN	1864	= <i>Monocaulus pendula</i> .
Gen. <i>Monocaulus</i>	ALLMAN	1871	
<i>M. glacialis</i>	(SARS)	1860	
<i>M. pendulus</i>	(AGASSIZ, L.).	1862	
Gen. <i>Monostaechas</i>	ALLMAN	1877	
<i>M. quadridens</i>	(MC CRADY)	1859	
Gen. <i>Myriothela</i>	SARS	1854	
<i>M. arctica</i>	SARS	1854	= <i>Myriothela phrygia</i> .
<i>M. arctica</i>	FORBES	1854	= p. p. <i>Myriothela cocksi</i> .
<i>M. cocksi</i>	(VIGURS)	1849	
<i>M. phrygia</i>	(FABRICIUS)	1780	
<i>M. phrygia</i>	sec. HINCKS	1868	= <i>Myriothela cocksi</i> .
Gen. <i>Myrithela</i>	ALDER	1853	= <i>Myriothela</i> .
<i>M. arctica</i>	ALDER	1853	= <i>Myriothela phrygia</i> .
Gen. <i>Nemertesia</i>	LAMOUREUX	1812	
<i>N. cynodocea</i>	(BUSK)	1851	
<i>N. janini</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Nemertesia ramosa</i> .

<i>N. tetrasticha</i>	(MENECHINI)	1845	
<i>N. triseriata</i>	(POURTALÈS)	1869	
Gen. <i>Nemopsis</i>	AGASSIZ, L.	1850	
<i>N. bachei</i>	AGASSIZ, L.	1850	
<i>N. gibbesi</i>	MC CRADY	1859	= <i>Nemopsis bachei</i> .
Gen. <i>Obelia</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
<i>O. commissuralis</i>	MC CRADY	1859	
<i>O. diaphana</i>	ALLMAN	1864	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>O. dichotoma</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>O. (Laomedea) dichotoma</i>	ALLMAN	1864	= ? <i>Gonothyrax loveni</i> .
<i>O. fusiformis</i>	(AGASSIZ, A.)	1865	
<i>O. gelatinosa</i>	(PALLAS)	1766	
<i>O. geniculata</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>O. (Laomedea) geniculata</i>	ALLMAN	1864	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>O. gymnophthalma</i>	SPAGNOLINI	1871	= <i>Obelia geniculata</i> .
[<i>O. lucifera</i>	HÉCKEL	1879	= <i>Obelia geniculata</i>].
<i>O. piriformis</i>	(AGASSIZ, A.)	1865	
<i>O. plana</i>	HÉCKEL	1879	= <i>Obelia flabellata</i>].
<i>O. plicata</i>	HINCKS	1868	
Gen. <i>Oceania</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	= p. p. <i>Turris</i> .
<i>O. sanguinolenta</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	= <i>Turris neglecta</i> .
Gen. <i>Ophiodes</i>	HINCKS	1866	
<i>O. mirabilis</i>	HINCKS	1866	
Gen. <i>Orthopyxis</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Campanularia</i> .
<i>O. poterium</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Campanularia caliculata</i> .
Gen. <i>Pandea</i>	LESSON	1843	= p. p. <i>Turris</i> .
<i>P. globulosa</i>	AGASSIZ, L.	1862	= ? <i>Turris neglecta</i> .
Gen. <i>Parypha</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Tubularia</i> .
<i>P. calamaris</i>	CLARCK	1864	= ? <i>Tubularia crocea</i> .
<i>P. cristata</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Tubularia cristata</i> .
<i>P. crocea</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Tubularia crocea</i> .
<i>P. microcephala</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Tubularia microcephala</i> .
Gen. <i>Pasythen</i>	LAMOUROUX	1812	
<i>P. herodon</i>	BUSK	1852	

<i>P. quadridentata</i> var.			
<i>balei</i>	BILLARD	1907	
Gen. <i>Pennaria</i>	GOLDFUSS	1820	
<i>P. distycha</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Pennaria disticha</i> .
<i>P. gibbosa</i>	AGASSIZ, L.	1860	
<i>P. tiarella</i>	MC CRADY	1859	= <i>Halocordyle tiarella</i> .
Gen. <i>Perigonimus</i>	SARS	1846	
<i>P. bitentaculatus</i>	(WRIGHT)	1867	
<i>P. coccineus</i>	(WRIGHT)	1861	
<i>P. linearis</i>	(ALDER)	1862	
<i>P. miniatus</i>	(WRIGHT)	1863	
<i>P. minutus</i>	ALLMAN	1863	
<i>P. muscoides</i>	SARS	1846	
<i>P. muscus</i>	ALLMAN	1863	= <i>Bougainvillia mus-</i> <i>cus</i> .
<i>P. palliatus</i>	(WRIGHT)	1861	
<i>P. (Atractylis) pallia-</i> <i>tus</i>	ALLMAN	1864	= <i>Perigonimus pallia-</i> <i>tus</i> .
<i>P. pusillus</i>	ALLMAN	1864	= <i>Perigonimus repens</i> .
<i>P. quadridentaculatus</i>	(WRIGHT)	1867	
<i>P. ramosus</i>	ALLMAN	1863	= <i>Bougainvillia ramo-</i> <i>sa</i> .
<i>P. repens</i>	(WRIGHT)	1858	
<i>P. serpens</i>	ALLMAN	1863	
<i>P. sessilis</i>	(WRIGHT)	1857	
<i>P. vestitus</i>	ALLMAN	1864	
Gen. <i>Platypyxis</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Clytia</i> .
<i>P. cylindrica</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Clytia noliiformis</i> .
Gen. <i>Plumularia</i>	LAMARCK	1816	
<i>P. algirensis</i>	KIRCHENPAUER	1868	= <i>Aglaophenia kirchen-</i> <i>paueri</i> .
<i>P. angulosa</i>	LAMARCK	1816	= <i>Aglaophenia angu-</i> <i>losa</i> .
<i>P. arborea</i>	DESOR	1851	Ind. an <i>Hydrallmania</i> ?
<i>P. aurita</i>	BUSK	1852	= <i>Aglaophenia phoeni-</i> <i>cea</i> .
<i>P. banksii</i>	GRAY	1843	= <i>Aglaophenia penna-</i> <i>ria</i> .

<i>P. bifrons</i>	(HELLER)	1868	
<i>P. brachiata</i>	LAMARCK	1816	= <i>Aglaophenia brachiata</i> .
<i>P. brevirostris</i>	BUSK	1852	= <i>Aglaophenia brevirostris</i> .
<i>P. campanula</i>	BUSK	1852	
<i>P. cristata</i> var.	COUCH	1844	= <i>Aglaophenia tubulifera</i> .
<i>P. delicatula</i>	BUSK	1852	= <i>Aglaophenia delicatula</i> .
<i>P. diaphana</i>	(HELLER)	1868	
<i>P. disticha</i>	(HELLER)	1868	
<i>P. divaricata</i>	BUSK	1852	= <i>Aglaophenia divaricata</i> .
<i>P. effusa</i>	BUSK	1852	= <i>Plumularia scabra</i> .
<i>P. elegans</i>	LAMARCK	1816	= <i>Aglaophenia elegans</i> .
<i>P. elongata</i>	HELLER	1868	= <i>Aglaophenia elongata</i> .
<i>P. fascis</i>	GOSSE	1855	Ind.
<i>P. formosa</i>	BUSK	1851	= <i>Aglaophenia formosa</i> .
<i>P. franciscana</i>	TRASK	1857	= <i>Hydrallmania franciscana</i> .
<i>P. frutescens</i>	(ELLIS et SOLANDER)	1786	
<i>P. fusca</i> Johnston sec.	NORMAN	1869	Ind.
<i>P. gaimardi</i>	(LAMOUROUX)	1824	= <i>Plumularia setacea</i> var. <i>gaimardi</i> .
<i>P. glutinosa</i>	(LAMOUROUX)	1816	
<i>P. gracilis</i>	MURRAY	1860	= <i>Hydrallmania franciscana</i> .
<i>P. halecioides</i>	ALDER	1859	
<i>P. helecioides</i>	NORMAN	1869	= <i>Plumularia halecioides</i> .
<i>P. hians</i>	BUSK	1852	
<i>P. huxleyi</i>	BUSK	1852	= <i>Plumularia angulolosa</i> .
<i>P. kirchenpaueri</i>	HELLER	1868	= <i>Aglaophenia kirchenpaueri</i> .
<i>P. laxa</i>	MULLER	1863	Ind.

<i>P. longicornis</i>	BUSK	1852	
<i>P. macgillivrayi</i>	BUSK	1852	= <i>Aglaophenia cupressina</i> .
<i>P. myrrophyllum</i>	IRVINE	1854	= <i>Aglaophenia myrrophyllum</i> .
<i>P. obliqua</i>	(JOHNSTON)	1847	
<i>P. octodonta</i>	HELLER	1868	= <i>Aglaophenia octodonta</i> .
<i>P. pennatecla</i>	IRVINE	1854	= ? <i>Aglaophenia pennatula</i> .
<i>P. phoenicea</i>	BUSK	1852	= <i>Aglaophenia phoenicea</i> .
<i>P. pinnata</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>P. pinnatifrons</i>	(HELLER)	1868	
<i>P. (Aglaophenia) pluma</i>	ALLMAN	1864	= <i>Aglaophenia pluma</i> .
<i>P. plumatella</i>	MC CRADY	1859	Ind.
<i>P. quadridens</i>	MC CRADY	1859	= <i>Monostaechas quadridens</i> .
<i>P. ramosa</i>	BUSK	1852	= <i>Aglaophenia divaricata</i> .
<i>P. ramulifera</i>	ALLMAN	1871	
<i>P. scabra</i>	LAMARCK	1816	
<i>P. secundaria</i>	(GMELIN)	1788-93	
<i>P. setacea</i>	(LINNÉ)	1758	
<i>P. setacea</i> sec. LANDSBOROUGH		1852	= <i>Plumularia similis</i> .
<i>P. setacea</i> var. <i>gaiardi</i>	BILLARD	1909	
<i>P. setacea</i>	IRVINE	1854	= <i>Plumularia setacea</i> .
<i>P. similis</i>	HINCKS	1859	
<i>P. struthionides</i>	MURRAY	1860	= <i>Aglaophenia struthionides</i> .
<i>P. sulcata</i>	LAMARCK	1816	
<i>P. tenerissima</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Hydrallmania falcata</i> .
<i>P. tenerrima</i>	STIMPSON	1854	= <i>Hydrallmania falcata</i> .
<i>P. tubulifera</i>	HINCKS	1861	= <i>Aglaophenia tubulifera</i> .

P. uncinata	LAMARCK	1816	= <i>Aglaophenia pluma</i> .
P. sp. ?	HUXLEY	1849	= <i>Aglaophenia angulosa</i> .
Gen. Podocoryna	SARS	1846	= <i>Podocoryne</i> .
P. (Hydractinia) carnea	BENEDEN (van)	1867	= <i>Podocoryne carnea</i> .
P. fucicola	SARS	1857	= <i>Stylactis fucicola</i> .
P. ramea Sars	sec. BENEDEN (van)	1867	= ? <i>Podocoryne carnea</i> .
P. sarsi	SARS	1857	= <i>Stylactis sarsi</i> .
P. tubularia	SARS	1857	= <i>Podocoryne carnea</i> .
P. tubulariae	SARS	1857	= <i>Podocoryne carnea</i> .
Gen. Podocoryne	SARS	1846	
P. alderi	HODGE	1863	= <i>Corynopsis alderi</i> .
P. areolata	(ALDER)	1862	
P. carnea	SARS	1846	
P. carnea	SARS	1846	= p. p. <i>Stylactis sarsi</i> .
P. fucicola	SARS	1857	= <i>Stylactis fucicola</i> .
P. proboscidea	HINCKS	1868	
Gen. Protohydra	GREEFF	1869	
P. leuckarti	GREEFF	1869	
Gen. Reticularia	THOMPSON	1853	Supp. = <i>Filellum</i> .
R. immersa	THOMPSON	1853	= <i>Filellum serpens</i> .
R. serpens	HINCKS	1856	= <i>Filellum serpens</i> .
Gen. Rhizocline	ALLMAN	1864	Supp. = <i>Podocoryne</i> .
R. areolata	ALLMAN	1864	= <i>Podocoryne areolata</i> .
Gen. Rhizogeton	AGASSIZ, L.	1862	
R. fusiformis	AGASSIZ, L.	1862	
Gen. Salacia	LAMOUREUX	1816	Supp.
S. abietina	HINCKS	1868	= <i>Grammaria abietina</i> .
S. tetracythara	LAMOUREUX	1816	= <i>Thuiaria tetracythara</i> .
Gen. Sarsia	LESSON	1843	= p. p. <i>Syncoryne</i> .
S. gravata	SPAGNOLINI	1871	= ? <i>Syncoryne gravata</i> .
S. turricula	Mc CRADY	1859	= ? <i>Syncoryne reticulata</i> .
Gen. Schizocladium	ALLMAN	1871	Supp. = <i>Obelia</i> .
S. ramosum	ALLMAN	1871	= <i>Obelia geniculata</i> .
Gen. Sertularella	GRAY	1848	

<i>S. arbuscula</i>	(LAMOUROUX)	1816	
<i>S. bispinosa</i> Gray sec.	ALLMAN	1871	= <i>Sertularia bispinosa</i> .
<i>S. crassicaulis</i>	(HELLER)	1868	
<i>S. distans</i>	(LAMOUROUX)	1816	
<i>S. divaricata</i>	(BUSK)	1852	
<i>S. fusiformis</i>	HINCKS	1861	
<i>S. greenei</i>	(MURRAY)	1860	
<i>S. picta</i>	(MEYEN)	1834	= <i>Sertularella gaudi-chaudi</i> .
<i>S. tridentata</i>	(LAMOUROUX)	1816	
<i>S. turgida</i>	(TRASK)	1857	
Gen. <i>Sertularia</i>	LINNÉ	1748	
<i>S. actoni</i>	PHILIPPI	1866	
<i>S. alata</i>	HINCKS	1855	= <i>Diphasia alata</i> .
<i>S. anguina</i>	TRASK	1857	
<i>S. (Antennularia) antennina</i>	MAITLAND	1851	= <i>Nemertesia antennina</i> .
<i>S. antennina</i> ♂	LINNÉ	1758	= <i>Nemertesia ramosa</i> .
<i>S. antipathes</i>	LAMARCK	1816	= <i>Campanularia antipathes</i> .
<i>S. arbuscula</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Sertularella arbuscula</i> .
<i>S. articulata</i> sec.	EDWARDS, M.	1836	Ind.
<i>S. attenuata</i>	HINCKS	1866	= <i>Diphasia attenuata</i> .
<i>S. australis</i>	(KIRCHENPAUER)	1864	
[<i>S. barbata</i>	BALE	1884	Non Hydr.]
<i>S. capillus</i>	D. CHIAIE	1853	= ? <i>Eudendrium racemosum</i> .
<i>S. cavolinii</i>	KÖLLIKER	1843	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>S. conferta</i>	(KIRCHENPAUER)	1864	
<i>S. cornicina</i>	(MC CRADY)	1859	
<i>S. corniculata</i>	MURRAY	1860	= <i>Diphasia corniculata</i> .
<i>S. crassicaulis</i>	HELLER	1868	= <i>Sertularella crassicaulis</i> .
<i>S. crisioides</i>	BUSK	1852	= <i>Thuiaria crisioides</i> .
<i>S. cupressoides</i>	LEPECHIN	1783	= <i>Thuiaria cupressoides</i> .

<i>S. cupressoides</i>	sec. BENEDEN (van)	1867	= <i>Thuiaria cupressina</i> .
<i>S. cypressina</i>	LEUCKART	1853	= <i>Thuiaria cupressina</i> .
<i>S. dentata</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Thuiaria cupressina</i> .
<i>S. dichotoma</i>	LINNÉ	1758	= <i>Obelia dichotoma</i> .
<i>S. digitalis</i>	BUSK	1852	
<i>S. distans</i>	LAMOUREUX	1816	= <i>Sertularella distans</i> .
<i>S. distans</i>	BUSK	1852	= <i>Sertularia lamou-</i> <i>rouxi</i> .
<i>S. disticha</i>	BOSC	1802	
<i>S. divaricata</i>	LAMARCK	1816	Ind.
<i>S. divaricata</i>	BUSK	1852	= <i>Sertularella divari-</i> <i>cata</i> .
<i>S. divergens</i>	BLAINVILLE	1830	= <i>Sertularia bicuspi-</i> <i>data</i> .
<i>S. evansi</i>	ELLIS et SOLAN-		
	DER	1786	
<i>S. fallax</i>	JOHNSTON	1847	= <i>Diphasia fallax</i> .
<i>S. (Plumularia) fru-</i>			
<i>tescens</i>	MAITLAND	1851	= <i>Plumularia frutes-</i> <i>cens</i> .
<i>S. furcata</i>	TRASK	1857	= <i>Sertularia pulchella</i> .
<i>S. fuscescens</i>	MAITLAND	1851	= <i>Diphasia pinnata</i> .
<i>S. fusiformis</i>	HINCKS	1861	= <i>Sertularella fusifor-</i> <i>mis</i> .
<i>S. gelatinosa</i>	PALLAS	1766	= <i>Obelia gelatinosa</i> .
<i>S. geniculata</i>	LINNÉ	1758	= <i>Obelia geniculata</i> .
<i>S. gracilis</i>	HASSAL	1848	= <i>Sertularia lamou-</i> <i>rouxi</i> .
<i>S. gracilis</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Hydrallmania fran-</i> <i>ciscana</i> .
<i>S. greenei</i>	MURRAY	1860	= <i>Sertularella greenei</i> .
<i>S. grosse-dentata</i>	(KIRCHENPAUER)	1864	
<i>S. imbricata</i>	BUSK	1855	
<i>S. intricatissima</i>	CAVOLINI	1853	Ind.
<i>S. labrata</i>	MURRAY	1860	= <i>Sertularia anguina</i> .
<i>S. laevis</i>	CAVOLINI	1853	Ind.
<i>S. lamourouxi</i>	EDWARDS, M.	1836	
<i>S. latiuscula</i>	STIMPSON	1854	= <i>Thuiaria latiuscula</i> .

<i>S. lichenastrum</i>	sec. OLIVI	1792	= <i>Thuiaria articulata</i> .
<i>S. loculosa</i>	BUSK	1852	= <i>Sertularia turbinata</i> .
<i>S. margareta</i>	HASSAL	1841	= <i>Diphasia pinaster</i> .
<i>S. margarita</i>	JOHN	1848	= <i>Diphasia pinaster</i> .
<i>S. marguretta</i>	IRVINE	1854	= <i>Diphasia pinaster</i> .
<i>S. millefolium</i>	LAMARCK	1816	= <i>Sertularia elongata</i> .
<i>S. (Eudendrium) mi-</i> <i>senensis</i>	ALLMAN	1871	Ind.
<i>S. mutulata</i>	BUSK	1852	
<i>S. (Plumularia) my-</i> <i>riophyllum</i>	MAITLAND	1851	= <i>Aglaophenia myrio-</i> <i>phyllum</i> .
<i>S. nigra</i>	PALLAS	1766	= <i>Diphasia pinnata</i> .
<i>S. obliqua</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Pasythea quadriden-</i> <i>tata</i> var. <i>balei</i> .
<i>S. operculata</i>	LINNÉ	1758	
<i>S. ortogonia</i>	BUSK	1852	
<i>S. patula</i>	BUSK	1852	
<i>S. penna</i>	(KIRCHENPAUER)	1864	
<i>S. pennaria</i>	LINNÉ	1758	= <i>Aglaophenia penna-</i> <i>ria</i> .
<i>S. pinasta</i>	THOMPSON	1853	= ? <i>Diphasia pinaster</i> .
<i>S. pinaster</i>	ELLIS et SOLAN-	1786	= <i>Diphasia pinaster</i> .
	DER		
<i>S. pinnata</i>	PALLAS	1766	= <i>Diphasia pinnata</i> .
<i>S. (Plumularia) pin-</i> <i>nata</i>	MAITLAND	1851	= <i>Plumularia pinnata</i> .
<i>S. (Plumularia) pluma</i>	MAITLAND	1851	= <i>Aglaophenia pluma</i> .
<i>S. plumea</i>	DESOR	1851	Ind.
<i>S. polyzonias</i>	sec. BUSK	1853	= <i>Sertularella tricuspi-</i> <i>data</i> .
<i>S. producta</i>	STIMPSON	1854	= ? <i>Diphasia tamarisca</i> .
<i>S. pulchella</i>	(d'ORBIGNY)	1839-46	
<i>S. pumila</i>	LINNÉ	1758	
<i>S. rigida</i>	LAMOUREUX	1816	Ind.
<i>S. rosacea</i>	LINNÉ	1758	= <i>Diphasia rosacea</i> .
<i>S. rubella</i>	D. CHIAIE	1853	= <i>Eudendrium ra-</i> <i>meum</i> .

<i>S. saxatilis</i>	CAVOLINI	1853	Ind.
<i>S. serra</i>	LAMARCK	1816	= <i>Sertularia operculata</i> .
<i>S. sertularioides</i>	(LAMOUROUX)	1816	
<i>S. (Plumularia) setacea</i>	MAITLAND	1851	= <i>Plumularia setacea</i> .
<i>S. splendens</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Thuiaria cupressina</i> .
<i>S. stolonifera</i>	CAVOLINI —		
	D. CHIAIE	1853	Non Hydr.
<i>S. subcarinata</i>	BUSK	1852	
<i>S. syringa</i>	LINNÉ	1767	= <i>Calycella syringa</i> .
<i>S. tamarisca</i>	LINNÉ	1758	= <i>Diphasia tamarisca</i> .
<i>S. tricuspidata</i>	sec. MURRAY	1860	= <i>Sertularella greenei</i> .
<i>S. tridentata</i>	LAMOUROUX	1816	= <i>Sertularella tridentata</i> .
<i>S. tridentata</i>	BUSK	1852	
<i>S. trigonostomu</i>	BUSK	1852	
<i>S. tubiformis</i>	EDWARDS, M.	1836	= <i>Sertularia sertularioides</i> .
<i>S. turbinata</i>	(LAMOUROUX)	1816	
<i>S. turgida</i>	TRASK	1857	= <i>Sertularella turgida</i> .
<i>S. unguiculata</i>	BUSK	1852	
Gen. <i>Silicularia</i>	MEYEN	1834	
<i>S. gracilis</i>	MEYEN	1834	= <i>Campanularia clytioides</i> .
Gen. <i>Solanderia</i>	DUCHASSAING et		
	MICHELIN	1846	
<i>S. gracilis</i>	DUCHASSAING et		
	MICHELIN	1846	
Gen. <i>Spadix</i>	GOSSE	1853	Supp. = <i>Myriothela</i> .
<i>S. cocksii</i>	GOSSE	1853	= <i>Myriothela cocksii</i> .
<i>S. purpurea</i>	GOSSE	1853	= <i>Myriothela cocksii</i> .
Gen. <i>Stauridia</i>	WRIGHT	1858	= <i>Stauridium</i> .
<i>S. producta</i>	WRIGHT	1858	= <i>Stauridium productum</i> .
Gen. <i>Stauridium</i>	DUJARDIN	1843	
<i>S. productum</i>	WRIGHT	1858	
<i>S. (de Dujardin)</i>	KÖLLIKER	1853	= <i>Cladonema radiatum</i> .

Gen. <i>Steenstrupia</i>	FORBES	1846	= p. p. <i>Diptura</i> . <i>Hybocodon</i> .
<i>S. fritillariae</i>	SARS	1860	= <i>Diptura fritillaria</i> .
<i>S. fritillaria</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Diptura fritillaria</i> .
<i>S. oweni</i>	GREENE	1857	= <i>Hybocodon prolifer</i> .
Gen. <i>Stylactis</i>	ALLMAN	1864	
<i>S. fuscicola</i>	(SARS)	1857	
<i>S. inermis</i>	ALLMAN	1871	
<i>S. sarsi</i>	(SARS)	1857	
Gen. <i>Syncoryne</i>	EHRENBERG	1834	= <i>Syncoryne</i> .
<i>S. cleodora</i>	GEGENBAUR	1854	= <i>Campaniclava cleodora</i> .
<i>S. (Coryne) fruticosa</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Coryne fruticosa</i> .
<i>S. glandulata</i>	BENEDEN (van)	1867	= ? <i>Coryne muscoides</i> .
<i>S. johnstonii</i>	BENEDEN (van)	1867	Ind.
<i>S. lacustris</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Cordylophora lacustris</i> .
<i>S. listerii</i>	BENEDEN (van)	1844	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>S. listerii</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Syncoryne sarsi</i> .
<i>S. lovenii</i>	BENEDEN (van)	1867	Ind.
<i>S. pusilla</i>	BENEDEN (van)	1844	= <i>Actinogonium pusillum</i> .
<i>S. ramosa</i>	BENEDEN (van)	1867	= ? <i>Coryne pusilla</i> .
<i>S. ramosa</i>	SARS	1851	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>S. stenyo</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Syncoryne decipiens</i> .
Gen. <i>Syncoryne</i>	EHRENBERG	1834	
<i>S. bryoides</i>	ALLMAN	1864	= p. p. <i>Tabularia larynx</i> .
<i>S. eximia</i>	ALLMAN	1859	
<i>S. ferox</i>	(WRIGHT)	1867	
<i>S. frutescens</i>	ALLMAN	1871	
<i>S. gravata</i>	(WRIGHT)	1858	
<i>S. johnstoni</i>	ALLMAN	1871	= <i>Syncoryne johnstoni</i> .
<i>S. listerii</i>	ALLMAN	1871	= <i>Syncoryne listerii</i> .
<i>S. pulchella</i>	ALLMAN	1865	
<i>S. pusilla</i>	HERKLOTS	1870	= <i>Coryne pusilla</i> .
<i>S. reticulata</i>	(AGASSIZ, A.)	1862	
<i>S. stauridium</i>	KROHN	1853	= <i>Gladonema radiatum</i> .

S. turricula Mc Crady			
	sec. ALLMAN	1864	= <i>Syncoryne reticulata</i> .
S. sp.?	DESOR	1851	= ? <i>Syncoryne sarsi</i> .
Gen. Syndictyon	AGASSIZ, A.	1862	Supp. = <i>Syncoryne</i> .
S. reticulatum	AGASSIZ, A.	1862	= <i>Syncoryne reticulata</i> .
Gen. <i>Synthecium</i>	ALLMAN	1871	
S. <i>elegans</i>	ALLMAN	1871	
Gen. Thalia	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Halia</i> .
T. praetenuis	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Halia praetenuis</i> .
Gen. Thamnocnidia	AGASSIZ, L.	1862	Supp. = <i>Tubularia</i> .
T. calamaris	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Tubularia calamaris</i> .
T. coronata	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Tubularia larynx</i> .
T. spectabilis	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Tubularia spectabilis</i> .
T. tenella	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Tubularia tenella</i> .
T. tubularoides	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Tubularia pacifica</i> .
Gen. Thaumantias	ESCHSCHOLTZ	1829	= p. p. <i>Obelia</i> .
T. diaphana	AGASSIZ, L.	1850	= <i>Obelia geniculata</i> .
T. lucida	sec. FORBES	1848	= <i>Obelia geniculata</i> .
T. lucifera	FORBES	1848	= <i>Obelia geniculata</i> .
T. plana	SARS	1835	= <i>Obelia flabellata</i> .
Gen. Thuaria	IRVINE	1854	= <i>Thuaria</i> .
T. articulata	IRVINE	1854	= <i>Thuaria articulata</i> .
Gen. Thoa	LAMOUROUX	1816	Supp.
T. capillaris	POURTALÈS	1869	= <i>Halecium capillare</i> .
T. (Eudendrium) dispar	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Eudendrium dispar</i> .
T. pulchella	POURTALÈS	1869	= <i>Halecium pulchellum</i> .
T. siphonata	POURTALÈS	1869	= <i>Halecium siphonatum</i> .
Gen. <i>Thuaria</i>	FLEMING	1828	
T. ellisi	BUSK	1851	= <i>Thuaria articulata</i> .
T. <i>fabricii</i>	LEVINSEN	1892	
T. fenestrata	BALE	1884	= <i>Thuaria tetracythara</i> .
T. <i>flexilis</i>	ALLMAN	1871	
T. <i>latiuscula</i>	(STIMPSON)	1854	
T. <i>lucida</i>	ALLMAN	1871	

T. lichenastrum	HELLER	1868	= <i>Thuiaria articulata</i> .
T. salicornia.	ALLMAN	1871	
T. tetracythara	(LAMOUROUX)	1816	
[Gen. <i>Thyrosocyphus</i>	ALLMAN	1877]	
T. simplex	(LAMOUROUX)	1816	
Gen. <i>Trichydra</i>	WRIGHT	1857	
T. pudica	WRIGHT	1857	
Gen. <i>Trochopyxis</i>	AGASSIZ, L.	1860	Supp. = <i>Clytia</i> .
Gen. <i>Tubiclava</i>	ALLMAN	1863	
T. cornucopiae	NORMAN	1864	= <i>Merona cornucopiae</i> .
T. fruticosa	ALLMAN	1871	
T. lucerna	ALLMAN	1863	
Gen. <i>Tubularia</i>	LINNÉ	1758	
T. aspera	ALLMAN	1871	Ind
T. attenuata	ALLMAN	1864	
T. bellis	ALLMAN	1863	
T. calamaris	sec. BENEDEN (van)	1844	= ? <i>Tubularia indivisa</i> .
T. coronata	ABILDGAARD	1806	= <i>Tubularia larynx</i> .
T. couthouyi	AGASSIZ, L.	1860	
T. couthoyi	ALLMAN	1864	= <i>Tubularia couthouyi</i> .
T. chilensis	GAY	1854	Ind.
T. clytioides	LAMOUROUX	1824	= <i>Campanularia clytioides</i> .
T. crinis	POURTALES	1869	Ind.
T. cristata	MC CRADY	1859	
T. crocea	(AGASSIZ, L.)	1862	
T. (Parypha) crocea	ALLMAN	1871	= <i>Tubularia crocea</i> .
T. cycloides	EDWARDS, M.	1836	= <i>Campanularia clytioides</i> .
T. dumortieri	BENEDEN (van)	1844	= <i>Ectopleura dumortieri</i> .
T. dumortieri	sec. JOHNSTON	1847	= <i>Tubularia simplex</i> .
T. gracilis	HARVEY	1836	= <i>Tubularia larynx</i> .
T. humilis	ALLMAN	1864	
T. implexa	ALDER	1856	= <i>Gemmaria implexa</i> .
T. insignis	ALLMAN	1871	
T. mesembryanthemum	ALLMAN	1871	

<i>T. microcephala</i>	(AGASSIZ, A.)	1865	
<i>T. pacifica</i>	ALLMAN	1871	
<i>T. parasitica</i>	LEWES	1858	Ind.
<i>T. polycarpa</i>	ALLMAN	1871	
<i>T. polyceps</i>	GOSSE	1855	Ind.
<i>T. (Eudendrium) ramosa</i>	MAITLAND	1851	=? <i>Eudendrium ramosum</i> .
<i>T. regulis</i>	BOECK	1860	
<i>T. simplex</i>	ALDER	1863	
<i>T. spectabilis</i>	(AGASSIZ, L.)	1862	
<i>T. (Tamnoenidia) spectabilis</i>	ALLMAN	1871	= <i>Tubularia spectabilis</i> .
<i>T. stellifera</i>	COUTHOUY	1839	= <i>Syncoryne gravata</i> .
<i>T. tenella</i>	(AGASSIZ, L.)	1862	
Gen. <i>Turris</i>	LESSON	1843	
<i>T. neglecta</i>	LESSON	1843	
Gen. <i>Vorticifera</i>	ALDER	1856	
<i>V. humilis</i>	ALDER	1856	
<i>V. proteus</i>	WRIGHT	1863	
Gen. <i>Wrightia</i>	AGASSIZ, L.	1862	Supp.
<i>W. acuminata</i> Ag. sec.	HINCKS	1868	= <i>Campanulina tenuis</i> .
<i>W. syringa</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Calycella syringa</i> .
Gen. <i>Wrightia</i>	ALLMAN	1871	
<i>W. arenosa</i>	(ALDER)	1862	
<i>W. (Atractylis) arenosa</i>	ALLMAN	1871	= <i>Wrightia arenosa</i> .
Gen. <i>Zanclaea</i>	GEGENBAUR	1856	= p. p. <i>Gemmaria</i> .
<i>Z. implexa</i>	ALLMAN	1864	= <i>Gemmaria implexa</i> .
Gen. <i>Zygodactyla</i>	BRANDT	1834	
<i>Z. vitrina</i>	(GOSSE)	1853	
<i>Z. (Aequorea) vitrina</i>	ALLMAN	1871	= <i>Zygodactyla vitrina</i> .

INDEX DES MÉDUSES

ANTHOMÉDUSES ET LEPTOMÉDUSES.

Gen. <i>Aequorea</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
<i>A. albida</i>	AGASSIZ, A.	1862	
<i>A. cyanea</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Rhegmatores thalassina</i> .
<i>A. forbesiana</i>	GOSSE	1853	= <i>Staurobrachium stauroglyphum</i> .
<i>A. forskalea</i>	SPAGNOLINI	1871	= <i>Aequorea forskalea</i> .
<i>A. forskahlaea</i>	D. CHIAIE	1853	= <i>Aequorea forskalea</i> .
<i>A. globularis</i>	MÖRCH	1857	= <i>Polycarpa groenlandica</i> .
Gen. <i>Amphicodon</i>	HAECKEL	1879	
<i>A. globosus</i>	(SARS)	1860	
Gen. <i>Amphinema</i>	HAECKEL	1879	
<i>A. apicatum</i>	(MC CRADY)	1859	
Gen. <i>Bougainvillea</i>	FORBES	1848	= <i>Bougainvillea</i>
<i>B. dinema</i>	GREENE	1861	= <i>Margelis zygonema</i> .
<i>B. koellikeri</i>	LEUCKART	1856	= <i>Rathkia fasciculata</i> .
Gen. <i>Bougainvillia</i>	LESSON	1836	
<i>B. dinema</i>	GREENE	1857	= <i>Margelis zygonema</i> .
<i>B. maniculata</i>	HAECKEL	1864	= <i>Margelis maniculata</i> .
<i>B. mediterranea</i>	BUSCH	1851	= <i>Cyrtæis tetrastyla</i> .
<i>B. mertensi</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Hippocrene mertensi</i> .
Gen. <i>Campanella</i>	LESSON	1843	
<i>C. campanula</i>	MÖRCH	1857	= <i>Catablema campanula</i> .
Gen. <i>Catablema</i>	HAECKEL	1879	
<i>C. vesicaria</i>	AGASSIZ, A.	1865	
Gen. <i>Circe</i>	MERTENS	1834	
<i>C. hyalina</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Lizzella hyalina</i> .
Gen. <i>Cladonema</i>	DUJARDIN	1843	
<i>C. radiatum</i>	DUJARDIN	1843	Voir aux Hydroïdes.
Gen. <i>Codonium</i>	HAECKEL	1879	

<i>C. pulchellum</i>	HAECKEL	1879	= Méd. de <i>Syncoryne pulchella</i> .
Gen. <i>Cosmetica</i>	SPAGNOLINI	1871	= <i>Cosmetira</i> .
<i>C. pilosella</i>	SPAGNOLINI	1871	= <i>Laodice cruciata</i> .
Gen. <i>Cosmetira</i>	HAECKEL	1864	
<i>C. mediterranea</i>	HAECKEL	1864	= <i>Laodice cruciata</i> .
<i>C. pilosella</i>	HAECKEL	1864	= <i>Laodice cruciata</i> .
<i>C. punctata</i>	HAECKEL	1864	= <i>Laodice cruciata</i> .
Gen. <i>Crematostoma</i>	AGASSIZ, A.	1862	
<i>C. flava</i>	AGASSIZ, A.	1862	= <i>Polycanna flava</i> .
Gen. <i>Cubogaster</i>	HAECKEL	1879	
<i>C. gemmascens</i>	HAECKEL	1879	
Gen. <i>Cybogaster</i>	HAECKEL	1864	= <i>Cubogaster</i> .
<i>C. gemmascens</i>	HAECKEL	1864	= <i>Cubogaster gemmascens</i> .
Gen. <i>Cytaeis</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
<i>C. macrogaster</i>	HAECKEL	1879	
<i>C. polystyla</i>	WILL	1844	
<i>C. pusilla</i>	GEGENBAUR	1856	
<i>C. tetrastyla</i>	sec. EYDOUX et So-		
	LEYET	1852	= <i>Cytaeis macrogaster</i> .
Gen. <i>Cyteis</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Cytaeis</i> .
<i>C. blondina</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Lizzia blondina</i> .
Gen. <i>Cytheis</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Cytaeis</i> .
<i>C. blondina</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Lizzia blondina</i> .
Gen. <i>Dinema</i>	BENEDEN (van)	1866	
<i>D. ocellata</i>	(BUSCH)	1851	
Gen. <i>Dipleurosoma</i>	BOECK	1861	
<i>D. stuvitzii</i>	BOECK	1861	= <i>Dipleurosoma typica</i> .
<i>D. typica</i>	BOECK	1868	
Gen. <i>Dipurena</i>	MC CRADY	1859	
<i>D. catenata</i>	(FORBES)	1853	
<i>D. cervicata</i>	MC CRADY	1859	
<i>D. conica</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Dipurena cervicata</i> .
<i>D. dolichogaster</i>	HAECKEL	1864	
<i>D. ophiogaster</i>	HAECKEL	1879	
<i>D. strangulata</i>	MC CRADY	1859	
Gen. <i>Dyscannota</i>	HAECKEL	1879	

<i>D. dysdipleura</i>	HAECKEL	1879	
Gen. <i>Dysmorphosa</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>D. fulgurans</i>	AGASSIZ, A.	1865	
Gen. <i>Ectopleura</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>E. nodosa</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Syndictyon nodosum</i> .
<i>E. ochracea</i>	AGASSIZ, A.	1862	
<i>E. pulchella</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Codonium pulchellum</i> .
Gen. <i>Eirene</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Irene</i> .
<i>E. coerulea</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Irene coerulea</i> .
<i>E. gibbosa</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Irene gibbosa</i> .
<i>E. viridula</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	= <i>Irene viridula</i> .
Gen. <i>Eleutheria</i>	QUATREFAGES	1842	
<i>E. claparedei</i>	HARTLAUB	1889	
<i>E. dichotoma</i>	sec. CLAPARÈDE	1863	= <i>Eleutheria claparedei</i> .
<i>E. sp.</i>	GEGENBAUR	1856	= <i>Eleutheria dichotoma</i> .
Gen. <i>Epenthesis</i>	MC CRADY	1859	
<i>E. folleata</i>	MC CRADY	1859	
Gen. <i>Eucheilota</i>	MC CRADY	1859	
<i>E. duodecimalis</i>	AGASSIZ, A.	1862	= p. p. <i>Phialium duodecimale</i> .
<i>E. duodecimalis</i>	AGASSIZ, A.	1862	= p. p. <i>Phialium dodecasema</i> .
<i>E. ventricularis</i>	MC CRADY	1859	
Gen. <i>Eucope</i>	GEGENBAUR	1856	
<i>E. affinis</i>	GEGENBAUR	1856	
<i>E. articulata</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>E. campanulata</i>	GEGENBAUR	1856	
<i>E. gemmigera</i>	KEFERSTEIN	1862	= <i>Epenthesis cymbaloidea</i> .
<i>E. minuta</i>	METSCHNIKOFF	1870	
<i>E. parasitica</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>E. picta</i>	KEFERSTEIN u. EHLERS	1861	= <i>Eucopium pictum</i> .
<i>E. polygena</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>E. polystyla</i>	GEGENBAUR	1856	= <i>Obelia polystyla</i> .

<i>E. pontica</i>	METSCHNIKOFF	1870	
<i>E. thaumantoides</i>	GEGENBAUR	1856	
<i>E. variabilis</i>	CLAUS	1864	= <i>Phialidium variabile</i> .
Gen. <i>Eucopium</i>	HAECKEL	1879	
<i>E. pictum</i>	(KEFERSTEIN u. EHLERS)	1861	
Gen. <i>Euphysa</i>	FORBES	1848	
<i>E. globator</i>	LEUCKART	1856	= <i>Globiceps globator</i> .
<i>E. mediterranea</i>	HAECKEL	1864	
<i>E. virgulata</i>	AGASSIZ, A.	1865	
Gen. <i>Eutima</i>	MC CRADY	1859	
<i>E. insignis</i>	KEFERSTEIN	1862	
<i>E. limpida</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>E. mira</i>	MC CRADY	1859	
<i>E. pyramidalis</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>E. variabilis</i>	MC CRADY	1859	= <i>Octorchandra varia-</i> <i>bilis</i> .
Gen. <i>Gemmaria</i>	MC CRADY	1859	
<i>G. cladophora</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>G. gemmosa</i>	(MC CRADY)	1859	
Gen. <i>Geryonia</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
<i>G. (Geryonopsis) pel-</i> <i>lucida</i>	LEUCKART	1856	= <i>Irene pellucida</i> .
Gen. <i>Geryonopsis</i>	FORBES	1848	
<i>G. forbesi</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Irene viridula</i> .
Gen. <i>Globiceps</i>	AYRES	1854	
<i>G. globator</i>	(LEUCKART)	1856	
Gen. <i>Gonionemus</i>	AGASSIZ, A.	1862	
<i>G. vertens</i>	AGASSIZ, A.	1862	
Gen. <i>Goodsirea</i>	WRIGHT	1859	
<i>G. mirabilis</i>	WRIGHT	1859	= <i>Saphenia mirabilis</i> .
Gen. <i>Halopsis</i>	AGASSIZ, A.	1865	
<i>H. cruciata</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Phialis cruciata</i> .
<i>H. ocellata</i>	AGASSIZ, A.	1865	
Gen. <i>Hippocrene</i>	MERTENS	1834	
<i>H. cruciata</i>	FORBES	1853	= <i>Nemopsis crucifera</i> .
<i>H. (Bougainvillea)</i> <i>cruciata</i>	WRIGHT	1858	= <i>Nemopsis crucifera</i> .

<i>H. crucifera</i>	FORBES	1853	= <i>Nemopsis crucifera</i> .
<i>H. nigritella</i>	FORBES	1853	= <i>Thamnititis nigritella</i> .
<i>H. pyramidata</i>	FORBES	1853	
<i>H. simplex</i>	FORBES	1853	= <i>Thamnititis nigritella</i> .
<i>H. superciliaris</i>	AGASSIZ, L.	1850	= Méd. de <i>Bougainvillea superciliaris</i> .
Gen. <i>Hypsonema</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>H. polystyla</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Cytaeis polystyla</i> .
Gen. <i>Irene</i>	HAECKEL	1879	
<i>I. coerulea</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>I. gibbosa</i>	(Mc CRADY)	1859	
<i>I. viridula</i>	(PÉRON et LESUEUR)	1810	
Gen. <i>Köllikeria</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>K. fasciculata</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Rathkia fasciculata</i> .
Gen. <i>Laodice</i>	HAECKEL	1879	= <i>Laodicea</i> .
Gen. <i>Laodicea</i>	LESSON	1843	
<i>L. calcarata</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>L. cellularia</i>	AGASSIZ, A.	1862	= <i>Thaumantias cellularia</i> .
<i>L. cruciata</i>	(FORSKÅL)	1775	
<i>L. stauroglypha</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Laodicea cruciata</i> .
<i>L. ulothrix</i>	HAECKEL	1879	
Gen. <i>Lizzella</i>	HAECKEL	1879	
<i>L. hyalina</i>	BENEDEN (van)	1867	
Gen. <i>Lizzia</i>	FORBES	1846	
<i>L. clapparedei</i>	HAECKEL	1879	
<i>L. debalia</i>	BENEDEN (van)	1867	= <i>Thamnostoma dibalia</i> .
<i>L. dibalia</i>	BUSCH	1851	= <i>Thamnostoma dibalia</i> .
<i>L. grata</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Margellium gratum</i> .
<i>L. köllikeri</i>	GEGENBAUR	1854	= <i>Rathkia fasciculata</i> .
<i>L. maniculata</i>	SPAGNOLINI	1871	= <i>Margelis maniculata</i> .
<i>L. octopunctata</i> sec.	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Rathkia octopunctata</i> .
<i>L. (Cytaeis) octopunctata</i>	BUSCH	1851	= <i>Rathkia undopunctata</i> .

L. sp.?	CLAPARÈDE	1860	= <i>Lizzia claparedei</i> .
Gen. <i>Margelis</i>	STEENSTRUP	1850	
<i>M. carolinensis</i>	AGASSIZ, L.	1862	= Méd. de <i>Bougainvillea carolinensis</i> .
<i>M. maniculata</i>	HAECKEL	1879	
<i>M. nigrیتella</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Thamnitis nigrیتella</i> .
<i>M. ramosa</i>	AGASSIZ, L.	1862	= Méd. de <i>Bougainvillea ramosa</i> .
<i>M. zygonema</i>	HAECKEL	1879	
Gen. <i>Margellium</i>	HAECKEL	1879	
<i>M. gratum</i>	(AGASSIZ, A.)	1865	
<i>M. octopunctatum</i>	HAECKEL	1879	= <i>Rathkia octopunctata</i> .
Gen. <i>Melicertum</i>	sec. AGASSIZ, L.	1862	
<i>M. campanula</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>M. georgicum</i>	AGASSIZ, A.	1862	
<i>M. pusillum</i>	sec. AGASSIZ, L.	1862	= <i>Melicertidium octocostatum</i> .
Gen. <i>Mesonema</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
<i>M. coerulescens</i>	sec. KÖLLIKER	1853	= <i>Mesonema pensile</i> .
<i>M. (Zygonema) coerulescens</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Mesonema coerulescens</i> .
<i>M. cyaneum</i>	(AGASSIZ, L.)	1862	
Gen. <i>Mitrocoma</i>	HAECKEL	1864	
<i>M. annae</i>	HAECKEL	1864	
Gen. <i>Nemopsis</i>	AGASSIZ, L.	1850	
<i>N. bachei</i>	AGASSIZ, L.	1850	Voir : Hydroïdes.
<i>N. crucifera</i>	(FORBES)	1853	
Gen. <i>Obelia</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
<i>O. diaphana</i>	ALLMAN	1864	= Méd. d' <i>Obelia geniculata</i> .
<i>O. lucifera</i>	HAECKEL	1879	= Méd. d' <i>Obelia geniculata</i> .
<i>O. plana</i>	(SARS)	1835	= Méd. d' <i>Obelia flabellata</i> .
<i>O. polystyla</i>	(GEGENBAUR)	1856	
<i>O. vitrea</i>	THOMPSON	1856	Ind.

Gen. <i>Oceanea</i>	GRAEFFE	1860	= <i>Oceania</i> .
<i>O. pileata</i>	GRAEFFE	1860	= <i>Tiara pileata</i> .
Gen. <i>Oceania</i>	PÉRON et LESUEUR	1810	
<i>O. armata</i>	KÖLLIKER	1853	= <i>Turritopsis armata</i> .
<i>O. coccinea</i>	LEUCKART	1856	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. coronata</i>	ALLMAN	1871	= <i>Tiara octona</i> .
<i>O. crucigera</i>	sec. SPAGNOLINI	1868	= <i>Laodice cruciata</i> .
<i>O. ducalis</i>	FORBES	1853	= <i>Tiara ducatis</i> .
<i>O. flavidula</i>	sec. GEGENBAUR	1856	= <i>Turritopsis armata</i> .
<i>O. folleata</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Epenthesis folleata</i> .
<i>O. gaedii</i>	BENEDEN (van)	1867	= ? <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. gregaria</i>	AGASSIZ, A.	1862	= <i>Phialidium gregarium</i> .
<i>O. languida</i>	AGASSIZ, A.	1862	= <i>Phialidium languidum</i> .
<i>O. leuseuriana</i>	sec. SPAGNOLINI	1871	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. (Thaumantias)</i> <i>multicirrata</i>	SARS	1851	= <i>Staurophora vitrea</i> .
<i>O. (Turritopsis) nutricula</i>	Mc CRADY	1859	= <i>Turritopsis nutricula</i> .
<i>O. phosphorica</i>	sec. AGASSIZ, L.	1862	= <i>Thaumantias hemisphaerica</i> .
<i>O. pileata</i>	sec. KEFERSTEIN u. EHLERS	1861	= <i>Pandea conica</i> .
<i>O. polycirrha</i>	KEFERSTEIN	1862	= <i>Turritopsis polyneuma</i> .
<i>O. sedecimcostata</i>	KÖLLIKER	1853	= <i>Pandea conica</i> .
<i>O. smaragdina</i>	SPAGNOLINI	1871	= <i>Tiara pileata</i> .
<i>O. telostyla</i>	sec. AGASSIZ, A.	1865	= ? <i>Syndiction nodosum</i> .
<i>O. thelostyla</i>	GEGENBAUR	1856	= ? <i>Syndiction nodosum</i> .
Gen. <i>Octorchandra</i>	HAECKEL	1879	
<i>O. variabilis</i>	(Mc CRADY)	1859	
Gen. <i>Octorchis</i>	HAECKEL	1864	
<i>O. gegenbauri</i>	HAECKEL	1864	
Gen. <i>Pandea</i>	LESSON	1837	

	<i>P. flavidula</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Turritopsis armata</i> .
Gen.	<i>Phialidium</i>	LEUCKART	1856	
	<i>P. ferrugineum</i>	HAECKEL	1864	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
	<i>P. gregarium</i>	(AGASSIZ, A.)	1862	
	<i>P. languidum</i>	(AGASSIZ, A.)	1862	
	<i>P. viridicans</i>	sec. HAECKEL	1864	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
	<i>P. viridiscens</i>	LEUCKART	1856	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
Gen.	<i>Phialis</i>	HAECKEL	1879	
	<i>P. cruciata</i>	(AGASSIZ, A.)	1865	
Gen.	<i>Phialium</i>	HAECKEL	1879	
	<i>P. dodecasema</i>	HAECKEL	1879	
	<i>P. duodecimale</i>	HAECKEL	1879	
Gen.	<i>Phortis</i>	MC CRADY	1859	
	<i>P. gibbosa</i>	MC CRADY	1859	= <i>Irene gibbosa</i> .
Gen.	<i>Plancia</i>	FORBES	1853	
	<i>P. gracilis</i>	FORBES	1853	= ? <i>Saphenia mirabilis</i> .
Gen.	<i>Polycanna</i>	HAECKEL	1879	
	<i>P. crassa</i>	(AGASSIZ, A.)	1865	
	<i>P. flava</i>	(AGASSIZ, A.)	1862	
	<i>P. vitrina</i>	HAECKEL	1879	= Méd. de <i>Zygodactyla</i> <i>vitrina</i> .
Gen.	<i>Ptychogena</i>	AGASSIZ, A.	1865	
	<i>P. lactea</i>	AGASSIZ, A.	1865	
Gen.	<i>Rathkia</i>	BRANDT	1837	
	<i>R. octopuncta</i>	(SARS)	1835	
Gen.	<i>Rhacostoma</i>	AGASSIZ, L.	1851	
	<i>R. atlanticum</i>	AGASSIZ, L.	1851	= <i>Polycanna groenlan-</i> <i>dica</i> .
Gen.	<i>Rhegmatodes</i>	AGASSIZ, L.	1862	
	<i>R. floridanus</i>	AGASSIZ, L.	1862	
	<i>R. forbesianus</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Staurobrachium stau-</i> <i>roglyphum</i> .
	<i>R. tenuis</i>	AGASSIZ, A.	1862	
Gen.	<i>Saphenia</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
	<i>S. apicata</i>	MC CRADY	1859	= <i>Amphinema apica-</i> <i>tum</i> .

<i>S. balearica</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Sapientia bitentaculata</i> .
<i>S. mirabilis</i>	(WRIGHT)	1859	
<i>S. titania</i>	GOSSE	1853	= <i>Amphinema titania</i> .
Gen. <i>Sarsia</i>	LESSON	1843	
<i>S. dolichogaster</i>	SPAGNOLINI	1871	= <i>Dipurena dolichogaster</i> .
<i>S. decipiens</i>	sec. SPAGNOLINI	1871	= ? <i>Sarsia clarata</i> .
<i>S. glacialis</i>	MÖRCH	1857	= ? <i>Sarsia mirabilis</i> .
<i>S. mirabilis</i>	AGASSIZ, L.	1850	= Méd. de <i>Syncoryne mirabilis</i> .
<i>S. strangulata</i>	ALLMAN	1864	= <i>Dipurena ophiogaster</i> .
<i>S. macrorhyncha</i>	BUSCH	1851	
<i>S. macrorhynchos</i>	BUSCH	1851	= <i>Sarsia macrorhyncha</i> .
<i>S. nodosa</i>	BUSCH	1851	= <i>Syndictyon nodosum</i> .
<i>S. ocellata</i>	BUSCH	1851	= <i>Dinema ocellatum</i> .
<i>S. sarsii</i>	sec. SPAGNOLINI	1871	= <i>Sarsia tubulosa</i> .
<i>S. (Oceania) tubulosa</i>	BUSCH	1851	= <i>Sarsia tubulosa</i> .
Gen. <i>Siphonorhynchus</i>	KEFERSTEIN	1862	
<i>S. insignis</i>	KEFERSTEIN	1862	= <i>Eutima insignis</i> .
Gen. <i>Slabberia</i>	FORBES	1846	
<i>S. catenata</i>	FORBER	1853	= <i>Dipurena catenata</i> .
<i>S. conica</i>	GREENE	1861	= <i>Dipurena conica</i> .
Gen. <i>Staurophora</i>	BRANDT	1834	
<i>S. keithi</i>	PEACH	1867	
<i>S. vitrea</i>	SARS	1863	
Gen. <i>Steenstrupia</i>	FORBES	1846	
<i>S. cranoides</i>	HAECKEL	1864	
<i>S. globosa</i>	SARS	1860	= <i>Amphicodon globosus</i> .
<i>S. lineata</i>	LEUCKART	1856	
Gen. <i>Stomatoca</i>	NORMAN	1869	= <i>Stomatoca</i> .
<i>S. dinema</i>	NORMAN	1869	= <i>Amphinema titania</i> .
Gen. <i>Stomobrachium</i>	BRANDT	1838	
<i>S. mirabile</i>	KÖLLIKER	1853	= <i>Mesonema pensile</i> .
<i>S. tentaculatum</i>	AGASSIZ, L.	1862	
Gen. <i>Stomatoca</i>	AGASSIZ, L.	1862	

S. apicata	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Amphinema apica-</i> <i>tum</i> .
S. atra	AGASSIZ, L.	1862	
S. dinema	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Amphinema titania</i> .
Gen. <i>Syndictyon</i>	AGASSIZ, L.	1862	
S. nodosum	(BUSCH)	1851	
S. thelostylum	AGASSIZ, L.	1862	= ? <i>Syndictyon nodo-</i> <i>sum</i> .
Gen. <i>Thamnostoma</i>	HAECKEL	1879	
T. dibalia	(BUSCH)	1851	
Gen. <i>Thaumantias</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
T. achroa	COBBOLD	1858	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
T. buskiana	GOSSE	1853	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
T. cellularia	(AGASSIZ, A.)	1862	
T. cirrhata	BENEDEN (van)	1867	= <i>Tiaropsis multicir-</i> <i>rhata</i> .
T. confluens	FORBES	1853	= ? <i>Laodice ulothrix</i> .
T. corollata	LEUCKART	1856	= <i>Laodice cruciata</i> .
T. cymbaloides sec.	BENEDEN (van)	1867	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
T. dubia	KÖLLIKER	1853	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
T. inconspicua or			
T. sarnica	BUSK	1852	= ? <i>Thaumantias he-</i> <i>misphaerica</i> .
T. mediterranea	GEGENBAUR	1856	= <i>Laodice cruciata</i> .
T. multicirratu sec.	ALLMAN	1871	= <i>Tiaropsis multicir-</i> <i>rata</i> .
T. multicirrhata	BUSCH	1851	= <i>Tiaropsis multicir-</i> <i>rata</i> .
T. neglecta	GREENE	1857	= <i>Thaumantias hemis-</i> <i>phaerica</i> .
T. pattersonii	GREENE	1857	= <i>Tiaropsis multicir-</i> <i>rata</i> .
T. (Cosmetira) pilo-			
sella	GOSSE	1853	= <i>Laodice cruciata</i> .

T. planata	LEUCKART	1856	= <i>Phialidium varia-</i> <i>bile</i> .
T. typica	GREENE	1857	= <i>Thaumautius hemis-</i> <i>phaerica</i> .
T. undulata	FORBES	1853	= <i>Laodice cruciata</i> .
<i>T. versicolor</i>	METTENHEIMER	1861	
Gen. <i>Tiara</i>	LESSON	1837	
T. coccinea	HAECKEL	1864	= <i>Tiara pileata</i> .
T. conica	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Pandea conica</i> .
<i>T. ducalis</i>	(FORBES)	1853	
T. episcopalis	NORMAN	1869	= <i>Tiara pileata</i> .
T. smaragdina	HAECKEL	1864	= <i>Tiara pileata</i> .
T. turrita	NORMAN	1869	= <i>Tiara octona</i> .
Gen. <i>Tiaropsis</i>	AGASSIZ, L.	1850	
<i>T. multicirrata</i>	(SARS)	1835	
T. multicirrhata	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Tiaropsis multicir-</i> <i>rata</i> .
T. pattersonii	GREENE	1861	= <i>Tiaropsis multicir-</i> <i>rata</i> .
Gen. <i>Tima</i>	ESCHSCHOLTZ	1829	
T. cari	HAECKEL	1864	= <i>Irene pellucida</i> .
<i>T. forbesi</i>	PEACH	1867	
<i>T. formosa</i>	AGASSIZ, A.	1862	
T. gibbosa	AGASSIZ, L.	1862	= ? <i>Irene pellucida</i> .
Gen. <i>Turris</i>	LESSON	1837	
<i>T. constricta</i>	PATTERSON	1859	
<i>T. neglecta</i> .	LESSON	1837	Voir : Hydroïdes.
T. vesicaria	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Catablena vesica-</i> <i>rium</i> .
Gen. <i>Turritopsis</i>	MC CRADY	1859	
<i>T. armata</i>	(KÖLLIKER)	1853	
T. flavidula	MC CRADY	1859	= ? <i>Turritopsis armata</i> .
<i>T. nutricula</i>	MC CRADY	1859	
<i>T. polygema</i>	HAECKEL	1879	
T. pusilla	MC CRADY	1859	= ? <i>Cytaeis pusilla</i> .
Gen. <i>Tyaropsis</i>	ALLMAN	1871	= <i>Tiaropsis</i> .
T. scotica	ALLMAN	1871	= <i>Tiaropsis multicir-</i> <i>rata</i> .

Gen. <i>Willettia</i>	HAECKEL	1879	
<i>W. ornata</i>	(MC CRADY)	1859	
Gen. <i>Willia</i>	AGASSIZ, L.	1862	
<i>W. cornubica</i>	(PEACH)	1867	
<i>W. ornata</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Dyscannota dysdiplexura</i> .
<i>W. stellata</i>	(FORBES)	1846	
Gen. <i>Willsia</i>	FORBES	1846	= <i>Willia</i> .
<i>W. cornubica</i>	PEACH	1867	= <i>Willia cornubica</i> .
<i>W. ornata</i>	MC CRADY	1859	= <i>Willettia ornata</i> .
<i>W. stellata</i>	FORBES	1846	= <i>Willia stellata</i> .
<i>W. stellata</i>	sec. PEACH	1850	= <i>Willia cornubica</i> .
Gen. <i>Zanclaea</i>	GEGENBAUR	1856	
<i>Z. ambigua</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Pteronema ambiguum</i> .
<i>Z. costata</i>	GEGENBAUR	1856	
<i>Z. gemmosa</i>	MC CRADY	1859	= <i>Gemmaria gemmosa</i> .
Gen. <i>Zygodactyla</i>	BRANDT	1834	
<i>Z. coerulescens</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Mesonema coerulescens</i> .
<i>Z. crassa</i>	AGASSIZ, A.	1865	= <i>Polycanna crassa</i> .
<i>Z. cyanea</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Mesonema cyaneum</i> .
<i>Z. dubia</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Mesonema dubium</i> .
<i>Z. groenlandica</i>	AGASSIZ, L.	1862	= <i>Polycanna groenlandica</i> .